الرياضيات

ما لن يقال لأبنائك في المدارس الحكومية



د. عمار شرقية

نقوم بعملٍ تطوعي غير ربحي لا نرتزق منه و نتعرض لضغوطات بشعة تفوق احتمال البشر تزداد يوماً بعد يوم .

إذا رغبت أي جهةٍ كانت عربية أو أجنبية أن تُقدم لنا أي مساعدة من أي نوع معنوية أوإعلامية أو مادية فسوف نكون شاكرين لها و سوف نضع شعارها و نذكر فضلها كراعية لهذه الأعمال في مقدمة كل عمل.

We are engaged in non-profit volunteer work, receiving no financial gain, and we are subjected to unbearable pressures that increase daily from those around us, to the point of forcing us to flee our homes.

If any entity, Arab or foreign, can offer us any kind of assistance—moral, media, or material—we will be grateful and will prominently display their logos and acknowledge their support for this work.

Plant.kingdom1111@gmail.com

+963   0962635946

بسم الله الرحمن الر حيم

وقف لله تعالى

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله من عبده الوضيع السافل الدنيء الحقير الفقير إلى رحمته و مغفرته و عفوه و فضله و عافيته تعالى

الإهداء

إلى روح أمي التي رحلت عن عالمنا إلى الأبد . . .

اللهم إنك عفوٌ كريم تُحب العفو فاعفو عنها يا الله .



Plant.kingdom1111@gmail.com
المزيد من المؤلفات للكاتب:

https://archive.org/details/@ash790

لقد ألفت كتاباً في الرياضيات يُمكنكم قراءته كما تقرأون كتاباً في الجغرافيا او التاريخ أو الأدب و يُمكنكم فهمه بالجهد

ذاته الذي يتطلبه فهم تلك المواد، كما راعيت في تأليفه و إخراجه الفني العوامل النفسية و البصرية و خصوصاً المتعلقة بأولئك الذين يشعرون بالرهبة و الخوف من الرموز الرياضية و الأشخاص ضئيلو الملاحظة فقمت بالتعامل مع الرموز و المعادلات الرياضية و كأنها صور و هي طريقةٌ أدعي و أعتقد بأنني أول من استخدمها كما أدرجت في هذا الكتاب الكثير من الخبرات و الاكتشافات الشخصية التي ربما لا سابق لها أو أنها معروفة و لكنها لا تُقال بالمجان.

و الله و حده ولي الحمد و التوفيق

الأعداد الصحيحة Whole numbers

هي الأعداد التي تتضمن جميع الأعداد الكاملة الموجبة بما فيها الصفر.

الأعداد السلبية : هي الأعداد التي تقع تحت الصفر.

مثال على الأعداد السلبية درجات الحرارة السلبية التي تقع تحت الصفر.

الكسور Fractions

هي الأعداد التي تقع ما بين عدين صحيحين .

مثال : جميع الأعداد التي تقع مثلاً ما بين الصفر و الواحد هي كسور و ما يقع بين العددين 2 و 3 هي كسورٌ كذلك و ما يقع بين العددين 3 و 4   هي كسورٌ كذلك.

اي ان الكسور هي جميع الأعداد التي تقع بين عددين صحيحين متتاليين يقعان ما بين صفر 0 و 9.

إن الكسور هي أعدادٌ أكبر من الصفر0 و أصغر من العدد واحد 1 .

مثال : الكسر ربع $\frac{1}{4}$ هو كسرٌ لأنه أكبر من الصفر و أقل من واحد 1 (الربع هو ربع واحد1)

كل ما يقع إلى يمين الفاصلة العشرية يكون أقل من واحد 0.3 ثلاثة بالعشرة.

يوصف الصفر بأنه (ماسك خانة) أو عنصرٌ نائب placeholder حيث يدلنا على مرتبة عددٍ ما (هل هو آحاد أو عشرات او مئات).

طرفة عن الأعداد السلبية :

سأل أحد الصحفيين دونالد ترامب سألته عن مقدار ثروته و كان في حينها مديناً بمبلغ 90 مليون دولار فأشار عندها إلى أحد المتسولين في الشارع و قال له : أترى هذا المتسول؟ ... إنه أغنى مني ب 90 مليون دولار.

أي أن الموقف المالي لذلك المتسول هو صفر ، بينما الوضع المالي لدونالد ترامب هو ناقص - 90 مليون دولار:

-90000000$

بمعنى أن دونالد ترامب كان حينها يحتاج إلى 90 مليون دولار حتى يصبح موقفه المالي مماثلاً لموقف ذلك المتسول الذي لا له و لا عليه.

الموقف المالي للمتسول هو صفر و هو بذلك أغنى ب 90 مليون دولار من دونالد ترامب الذي كان موقفه المالي حينها ناقص **-90000000$**

فإذا دفع ترامب ديونه البالغة 90000000$ فإنه يُصبح عندها مماثلاً في ثروته للمتسول.

****

الأعداد الطبيعية Natural numbers

****

الأعداد الطبيعية هي أعدادٌ موجبة تبدأ بالعدد واحد موجب +1 و تنتهي إلى ما لا نهاية .

تتضمن الأعداد الكاملة Whole numbers جميع الأعداد الطبيعية (من واحد +1 موجب إلى ما لا نهاية ∞) و لكنها تتضمن كذلك الصفر.

الصفر + الأعداد الطبيعية (من واحد +1 موجب إلى ما لا نهاية ∞)= الأعداد الكاملة.

صحيح Integer

الأعداد الصحيحة Integer : تتضمن جميع الأعداد الصحيحة بما فيها الصفر و الأعداد السلبية (لا تتضمن الكسور و الأرقام العشرية)

****

الأرقام العشرية Decimals

الأرقام العشرية هي أرقام تتضمن أجزاء أقل من العدد واحد 1 حيث يتم الفصل بين الأجزاء الأعلى من العدد واحد و الأجزاء الأدنى من العدد واحد بنقطةٍ تدعى بالنقطة العشرية Decimal point .

توضع الأعداد الصحيحة في الرقم العشري إلى ميسرة النقطة العشرية بينما توضع الأجزاء الأقل من العدد واحد إلى ميمنة النقطة العشرية.

عند ترتيب الأرقام العشرية وفقاً لأحجامها فإنه يتم ترتيبها ابتداءً من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى.

****

جدول القيمة المكانية Place value table

56.43

يقع العدد خمسة في خانة العشرات و يعني بأن هنالك خمس عشرات أي 5×10=50

يقع العدد 6 في خانة الآحاد و يعني بأن لدينا 6 آحاد أي 6×1=6

يمثل الجزء الذي يقع إلى ميسرة النقطة العشرية أعداداً صحيحة (أكبر من العدد واحد أو تساويه).

56.43

يقع العدد 4 في خانة الأعشار و ليس في خانة العشرات أي جزء من عشرة أي أنه يمثل الكسر $\frac{4}{10}$ اي 4 أربعة بالعشرة 0.4 .

يمثل العدد 3 جزءاً من مئة اي أنه يمثل الكسر $\frac{3}{100}$ أي ثلاثة بالمئة.

56.43

4=tenths

3=hundredths

56.43

الجزء الذي يقع إلى ميمنة النقطة العشرية أي 43. يمثل جزءاً من واحد أي أنه أقل من العدد واحد.

عند ترتيب الأرقام العشرية وفقاً لأحجامها نقوم بترتيبها من الجهة اليسرى إلى الجهة اليُمنى.

****

لدينا ثلاثة سيارات سباق اشتركت في سباقٍ و أتمته بالأزمنة التالية :

30.4

30.37

30.42

قم بترتيب تلك السيارات الثلاث ابتداءً بالسيارة الأسرع.

جميع السيارات أنهت السباق بزمنٍ مقداره 30 ثانية ، و هذا يعني باننا سوف نعتمد على الأرقام العشرية في ترتيب هذه السيارات بما أنها تساوت في الزمن الصحيح.

السيارة الأسرع هي صاحبة الرقم الأدنى أي انها السيارة التي حققت الزمن 30.37

لماذا؟

لأن 3 أعشار اقل من 4 أعشار .

أي أن أي رقم أعشاره ثلاثة مثل 30.37 هو أقل من أي رقمٍ أعشاره أربعة مثل 30.47 (في حال كان الرقمين الصحيحين متماثلين بالطبع كما في المثال العلوي).

نتأكد من أن الرقم 30.42 أكبر من الرقم 30.37 عن طريق طرح الرقم الأصغر من الرقم الأكبر فإن لم يكن الناتج سلبياً فذلك يعني بأن الرقم الأول هو فعلياً أكبر من الرقم الثاني.

30.42 - 30.37=0.05

اي أن 30.42 أكبر من 30.37

30.42 -30.4=0.02

اي أن 30.42 أكبر من 30.4

و لو أنا طرحنا الرقم الأكبر من الرقم الأصغر لحصلنا على نتيجةٍ سلبية :

30.37-30.42= -0.0.72

****

السيارة الثانية من حيث الترتيب هي السيارة التي حققت الزمن 30.4 **لأن 30.4**

تعني 30.40 و بالطبع فإن 30.40 أو 30.4 هي أقل من 30.42.

****

أثبت لي باستخدام الآلة الحاسبة بأن 30.4 تساوي 30.40 .

30.40 - 30.4=0

أي انهما متساويتان لأن ناتج طرحهما يساوي الصفر.

30.40 +30.4=60.8=60.80

لأن صفر بالمئة 0 hundredth أي الصفر الموجود في الرقم 40 أو الصفر الذي نفترض وجوده بعد العدد 4 في الرقم 30.4 هو أقل من العدد 2 بالمئة 2 hundredth الموجود في الرقم العشري 30.42 ، أي أن السيارة الثالثة من حيث الترتيب هي السيارة صاحبة الزمن 30.42 .

****

Place value columns أعمدة القيمة المكانية

****

جمع الأرقام العشرية

قبل البدء في عملية جمع الأرقام العشرية فإنه من المفيد إجراء عملية جمعٍ تقريبية بحيث نحصل على نتيجة تقريبية تمكننا من الحكم على النتيجة النهائية ما إذا كانتِ صحيحةً أو خاطئة .

إن أهم خطوة في عملية جمع الأرقام العشرية هي عملية ترتيب الأرقام العشرية فوق بعضها البعض ضمن أعمدة مع ضرورة إضافة اصفار لملء الخانات الفارغة.

مثال:

13.53+22.4

13.53 **22.40** **أضفت صفراً 0 للعدد 4 فاصبح 40 لأن 0.4 أربعة بالعشرة كما في الرقم العشري 22.4 تساوي 40 كما في الرقم العشري 22.40 و ذلك حتى يصبح الرقمين رباعيين حتى أتمكن من رصف الرقمين13.53و22.4 تحت بعضهما البعض .**

أثبت لي باستخدام الآلة الحاسبة بأن ما قلته صحيح و أن هذين الرقمين العشريين متساويين.

إذا كانت نتيجة طرحهما من بعضهما الصفر فذلك يعني أنهما متساويين

22.40 – 22.4=0

أي انهما رقمين متساويين .

و إذا قمنا بجمعهما مع بعضهما البعض فإننا نحصل على النتيجة 44.8.

$$22.4=0+22.40=44.8$$

فعلت ذلك حتى يصبح الرقم 22.4الثلاثي الخانات رقماً رباعياً 22.40 وذلك حتى أتمكن من صف الرقم الثاني تحت الرقم الأول.

تذكر دائماً :

الأصفار التي توضع في ميمنة الرقم العشري أي في ميمنة العدد الموجود يمين النقطة العشرية لا تؤثر على قيمة ذلك الرقم.

$$0.4=0.40=0.400=0.4000...$$

أثبت لي بأن الأصفار التي توضع في ميمنة الرقم العشري أي في ميمنة العدد الموجود يمين النقطة العشرية لا تؤثر على قيمة ذلك الرقم.

$$0.4+0.6=1$$

$$0.40+0.6=1$$

$$0.400+0.6=1$$

$$0.4000+0.6=1$$

$$0.40000+0.6=1$$

$$0.4+0.6=1$$

$$0.40+0.60=1$$

0.400+0.600=1

0.4000+0.6000=1

0.40000+0.60000=1

و لكن لا يجوز لي ان أضع صفراً في ميسرة العدد 4 حتى أحصل على أربع خانات فأكتب :

22.04 لأنني أكون بذلك قد غيرت قيمة العدد 4 من 4 بالعشرة إلى 4 بالمئة .

0.4 أربعة بالعشرة لا تساوي أبداً 0.04 أي 4 بالمئة .

أثبت لي باستخدام الالة الحاسبة بأن 0.4 أربعة بالعشرة لا تساوي أبداً 0.04 أي 4 بالمئة .

أقوم بطرح أربعة بالمئة من أربعة بالعشرة .

0. 4 – 0.04=0.36

أي أن 0.4 أربعة بالعشرة هي أكبر من 0.04 أي 4 بالمئة

إذاً لا يجوز لي أن أضيف أي صفر إلى ميسرة العدد الموجود إلى ميمنة النقطة العشرية أي لا يجوز لي أن أضيف صفراً بين العدد و بين النقطة العشرية لأن ذلك الصفر سوف يغير من قيمة ذلك العدد و منزلته.

لا يجوز لي أن أضيف صفراً بين العدد الأيمن و بين النقطة العشرية فأكتب 4 .22 على الشكل 22.04 .

0.04+0.96=1

4 بالمئة زائد 96 بالمئة يساوي واحد.

الصفر الذي أضفته إلى ميسرة العدد 4 جعل من العدد 4 في مرتبة الآحاد.

عندما أضيف صفراً إلى ميسرة العدد الواقع في ميمنة النقطة العشرية ، أي عندما أضيف صفراً ما بين العدد و النقطة العشرية فإنني بذلك أغير قيمة الرقم بينما لا تتغير منزلة و قيمة العدد الواقع في رقمٍ عشري مهما اضفت من أصفارٍ إلى ميمنته.

0.8=0.80=0.800=0.8000=0.80000=0.800000=0.8000000

....

8 بالعشرة تساوي 8 ملايين بالعشرة .

0.8=0.8000000

جميع الأصفار التي توضع إلى ميمنة العدد الموجود بعد النقطة العشرية لا تغير من قيمة ذلك الرقم و لا منزلته (من عشرة ، من مئة، من ألف...)

0.1=0.10=0.100=0.1000=0.10000=0.100000=0.1000000

0.100+0.900=1

0.1+0.9=1

0.1000+0.9000=1

0.10+0.90=1

0.9+0.1000000=1

0.9+0.100=1

0.90000+0.1=1

0.900+0.1000000=1

استخدم الآلة الحاسبة حتى تتأكد من هذا الأمر و حتى تتمرن عليه و حتى تستوعبه بشكلٍ كلي.

إذاً قبل إجراء عملية جمع أو طرح الأرقام العشرية يتوجب ترتيبها فوق بعضها البعض و هذا الأمر يستدعي منا أن نضع الجزء الصحيح من الرقم العشري (أي الجزء الذي يقع إلى ميسرة النقطة العشرية و الذي تكون قيمته مساوية للعدد واحد أو أكبر) فوق أو تحت الجزء الصحيح من الرقم العشري الثاني و هو الأمر الذي يتطلب منا زيادة عدد أصفار لا تؤثر على القيمة الفعلية للرقم العشري أي أنها أصفارٌ تقع إلى ميمنة الرقم العشري كما مر معنا سابقاً .

تذكر دائماً بأن الرقم العشري يخالف الرقم الصحيح من ناحية أن قيمته تتغير عند إضافة أو حذف صفرٍ يقع بينه و بين النقطة العشرية أي إضافة صفرٍ إلى ميسرته بينما لا تتغير منزلته و لا تتغير قيمته عندما يُضاف أي عددٍ من الأصفار إلى ميمنته و ذلك بخلاف الرقم الصحيح الذي تتغير قيمته عندما يُضاف أو يُحذف صفرٌ من ميمنته:

10

100

1000

9000000

60

600

بينما لا تتأثر قيمة العدد الصحيح أبداً بإضافة أي عددٍ من الأصفار إلى ميسرته:

01

001

007

0000007

1=01=001=0001=00001=000001=0000001 =00000001=000000001......

نعود لإتمام عملية جمع الرقمين العشريين و **كما مر معنى سابقاً فقد أضفت صفراً للعد 4 حتى أتمكن من رصف الأعداد في هذين الرقمين بالشكل الصحيح ذلك أن الرقم العشري الأول يتألف من 4 خانات بينما يتألف الرقم العشري الثاني من ثلاث خانات فقط 22.4 و لذلك حتى أتمكن من صف هذين الرقمين تحت بعضهما البعض فقد احتجت إلى إضافة خانة أي صفر شريطة أن يتم ذلك بطريقة لا تؤثر على القيمة الفعلية لذلك الرقم العشري** كما بينت لكم بشكلٍ مستفيض في السابق.

13.53
22.4

و بذلك تصبح عملية الجمع على الصورة التالية :

13.53

+

22.40

= 35.93

مثال آخر :

ما هو ناتج جمع هذين الرقمين العشريين :

43.79+44.8

كما ترون فإن الرقم العشري الأول 43.79 رقمٌ رباعي يتألف من 4 أربع خانات بينما الرقم الثاني رقمٌ ثُلاثي حيث يتألف الرقم العشري الثاني 44.8 من ثلاث خاناتٍ فقط و لذلك و كما مر معنا سابقاً فإننا **نضيف صفراً إلى الرقم الثاني ليتناسب مع الرقم الأول، و بالطبع فإننا نُضيف الصفر إلى يمين العدد 8 بحيث لا يؤثر على قيمته و لا على منزلته** لتصبح عملية الجمع على الشكل التالي :

43.79

+

44.80

نبدأ بإجراء عملية الجمع ابتداءً من الجهة اليمنى :

9+0=9

43.79

+

44.80

9

7+8=15

كيف نتصرف مع الناتج 15 ؟

ننزل عدد الآحاد 5 قبل النقطة العشرية بينما نحمل العدد واحد 1 بما أنه من العشرات إلى ما بعد النقطة العشرية إلى الخانة التالية :

431.79

+

44.80

.59

لاحظ كيف حملت العدد 1 إلى ما بعد النقطة العشرية إلى الخانة التالية و عملية الجمع التالية لأدخله في عملية الجمع :

1+3+4=8

$43^{1}.79$

+

44.80

8.59

لا تنسى إنزال النقطة العشرية .

4+4=8

$43^{1}.79$

+

44.80

88.59

طرح الأرقام العشرية

****

ما هو ناتج طرح 2.43 من العدد 7 ؟

كما مر معنا سابقاً في عملية الجمع فإنه يتوجب علينا دائماً أن نساوي بين الرقمين المطروحين من بعضهما البعض من حيث عدد الخانات في كلٍ منهما ، أي أنه يتوجب علينا أن نجعل العدد 7 من ثلاث خانات و لكن بالطبع دون أن يطرأ اي تغييرٍ على قيمته و منزلته وذلك بإضافة صفرين إلى الجهة اليمنى بعد النقطة العشرية ليصبح 7.00

انتبه جيداً :

لو أنا أضفنا الصفرين إلى ميسرة العدد 7 بعد فاصلة لأصبح 7 بالعشرة 0.7 .

ترفض الآلة الحاسبة إضافة صفرين قبل فاصلة 00.7 و تعتبرهما صفراً واحداً أي 0.

طبعاً 7 بالمئة تكتب بهذا الشكل 0.07

و 7 بالألف تكتب بهذا الشكل 0.007

و بالطبع لو أنا أضفنا صفرين إلى ميمنة العدد 7 دون فاصلة فإنه سوف يصبح 700 .

7.00 – 7=0

7.00 = 7

و بذلك فإننا نحصل على عملية الطرح التالية :

7.00 – 2.43=

7.00
-
2.43

بالطبع فإن العدد 7 يماثل العدد 2 من حيث المرتبة فكلاهما آحاد و لذلك فقد وضعناهما فوق بعضهما البعض.

نبدأ بإجراء عملية الطرح ابتداءً من الجهة اليُمنى فنقول :

0 – 3 =?

بما أنه لا يُمكن طرح 3 من صفر فإننا نستعير لها من الخانة التالية العدد 1 واحد :

7.00

-

2.43

و لكن المشكلة ان الخانة التالية لها قيمتها كذلك صفر و لذلك فإننا نستعير لها العدد واحد 1 من الخانة التالية أي من العدد 7 :

7.00
-
2.43

إذاً فإننا نستعير واحد 1 للصفر الأول فيصبح عشرة :

7.[1]00
-
2.43

ثم نستعير واحداً من تلك العشرة للصفر التالي فيصبح كذلك عشرة بينما تصبح العشرة تسعة.

لماذا؟

لأننا استعرنا منها واحداً :

$7.^{1}0\ 0^{1}$

-

2.43

$7.9\ \ ^{1}0$

-

2.43

7.9 10

-

2.43

الآن نجري عملية الطرح :

10 – 3 =7

9 – 4=5

10 9. 7

-

---

3 2.4

7

---

10 9. 6

-

---

3 4. 2

---

7 5

مع الانتباه إلى أن العدد 7 قد أصبح 6 .

لماذا؟

لأننا استعرنا منه واحداً.

و بذلك فإننا نكمل عملية الطرح على هذا الأساس:

---

10 9. 6

-

---

3 4. 2

---

7 5

---

6 – 2 = 4

---

10 9. 6

-

---

3 4. 2

---

7 5 4 ناتج عملية الطرح

قم بإجراء عمليتي الجمع و الطرح بعد الاستعارة ابتداءً من الجهة اليمنى.

جميع الأرقام العشرية التي يُكملها مُكملٌ من رتبتها إلى العدد واحد تكون متساوية:

0.9+0.1=1

0.90+0.10=1

0.900+0.100=1

0.9000+0.1000=1

0.90000+0.10000=1

0.900000+0.100000=1

و هكذا إلى ما لا نهاية حيث أن هذه الأرقام متساويةٌ فيما بينها.

لاحظ بأن الأصفار المتعددة في الأرقام السابقة جميعها تقع إلى ميمنة النقطة العشرية.

لاحظ :

0.7+0.3=1

و لكن

0.7+0.03=0.73


أي أن إضافة الصفر ما بين العدد و النقطة العشرية قد غير مرتبة و قيمة العدد العشري.


الأعداد السلبية


الأعداد السلبية هي الأعداد الأقل من الصفر و مثالها الأرقام التي تعبر عن درجات الحرارة التي تقع تحت الصفر .


للتعبير عن العدد السالب فإننا نضع بجانبه شارة ناقص -

تمثيل الأعداد السلبية و الموجبة على مستقيم الأعداد number line :









كنت مديناً بخمس 5 دولارات ثم أعطاني شخصٌ ما 6 دولارات ، فكم بقي معي بعد أن قمت بتسدي ديوني ؟

نعبر عن الدين بقيمةٍ سلبية هي 5- .

نعبر عن المال الذي أعطاني إياه ذلك الشخص بقيمة موجبة هي 6+ .

بعد أن سددت ديوني بقي معي دولار واحد نعبر عنه بقيمةٍ موجبة 1+ .

$-5 + 6 = 1$

نكتفي بوضع علامة ناقص بقرب العدد السلبي إذ ليس من الشائع وضع علامة الموجب قرب الأعداد الموجبة.

إن قسمة أو ضرب أعدادٍ متماثلة الإشارة تعطي دائماً نتيجةً إيجابية :

-6 × -6 = +36

6 × 6 = +36

-6 / -6 = +1

-6 ÷ -6 = +1

6 ÷6 = +1

إن قسمة أو ضرب أعداد مختلفة الشارة تُعطي دائماًُ ناتجاً سلبياً :

5 × -4 =-20

20 ÷ -4 = -5

إذا التقت شارتين سلبيتين مع بعضهما البعض إحداهما شارة عدد سلبي و الثانية شارة عملية طرح فإن هاتين الشارتين تلغيان بعضهما البعض و تتحولان إلى شارة عملية جمع و تصبح العملية عملية جمع .

مثال

8- -5 = 13 = 8 + 5= 13

2 - -6 = 8 =2 +6=8

و لكن انتبه إلى أننا حتى نتمكن من تحويل شارتي سالب متتاليتين إلى شارة جمع يجب أن تكون كلتا الشارتين السلبيتين متلاحقتين و لا يحول بينهما حائل ، أي أن لا يحول بينهما عدد حيث يتوجب أن تكون الشارة إلى ميسرة العدد و ليس إلى ميمنته.

فلو كتبنا مثلاً :

-8 -4 = -12

في المثال السابق حال العدد 8 ما بين الشارتين السلبيتين و بالتالي لا تنطبق عليهما الحالة السابقة .

أو أن نقول :

-8 -4 = (-8 +4) = -4

في المثال السابق حال العدد 8 ما بين الشارتين السلبيتين و بالتالي لا تنطبق عليهما الحالة السابقة أي لا يُمكن تحويل الشارتين السلبيتين إلى شارة جمع.

إذاً فإننا نعتبر دائماً بأن الشارة تقع إلى ميسرة العدد و ليس إلى ميمنته.

لا يُمكن اعتبار شارتين سلبتين شارتين متعاقبتين متتابعتين و بالتالي لا يُمكن تحويلهما إلى شارة عملية جمع (شارة موجبة) إن حال بينهما حائل أي عددٌ ما.

عنما تتعاقب شارتين سلبيتين ليس بينهما حائل (عدد) فإنهما تلغيان بعضهما البعض و تتحولان إلى شارة عملية جمع (شارة موجبة).

-5 - -6 = -5 + 6= 1

-4 - -8 = -4 +8 =4

9 - -3 =9 +3=12

7- -2= 7 +2=9

-7 - -2 = -7 +2 = -5

-8 - -4 = -8 +4= -4

تحولت شارة الطرح و شارة العدد السالب التي أتت بعدها إلى شارة جمع + و لكن شارة السالب التي أتت قبلهما قد بقيت على حالها لأنه قد حال حائلٌ بينها و بين شارة السالب التالية لها و هذا الحائل هو عدد.

قواعد ضرب و قسمة الأعداد السلبية على بعضها البعض او مع أعداد موجبة

كما تعلمون فإن المفهوم السلبي هو مفهومٌ سيءٍ يشير إلى صفة سيئة (صفة سلبية) بخلاف الصفات الإيجابية التي هي صفاتٌ حسنة :

مثال : "الصديق" مفهومٌ جيد أي أنه مفهومٌ إيجابي + ، بينما " العدو " صفة سلبية سيئة أي أنها مفهومٌ سلبي .

الان سوف نضع مكان كلمة (صديق) شارة موجبة + و سنضع مكان كلمة (عدو) شارة سلبية و ذلك في المقولة الشائعة التي تعرفونها جميعاً حتى نحصل على قواعد ضرب و قسمة الأعداد السلبية و الإيجابية :

صديق صديقك صديقك

+ × + =+

موجب ضرب موجب = موجب

6 × 5 = 30

موجب تقسيم موجب = موجب

+ ÷ + = +

30 ÷ 6 = 5

عدو صديقك عدوك

سالب ضرب موجب = سالب

-5 × 6 =-30

سالب تقسيم موجب = سالب

-30 ÷ 5=-6

صديق عدوك عدوك

موجب ضرب سالب = سالب

8 × -2 = -16

موجب تقسيم سالب = سالب

8 ÷ -2 = -4


عدو عدوك صديقك

سالب × سالب = موجب

-5 × -6 = 30

سالب تقسيم سالب يساوي موجب

-40 ÷-10 = 4



ضرب الأرقام العشرية بعشرة أو مئة او ألف

عندما نضرب رقماً عشرياً ما بالرقم عشرة فإننا نزيح النقطة العشرية خانةً واحدة نحو الجهة اليمنى:

4.66× 10=46.6

أي أننا نحرك الأعداد خانة واحدة نحو الجهة اليسرى.

4.66

46.6

إذا ضربنا رقماً عشرياً بمئة فإننا نحرك النقطة العشرية خانتين اثنتين نحو الجهة اليُمنى:

4.667 ×100=466.7

4.667

466.7

إذا ضربنا رقماً عُشرياً بألف فإننا نحرك النقطة العشرية ثلاث خانات نحو الجهة اليُمنى:

4.6678 ×1000=4667.8

4.6678

4667.8

4.66 × 1000=4660. →4660

و إذا ضربنا رقماً عشرياً بعشرة آلاف فإننا نحرك النقطة العشرية أربعة خانات (بعدد أصفار العشرة آلاف 10000) نحو الجهة اليمنى .

7.456789 × 10000 =74567.89

7.456789

74567.89

عند الضرب برقمٍ عشري فإننا نحرك الفاصلة إلى الجهة اليمنى عدد خاناتٍ يساوي عدد أصفار ذلك الرقم العشري.

ماذا إن لم يتبقى مكانٌ للفاصلة؟

ماذا لو ضربنا رقماً عشرياً بمئة او بألف مثلاً و لم يتبق مكانٌ لفاصلة كما في المثال التالي:

4.66 × 1000= ?

في هذه الحالة فإننا **نحرك النقطة وفق ما ذكرته سابقاً و إن لم يتبقى مكانٌ للنقطة العشرية فإننا نضع مكانها صفراً دون نقطة عشرية.**

إن لم يتبقى للنقطة العشرية مكان ، أي إذا أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم فإننا نكمل الخانات الناقصة بأصفار دون نقطة عشرية:

4.66 × 10000 = 46600

كان من المفترض أن نزيح النقطة العشرية بمقدار أربع خانات نحو الجهة اليمنى .

بدايةً أزحنا النقطة العشرية بمقدار خانتين إلى الجهة اليُمنى :

466.

ثم أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم .466 و بقيت علينا خانتين يتوجب علينا أن نزيح النقطة العشرية إليهما و لذلك فقد وضعنا صفرين مكان الخانتين الناقصتين و قمنا بإلغاء النقطة العشرية:

466.

46600.

46600

إذا ضربنا رقماً عشرياً بمئة ألف فإننا نحرك النقطة العشرية بمقدار خمس 5 خانات نحو الجهة اليمنى (بعدد اصفار المئة ألف) :

4.66987644 × 100000 =466987.644

4.66987644

466987.644

لاحظ كيف أزحنا النقطة العشرية خمس خانات إلى الجهة اليمنى.

و إذا أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم فإننا مكمل الخانات الناقصة بأصفار :

4.66 × 100000 = 466.→ 466000

بعد أن قمت بضرب الرقم العشري 4.66 بمئة ألف توجب علي أن أزيح النقطة العشرية بعدد اصفار المئة ألف أي بمقدار خمسة أصفار و لكنني بعد أن أزحت النقطة العشرية بمقدار خانتين .466 أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم و لذلك فقد أكملت الخانات الثلاثة المتبقية الناقصة بثلاثة أصفار:

466000.

لا تُبقي أبداً على النقطة العشرية خارج الرقم بهذه الطريقة و إنما قم بحذفها لأنه لم يتبقى لها عمل :

466000

و إذا ضربنا رقماً عشرياً بمليون فإننا نحرك النقطة العشرية بمقدار ست 6 خانات نحو الجهة اليمنى (بعدد أصفار المليون 1000000) .

559.087653871 × 1000000=559087653.871

لاحظ كيف قمت بإزاحة النقطة العشرية بمقدار ست خانات نحو الجهة اليمنى.

و بالطبع إن لم تكن هنالك خاناتٌ تكفي و إذا أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم فإننا نكمل الخانات الناقصة بأصفار:

4.77 × 1000000=477.→4770000

بعد أن قمت بضرب الرقم العشري 4.77 بمليون توجب علي أن أزيح النقطة العشرية بعدد أصفار المليون أي بمقدار 6أصفار و لكنني بعد أن أزحت النقطة العشرية بمقدار خانتين .477 أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم و لذلك فقد اكملت الخانات الأربع المتبقية الناقصة بأربعة أصفار:

4770000

****

قسمة الأرقام العشرية

عند إجراء عملية قسمة على رقمٍ عشري فإننا نقوم بخطواتٍ معاكسة للخطوات التي قمنا بها في عملية الضرب، أي أننا نحركُ النقطة العشرية نحو الجهة اليسرى.

تذكر دائماً :

عملية الضرب تعني زيادة = جهة يمنى

عملية القسمة تعني نقصان = جهة يسرى

عند قسمة رقمٍ عشري على الرقم عشرة فإننا نقوم بتحريك النقطة العشرية بمقدار خانة واحدة نحو الجهة اليُسرى:

466 ÷ 10 =46.6

466

46.6

عند قسمة رقمٍ عشري على الرقم مئة فإننا نقوم بتحريك النقطة العشرية بمقدار خانتين اثنتين نحو الجهة اليُسرى:

466 ÷ 100 =4.66

466

4.66

عند القسمة على ألف 1000 فإننا نقوم بتحريك النقطة العشرية ثلاث خانات نحو الجهة اليسرى.

466 ÷ 1000 =0.466

466

0.466

كما ترون فإنني عنما قمت بقسمة الرقم العشري على ألف فقد قمت بتحريك النقطة العشرية بمقدار ثلاث خانات إلى الجهة اليُسرى و عندما أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم فقد وضعت صفراً بعد النقطة العشرية.

عند القسمة على عشرة آلاف فإننا نحرك النقطة العشرية بمقدار 4 أربع خانات (بعدد أصفار الرقم عشرة آلاف 10000) نحو الجهة اليسرى .

$$466 \div 10000 = 0.0466$$

عندما أصبحت النقطة العشرية خارج الرقم اعتبرت بأن هنالك صفراً يمثل الخانة الرابعة الناقصة نقلت النقطة العشرية بعده و أضفت صفراً عشرياً بعده.

تذكر دائماً ب**أن الصفر الذي يهمنا في عملية العد هو الصفر الموجود إلى ميمنة النقطة العشرية لأنه و كما مر معنا سابقاً فإن الصفر الموجود إلى ميمنة النقطة العشرية هو الأكثر أهمية كما انه هو الذي يُحدد منزلة الرقم العشري و ما إذا كان هذا الرقم العشري من عشرة أو من مئة أو من ألف...**

عند القسمة على مئة ألف و بما أن المئة ألف تتألف من خمسة أصفار 100000 فإننا نقوم بتحريك النقطة العشرية بمقدار 5 خمس خانات و نضع مكان الخانات الناقصة التي لا وجود لها أصفاراً ثم لا ننسى وضع صفر بعد النقطة العشرية .

$$466 \div 100000 = 0.00466$$

عند قسمة رقمٍ عشري على مليون فإننا نحرك النقطة العشرية بمقدار ست خانات (بعدد أصفار الرقم مليون) نحو الجهة اليسرى ثم نضع مكان كل خانةٍ فارغة لا وجود لها صفراً ثم نضع صفراً بعد النقطة العشرية.

$$466 \div 1000000 = 0.000466$$

لا تنسى وضع صفر بعد النقطة العشرية

قم بالتدرب على المعلومات التي ذكرتها سابقاً باستخدام آلةٍ حاسبة .

انتبه إلى أن الآلات الحاسبة الموجودة في الأجهزة الذكية تستخدم الفاصلة للفصل بين مراتب الأرقام الصحيحة بينما تستخدم النقطة العشرية لفصل الأجزاء العشرية الأقل من العدد واحد عن الأرقام الصحيحة التي تساوي واحد أو أكثر.

×

ضرب رقمين عشريين ببعضهما البعض

حتى نضرب رقمين عشريين ببعضهما البعض فإننا نقوم أولاً بالتخلص من النقاط العشرية الموجودة في هذين الرقمين ، أي أننا نقوم بتحويل الرقمين العشريين إلى رقمين صحيحين .

لتكن لدينا عملية الضرب التالية :

3.65 ×4.212

لتنفيذ عملية الضرب فإننا نقوم بالتالي:

نقوم بالتخلص من النقطتين العشريتين الموجودتين في كلا هذين الرقمين عن طريق ضربهما بما يناسب كما مر معنا :

ما هو الرقم الذي إذا ضربناه بالرقم العشري 3.65 فإننا نتخلص من النقطة العشرية و نحصل على رقمٍ صحيح؟

إنه الرقم مئة :

100 × 3.65=365

ذلك أن الضرب بالرقم عشرة يعني إزاحة النقطة العشرية خانة واحدة إلى الجهة اليمنى :

3.65 × 10 = 36.5

أما إذا ضربنا هذا الرقم العشري بمئة فإن ذلك يعني إزاحة النقطة العشرية بمقار خانتين إلى الجهة اليمنى اي أنه يعني التخلص من النقطة العشرية:

100 × 3.65=365

الأن نقوم بتحويل الرقم العشري 4.212 إلى رقمٍ صحيح و ذلك عن طريق التخلص من النقطة العشرية.

ما هو الرقم الذي إذا ضربنا به الرقم العشري 4.212 فإننا نتخلص من النقطة العشرية و نحول ذلك الرقم العشري إلى رقمٍ صحيح؟

إنه الرقم ألف :

4.212 × 1000 =4212

ذك ان :

4.212 × 10 =42.12

4.212 × 100 =421.2

4.212 × 1000 =4212

إن الضرب بألف يعني التخلص من النقطة العشرية و إزاحتها إلى يمين الرقم لتصبح بلا قيمة حتى لو وضعنا بعدها مليون صفر :

4212 = 4212.0 = 4212.00 = 4212.000 = 4212.0000....∞

الآن أصبح لدينا رقمين صحيحين نجري عليهما عملية ضربٍ اعتيادية:

4212

×

365

لإنجاز عملية الضرب هذه فإننا نبدأ بالجهة اليمنى من الرقم السفلي أي أننا نبدأ بالعدد 5 حيث نقوم بضربه بجميع الأعداد الموجودة في الرقم 4212 على التوالي :

5 × 2 =10

نثبت الصفر في الأسفل في خانة النتائج و ننقل العدد واحد المتبقي من نتيجة الضرب (كونها عشرة) إلى الخانة التالية :

$421^{1}2$

×

365

0

$5 \times 1 = 5 + 1 = 6$

الواحد محمول من عملية الضرب السابقة .

$421^{1}2$

×

365

60

$5 \times 2 = 10$

نثبت الصفر في الأسفل و ننقل 1 إلى الخانة التالية :

$4^{1}21^{1}2$

×

365

060

5 × 4 = 20

و بما أنه لم تعد هنالك خانة تالية ننقل إليها العدد 2 فإننا نضع النتيجة 20 كما هي و لكننا نضيف إليها العدد المحمول من نتيجة الضرب السابقة أي العدد واحد 1 :

5 × 4 = 20 + 1=21

$4^{1}21^{1}2$

×

365

21060

الأن بعد أن انتهينا من ضرب العدد الأول 5 فإننا نبدأ بضرب العدد التالي أي العدد 6 بالرقم العلوي:

6 × 2 =12

و كما تعلمون فإننا نثبت العدد 2 في خانة النتائج بينما نحمل العدد واحد 1 إلى الخانة التالية :

4212

×

365

21060

2

بما أن العدد 6 يقع في خانة العشرات فإنني أزيح خانة النتائج الخاصة به نحو الميمنة بمقدار خانةٍ واحدة بينما أترك خانة الآحاد فارغة و لذلك فقد تركت خانةً فارغة قبل العدد 2 من الجهة اليمنى.

6 × 1 =6 +1=7

العدد واحد محمول من العملية السابقة :

4212

×

365

21060

7 2

6 ×2 =12

نثبت العدد 2 في خانة النتائج و نحمل 1 للخانة التالية :

العدد واحد محمول من العملية السابقة

بما أنه لم تعد هنالك خانة تالية نحمل العدد المحمول 1 إليها فإننا نثبت الرقم 26 في خانة النتائج كما هو :

4212

×

365

21060

2 7 2

6 × 4 = 24 + 1= 25

4212

×

365

21060

25 2 7 2

الأن نبا بضرب العدد الثالث 3 من الرقم 365 بأعداد الرقم 4212

2×3=6

نثبت العد 6 في السطر الثالث من سطور النتائج بعد خانتين فارغتين:

و بما أن العدد 3 هو من رتبة المئات فإننا نزيح النتائج التي تنتج عن ضرب الأعداد به خانتين حتى تبدأ النتائج في خانة المئات أي في الخانة الثالثة.

4212

×

365

21060

25 2 7 2

6

3 ×1=3

3× 2=6

4212

×

365

21060

25 2 7 2

6 3 6

4×3=12

بما أنه لم تعد هنالك خانة ننقل إليها العدد المحمول 1 فإننا نثبت الرقم 12 كما هو :

4212

×

365

21060

25 2 7 2

1 2 6 3 6

نقوم بترتيب النتائج تحت بعضها البعض مع القيام بترك خانةٍ فارغة قبل نتائج العدد الثاني لأنه عشرات و خانتين فارغتين قبل نتائج العدد الثالث لأنه مئات .

الأن **نقوم بجمع نتائج عملية الضرب مع بعضها البعض بحيث نجمع كل عدد مع الأعداد الموجودة تحته بحيث نحسب الأعداد من المنزلة ذاتها مع بعضها البعض:**

ننزل الصفر إلى خانة نتائج عملية الجمع:

6+2=8

7+6=13

نثبت العدد 3 و نحمل العدد واحد 1 للخانة التالية.

1+2+3 = 6

زائد 1 محمول يساوي 7

2+5+6=13

نثبت العدد 3 و نحمل العدد 1 للخانة لعملية الجمع التالية .

2+2=4

زائد واحد محمول تساوي 5

يبقى لدينا واحد ننزله كما هو :

4212

×

365

21060

+ 25 2 7 2

12	**6**	**3**	**6**

1 5 3 7 3 8 0

ملاحظة هامة جداً :

إذا قمت بإجراء عملية الجمع السابقة باستخدام الآلة الحاسبة دون إجراء أي تعديل فإنني سوف أحصل على نتيجةٍ خاطئة و هي 58968 .

لماذا ؟

لأنني لم أراعي المسافات الفارغة التي قمت بتركها بين كل عملية ضرب و التي يتوجب ملئها بأصفار لأنها تدل على أن منزلة تلك الأرقام متفاوتة و لذلك قبل إجراء عملية الجمع باستخدام الحاسبة فإن علي أن أملأ الخانات الفارغة بأصفار .

21060

+ 25 2 7 20

12	**6**	**3**	**6**	**00**

1 5 3 7 3 8 0

و عندها فإنني سوف أحصل على نتيجة صحيحة.

الآن تبقى أمامنا العملية الأخيرة و هي تحويل النتيجة إلى نتيجة عشرية لأن عملية الضرب الأساسية كما تذكرون كانت بين رقمين عشريين :

3.65×4.212

فكيف نفعل ذلك؟

إن علينا أن نقوم بضرب الرقمين الذين استخدمناهما في التخلص من النقاط العشرية التي كانت في الرقمين العشريين أي الرقمين مئة 100 و ألف 1000 ببعضهما البعض :

100 ×1000=10000

الآن نقوم بقسمة النتيجة السابقة على ناتج الضرب أي عشرة آلاف :

1 5 3 7 3 8 0 ÷10000=15.3738

الآن نتأكد من صحة النتيجة التي توصلنا إليها وذلك باستخدام الآلة الحاسبة:

3.65 ×4.12=15.3738

إذاً فإن العملية التي قمنا بها صحيحة.


حصلت في آلة حاسبة مختلفة على النتيجة التالية 15.038


في عملية جمع نتائج ضرب العد الثاني (عشرات) اترك خانة فارغة أو ضع صفراً .

في عملية جمع نتائج ضرب العد الثالث (مئات) اترك خانتين فارغتين أو ضع صفرين.

في عملية جمع نتائج ضرب العد الرابع (آلاف) اترك ثلاث خانات فارغة أو ضع ثلاثة أصفار.


```
   364
x   32
   728
 10920
 11648
```





$$
\begin{array}{r}
468\ {}^{2\,2} \\
\cdot\quad {}_{1}\ 37\ {}^{5\,4} \\
\hline
3276\quad \\
+1404\quad \\
\hline
17316\quad
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
468\ {}^{2\,2} \\
\cdot\qquad 37\ {}^{5\,4} \\
\hline
3276\quad \\
+1404\quad \\
\hline
\end{array}
$$



قسمة أعداد عشرية على بعضها البعض

ما هو ناتج قسمة

34.12 ÷ 0.66

كما مر معنا عند إجراء عملية ضرب على رقمين عشريين فإنني نقوم أولاً بالتخلص من النقاط العشرية و ذلك لتحويل الرقمين العشريين المقسومين على بعضهما البعض إلى رقمين صحيحين و يتم ذلك من خلال ضرب هذين الرقمين العشريين بأرقام مناسبة (عشرة، مئة، ألف....) و ذلك حتى أتخلص من الأرقام العشرية و ما سوف تتسبب لي به من إرباك :

بكم يتوجب علي أن أضرب المقسوم 43.12 حتى أتخلص من النقطة العشرية؟

10 × 43.12 = 431.2

كما ترون فإنني لم أتخلص من النقطة العشرية عندما ضربت بعشرة و لذلك فإنني أجرب الضرب بمئة :

100 × 43.12 = 4312

تخلصت من النقطة العشرية عندما ضربت بمئة.

الآن ،بكم يتوجب علي أن أضرب الرقم 0.66 حتى أتخلص من النقطة العشرية ؟

10 ×0.66=6.0

كما ترون فإنني لم أتخلص من النقطة العشرية عندما ضربت بعشرة و لذلك فإنني أجرب الضرب بمئة :

100 × 0.66 =66

و بهذا أكون قد تخلصت من النقطة العشرية وذلك عندما ضربت الرقم 0.66 بمئة و بذلك تصبح لدي عملية القسمة التالية :

4312 ÷ 66 =

الآن أجري عملية قسمة اعتيادية :

ناتج القسمة ------------------÷ 66 المقسوم عليه 2 1 3 4 المقسوم

كما نرى فإن الرقم الأول أي 43 هو أقل من المقسوم عليه أي 66 و بذلك فإنني استعين بالعدد الثالث واحد 1 فيصبح لدي الرقم 431 و هو أقل رقم يقبل القسمة على 66 :

431 ÷ 66 = 6.5

أثبت الرقم العشري 6.5 في خانة النتائج كرقمٍ 65 صحيح لأنني لم استعن بصفرٍ عشري .

(عندما لا يكفي المقسوم للقسمة على المقسوم عليه فإنني أضع صفراً افتراضياً أمام المقسوم ثم أجري عملية القسمة و لكنني أضع ناتج القسمة بعد ذلك بعد نقطة عشرية)

65 ناتج القسمة
------------------÷ 66 المقسوم عليه
2 1 3 4 المقسوم

أضرب ناتج القسمة المرحلي 6.5 بالمقسوم عليه 66 :

65 × 66= 4 2 9 0

أضع ناتج عملية الضرب 90 2 4 تحت المقسوم

6.5 ناتج القسمة
------------------÷ 66 المقسوم عليه
- 2 1 3 4 المقسوم
0 9 2 4

أجري عملية طرح :

4312 – 4290 = 22

65 ناتج القسمة
------------------÷ 66 المقسوم عليه
- 2 1 3 4 المقسوم
0 9 2 4
----

2 2

65 ناتج القسمة

-------------------÷ 66 المقسوم عليه

- 2 1 3 4 المقسوم

0 9 2 4 عملية طرح

----

2 2

6.5 ناتج القسمة

-------------------÷ 66 المقسوم عليه

- 2 1 3 4 المقسوم عملية طرح

2 9 2 4

----

2 2



أحاول قسمة الرقم 22 على 66 فأجد بانه لا يقبل القسمة عليه لأنه أقل منه و لذلك فإنني أستعين بصفرٍ عشري ليصبح الرقم 22 على الشكل 220.

6.5 ناتج القسمة

66 المقسوم عليه ÷------------------

- 4 3 1 2 المقسوم

4 2 9 2

----

2 2 0

أقسم 220 على المقسوم عليه 66

220 ÷ 66 = 3.33

هو رقم مستمر لا نهائي 220 ÷ 66 = 3.333333333333333333333333333333

أثبت هذه النتيجة في الأعلى في خانة النتائج و لكنني أثبتها في خانة الأرقام العشرية دون نقطة عشرية لأنه لا يجوز وجود أكثر من نقطة عشرية واحدة في الرقم العشري:

6.5333 ناتج القسمة

66 المقسوم عليه ÷------------------

- 4 3 1 2 المقسوم

4 2 9 2

----

2 2 0

أتأكد من صحة النتيجة التي حصلت عليها باستخدام الآلة الحاسبة :

4312 ÷ 66 =65.333333333333333333333333333

أي

4312 ÷ 66 =65.333

إذاً فإن العملية التي قمت بها صحيحة .



يحق لي عند إجراء عملية القسمة أن أثبت الناتج إن كان رقماً عشرياً في خانة النتائج كرقم صحيح طالما أنني لم أستعن بصفرٍ عشري و طالما كانت هنالك أرقام أخرى لم أجري عليها عملية القسمة أي طالما كان لدي رصيدٌ متبقي.

عندما أعجز عن إكمال عملية القسمة يحق لي الاستعانة بصفرٍ عشري و لكن يتوجب علي عندها أن أضع ناتج عملية القسمة بعد نقطةٍ عشرية.

إذا كان هنالك رقمٌ عشريٌ سابقٌ في النتيجة فإنني أضع الرقم العشري التالي بعده دون نقطة عشرية لأنه لا يجوز أن تكون هنالك أكثر من نقطة عشرية واحدة ضمن الرقم الواحد.

Exponents –index

الرفع للقوة


---

exponent

$$2^{3} = 8$$


base power

$$2^5 = 32$$




التربيع هو ضرب العدد بنفسه مرة واحدة (و ليس مرتين).

التكعيب هو عددٌ تم ضربه بنفسه مرتين (و ليس ثلاث مرات) .





باختصار فإن عدد المرات التي ضربنا فيها العدد بنفسه يمثلها عدد شارات الضرب و ليس عدد الأعداد فإذا كانت هنالك شارة ضربٍ واحدة و عددين كما في حالة الرفع للقوة الثانية (التربيع) فذلك يعني بأننا ضربنا العدد بنفسه مرةً واحدة فقط و ليس مرتين و إذا كانت لدي شارتي ضرب اثنتين كما في حالة الرفع للقوة الثالثة (التكعيب) فذلك يعني بأننا قد ضربنا العدد بنفسه مرتين اثنتين فقط و ليس ثلاثة مرات.



نستخدم التربيع للتعبير عن مساحة سطحٍ ما ، بينما نستخدم التكعيب للتعبير عن حجم جسمٍ ما.

رفع عددٍ ما لقوة ما باستخدام الآلة الحاسبة

حساب مربع عددٍ ما على الآلة الحاسبة :

نُدخل العدد الذي نريد حساب مربعه.

نضغط زر التربيع x^2

قد نحصل على النتيجة مباشرة دون ضغط زر المساواة = .

حساب مكعب عددٍ ما

ندخل العدد الذي نريد حساب مكعبه.

نضغط زر التكعيب (الرفع للقوة الثالثة) x^3 .

لرفع اي عدد لأية قوةٍ كانت :

ندخل العدد الذي نريد رفعه لقوةٍ ما.

نضغط زر الرفع للقوة X^Y .

ندخل العدد الذي يمثل القوة التي نريد أن نرفع لها ذلك العدد.

العدد الذي ندخله قبل ضغط زر الرفع للقوة X^Y هو العدد الذي نريد رفعه لقوةٍ ما بينما العدد الذي ندخله بعد ضغط زر الرفع للقوة X^Y فإنه يُمثل القوة التي نريد أن نرفع ذلك العدد لها.

العوامل، القواسم Factors و المضاعفات multiples

القواسم (العوامل) Factors هي أعداد تقسم عددًا آخر قسمة تامة (مثلًا، 3 عامل من عوامل 12)، بينما **المضاعفات multiples** هي ناتج ضرب عدد في أعداد صحيحة (مثلًا، 12، 24، 36 مضاعفات للعدد 12).

الفرق الرئيسي بينهما: القواسم أو العوامل محدودة العدد وهي أصغر من العدد أو تساويه ، وتُحسب العوامل بعملية القسمة و لذلك فإنها تدعى كذلك بالقواسم ؛ أما المضاعفات فهي غير محدودة العدد وهي أكبر من العدد أو تساويه ، وتُحسب باستخدام عملية الضرب و لذلك فإنها تدعى بالمضاعفات.

Factors العوامل (القواسم)

التعريف: الأعداد التي تقسم عددًا معينًا دون باقٍ.

كيفية إيجادها: باستخدام عملية القسمة (مثلاً 4=3÷12) أو عن طريق إيجاد أزواجٍ عددية حاصل ضربها يساوي العدد المطلوب.

الكمية: محدودة العدد (مثلاً، عوامل (قواسم) العدد 12 هي(1، 2، 3، 4، 6، 12) أي العدد 12 و قواسمه الأقل منه.

عوامل أو قواسم العدد 12 هي {1، 2، 3، 4، 6، 12}.

المضاعفات multiples

التعريف: حاصل ضرب عدد معين في أي عدد صحيح.

كيفية إيجادها: الضرب (مثلاً، 12 × 1، 12 × 2، 12 × 3).

الكمية: غير محدودة العدد (مثلاً، مضاعفات العدد 12 هي 12، 24، 36، 48، ...).

مثال: مضاعفات العدد ١٢ هي {12، 4، 36، ...}.

تشبيه بسيط

فكّر في العوامل على أنها الأجزاء الأساسية التي تُكوّن العدد (أجزاء تماثل العدد في الحجم أو أصغر منه).

فكّر في المضاعفات على أنها نواتج استخدام ذلك العدد كجزءٍ بنائي في تشكيل أرقامٍ كبيرة(مضاعفات أكبر من العدد)

multiples المضاعفات

Factors and multiples

عوامل أو قواسم رقمٍ ما هي الأعداد الصحيحة التي تقسم ذلك الرقم قسمةً تامة، أما مضاعفات عددٍ ما فهي نواتج ضربِ ذلك العدد بعددٍ صحيحٍ آخر.

مثال :

ما هي عوامل (قواسم) العدد 8 ؟

إنها الأعداد التي تقسم ذلك العدد قسمةً متساوية أي القسمة التي يكون ناتجها عداً صحيحاً :

1,2,4,8...

هل العدد 6 من قواسم أو عوامل العدد 8 ؟

لا بالطبع لأنه لا يقبل القسمة الصحيحة (قسمة بناتجٍ صحيح) على العدد 8 :

8 ÷ 6 = 1.333333333333333333333333333333

8 ÷ 8=1

1 عددٌ صحيح إذاً فإن العدد 1 هو من عوامل (قواسم) العدد 8 .

8 ÷ 2 =4

العدد 4 عددٌ صحيح ، إذاً فإن العدد 2 هو من عوامل العدد 8 .

8 ÷ 4 = 2

إذاً فإن العدد 4 هو من عوامل العدد 8 .


و يمكننا القول كذلك بأن عامل أو قاسم عدٍدٍ ما هو العدد الذي إذا ضربناه بعددٍ آخر يُعطينا ذلك العدد :

8= 4 × 2 كلا العددين 8 و 4 هما من عوامل العدد 8 لأننا إذا ضربناهما ببعض فإن الناتج يكون العدد 8.

و من عوامل كل عددٍ كذلك العدد ذاته و العدد واحد.

العدد 8 هو من عوامل العدد 8 .

العدد 1 هو من عوامل العدد 8 .



الأعداد الأولية Prime Numbers

العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه و على العدد واحد 1 .

أي أن لكل عددٍ أولي عاملين (قاسمين) اثنين فقط و هما العدد نفسه و العدد واحد .

مثال العدين 5 و 2 .

أي عدٍدٍ له أكثر من عاملين (قاسمين) اثنين فإنه ليس عدداً أولياً و إنما فإنه عددٌ مركب composite number .


ما بين العددين 2 و100 و باستثناء العددين 2 و 5 لدينا 25 عدداً أولياً .

جميع الأعداد الأولية تنتهي بعددٍ فردي أي 1,3,7,9 (و لكن يُمكن لعددٍ مركب ، غير أولي أن ينتهي بالعدد 5).

لا يُعتبر العدد واحد عدداً أولياً . لماذا ؟

لأن تعريف العدد الأولي أنه عددٌ يقبل القسمة على عددين اثنين فقط حيث أنه يقبل القسمة على نفسه و على العدد واحد بينما لا يقبل العدد واحد القسمة على عدين اثنين ذلك أنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه أي على عددٍ واحد.

لا يوجد إلا عددٌ أولي زوجي واحد فقط و هو العدد 2 فهو يقبل القسمة على نفسه و على العدد واحد .



$7 = 1 \times 7$

$7 = 2\times3 + 1$


$7 = 3\times2 + 1$

$7 = 4\times1 + 3$

$7 = 5\times1 + 2$

$7 = 6\times1 + 1$

$7 = 7 \times 1$



هل العدد 21 عددٌ أولي؟

لا، لأنه يقبل القسمة على العدد 3 و على العدد 7 و على نفسه و على العدد واحد .

3×7=1

21÷ 3=7

21 ÷ 7 = 3

Prime factorization التخصيص الأولي


كل عدٍ صحيح إما ان يكون عدداً أولياً أو عدداً مركباً أي أنه ينتج عن ضرب أعدادٍ أولية ببعضها البعض .

القواسم أو العوامل الأولية prime factors هي الأعداد التي إذا ضربناها ببعضها البعض فإننا نحصل على رقمٍ مركب composite number .

هنالك أعدادٌ صحيحة يمكن تحليلها إلى سلسلة قواسمها (عواملها) الأولية و تدعى عملية إيجاد العوامل الأولية (القواسم الأولية) prime factors لأي عدٍد صحيح بعملية تحليل القواسم أو العوامل الأولية prime factor decomposition ، و لتنفيذ هذه العملية فإننا نصنع شجرة قواسم أو شجرة عوامل factor tree :

315	3
105	3
35	5
7	7
1	


435	3
145	5
29	29



$$315 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$$
$$435 = 3 \cdot 5 \cdot 29$$

160	2
80	2
40	2
20	2
10	2
5	5
1	

$$\Rightarrow 160 = 2^5 . 5$$




2×4=8

2×2=4

16	2
8	2
4	2
2	2
1	

$$\Rightarrow 16 = 2^4$$



$7\times6=42$

$2\times3=6$

تحليل الرقم 84 إلى عوامله (قواسمه) :

الرقم 84 هو عددٌ زوجي even number يقبل القسمة على 2 :

$84 \div 2=42$

الناتج 42 هو كذلك رقم زوجي يقبل القسمة على 2 :

$42 \div 2=21$

و بالطبع فإن الرقم 84 ليس رقماً أولياً و كذلك الرقم 42 لأنها تقبل القسمة على أكثر من عددين اثنين فهي تقبل القسمة على نفسها و على العدد واحد و على العدد 2 و على أعداد أخرى.

هل ناتج التحليل أي الرقم 21 هو عددٌ أولي؟

إنه ليس كذلك فهو يقبل القسمة على نفسه و على العدد واحد و على العددين 3 و 7 .

و بذلك نكون قد أكملنا عملية تحليل الرقم 84 إلى عوامله الأولية و هي :

2,2,3,7

و حتى نتأكد من أن عملية التحليل إلى العوامل الأولية التي قمنا بها صحيحة فإننا نضرب تلك العوامل ببعضها البعض فإذا حصلنا على الرقم الأصلي موضوع التحليل أي الرقم 84 فذلك يعني بأن عملية التحليل التي قمنا بها صحيحة :

$2 \times 2 \times 3 \times 7 = 48$

إذاً فإن عملية التحليل إلى العوامل التي قمنا بها صحيحة.

تحليل الأرقام 80 و 120 و 300 إلى عواملها الأولية:

80	2	120	2	300	2
40	2	60	2	150	2
20	2	30	2	75	3
10	2	15	3	25	5
5	5	5	5	5	5
1		1		1	

$80 = 2^4 \times 5$

$120 = 2^3 \times 3 \times 5$

$300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$

تحليل الرقمين 50 و 80 إلى عواملها الأولية:

50	2	80	2
25	5	40	2
5	5	20	2
1		10	2
		5	5
		1	

$50 = 2 \times 5^2$

$80 = 2^4 \times 5$

تحليل الرقم 6812 إلى عوامله الأولية :

6	8	12	2
3	4	6	2
3	2	3	2
3	1	3	3
1	1	1	

MCD(6,8,12)=2

$mcm(6,8,12)=2^3 \cdot 3 = 24$

القواسم المشتركة (العوامل المشتركة) Common factors

العوامل المشتركة أو القواسم المشتركة بين رقمين أو أكثر هي القواسم أو العوامل التي تكفي لتحليل هذين الرقمين أو تلك الأرقام إلى مكوناتها الأولية.




كما ترون فإن العددين 1 و 2 هما القاسمين أو العاملين المشتركين للأعداد :

4,8,16,3,6,9,18

ذلك أن هذين العددين يكفيان لتحليل جميع الأعداد السابقة إلى مكوناتها الأولية.

ما هي العوامل المشتركة أو القواسم المشتركة للعددين 60 و 48 ؟




إنهما العددين 2 و 3 .

المضاعفات المشتركة Common multiples

المضاعفات المشتركة هي المضاعفات المشتركة لرقمين أو أكثر :

المضاعفات المشتركة للرقمين 3 و 4 :



القاسم المشترك الأكبر – العامل المشترك الأكبر Greatest common factor (CGF)

القاسم المشترك الأكبر هو أكبرعدد يُمكن أن يقسم عدين أو أكثر .

ما هو القاسم المشترك الأكبر للأرقام :

1200,800,1600?

إنه الرقم 400 لأن :

800 ÷ 400 =2

1200 ÷ 400 =3

1600 ÷ 400=4

إذاً فإن الرقم 400 هو أكبر رقم تقبل جميع الأرقام السابقة أن تقسم قسمة صحيحة عليه ، أي أن ناتج قسمتها عليه يكون دائماً عددٌ صحيح بلا أرقام عشرية و لا باقي و لا كسور.

ما هو القاسم المشترك الأكبر أو العامل المشترك الأكبر Greatest common factor

GCF للرقمين 66 و 48 ؟

حتى نحل هذه المسألة نقوم أولاً بتحليل الرقم 66 إلى عوامله الأولية :

$66 \div 2=33$

$33 \div 3 =11$

$11 \times 3 \times 2=66$

11,2,3

نقوم بتحليل الرقم 48 إلى عوامله الأولية :

$48 \div 12 =4$

$4 \div 2 =2$

$2\times2\times12\times1=48$

عوامل الرقم 48 هي 12,2,1

$2^2 \times12=48$

إذاً فإن القاسم المشترك الأكبر للرقمين 66 و 48 هو العدد 2 .


2^2 تعني 2×2

المضاعف المشترك الأصغر The least common multiple (LCM)

لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لرقمين يمكننا استخدام مستقيمي أعداد Number lines

إذا وضعنا مستقيمي أعداد يمثلان مضاعفات عددين يصبح بإمكاننا أن نجد المضاعف المشترك الأصغر لهما :

ما هو المضاعف المشترك الأصغر(أصغر ضعفٍ مشترك) للرقمين 3 و 5 ؟



نقوم بكتابة مضاعفات كلا العدين المطلوب إيجاد مضاعفهما المشترك .

نعاين مضاعفاتهما و نتوقف عند أول مضاعفٍ مشترك نجده في كلا مستقيمي الأعداد.

تذكر دائماً بأن المضاعف المشترك الأصغر هو أول و أقل ضعفٍ لكلا العددين.

ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و 7 ؟

3,9,12,15,18.21,...

7,14,21,28,35...

المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و 7 هو 21 :

3 ×7 =21

ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 و 5 ؟

4: 8|12|16|20|24|

5: 10|15|20|25|

4 × 5=20

ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 10 و 8 ؟

8 | 16 | 24|32|40

10|20|30|40|

نتوقف عن مضاعفة الأعداد بمجرد التوصل لمضاعفين مشتركين.

****

المضاعف المشترك الأصغر Least Common

****

لإيجاد العامل أو القاسم المشترك الأكبر -GCF أي أكبر رقم يمكن قسمة الرقم عليه و المضاعف المشترك الأصغر LCM نقوم برسم شجرة عوامل Factor tree :

جد كلاً من القاسم المشترك الأكبر GCF و المضاعف المشترك الأصغر LCM للرقمين 144 و 72 .

عوامل أو قواسم الرقمين 144 و 72 :

- **Factors of 72:** 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.
- **Factors of 144:** 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144.

نبدأ عملية التحليل إلى العوامل الأولية بقسم الرقم على نفسه و ننهيها بالقسمةعلى العدد واحد.

القاسم المشترك الأكبر للرقمين 144 و 72 هو الرقم 72 لأن الرقم 72 هو أكبر رقم صحيح يقبل كلا الرقمين 144 و 72 القسمة الصحيحة عليه.

ماهو المضاعف المشترك الأصغر LCM للرقمين 144و 72؟

لحساب المضاعف المشترك الأصغر لرقمين فإننا نضربهما ببعضهما البعض ثم نقسم الناتج على قاسمهما المشترك الأكبر .

أي أننا حتى نحسب المضاعف المشترك الأصغر للرقمين 144 و 72 فإننا نضربهما ببعضهما البعض ثم نقسم الناتج على قاسمهما المشترك الأكبر و هو الرقم 72 :

$$\frac{72 \times 144}{72} = 144$$

إذاً فإن المضاعف المشترك الأكبر LCM للرقمين 72 و 144 هو 144 .

ما هو القاسم المشترك الأكبر (العامل المشترك الأكبر)GCF Greatest Common Factor

للرقمين 666 و 416 ؟

666÷ 2 =333

333 ÷ 3=111

111 ÷ 3 =37

37

416

416 ÷ 2 =208

208 ÷ 2 =104

104 ÷ 2=52

52 ÷ 4 =13

666 =2,3,37,3

666 =2×3×37×3

416 =2 ,2,2,4,13

416 =2 ×2×2×4×13

القاسم المشترك الأكبر GCF لرقمين هو العدد الذي يقسم هذين الرقمين قسمةً تامة دون باقي و دون نتيجة قسمة عُشرية.

greatest common factor (GCF)

Factors of 666 are : 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, 666

Factors of 416 are : 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 104, 208, 416

العددان المشتركان بين هاتين القائمتين هما العاملان المشتركان للعددين 666 و416، وهما:

1 و2

من بين هذه العوامل، العدد 2 هو الأكبر، لذا فهو العامل أو القاسم المشترك الأكبر.

العامل المشترك الأكبر للعددين 666 و416 هو 2.

التحليل إلى العوامل الأولية للعددين 666 و416

التحليل إلى العوامل الأولية للعدد 666 هو: 2، 3، 3، 37

التحليل إلى العوامل الأولية للعدد 416 هو: 2، 2، 2، 2، 2، 13

يشترك العددان 666 و416 في عامل أولي واحد هو 2، لذا فهو العامل أو القاسم المشترك الأكبر. إذاً فإن القاسم المشترك الأكبرللرقمين (666، 416) = 2

ما هو المُضاعف المُشترك الأصغر LCM للرقمين 666 و 416 ؟

المضاعف المشترك الأصغر **LCM** لرقمين يُساوي حاصل ضرب هذين الرقمين تقسيم قاسمهما المشترك الأكبر .

لحساب المضاعف المشترك الأصغر لرقمين فإننا نضربهما ببعضهما البعض ثم نقسم الناتج على قاسمهما المشترك الأكبر .

أي أننا حتى نحسب المضاعف المشترك الأصغر للرقمين 666 و 416 فإننا نضربهما ببعضهما البعض ثم نقسم الناتج على قاسمهما المشترك الأكبر و هو العدد 2 :

$$\frac{666 \times 416}{2} = 138528$$

إذاً فإن المضاعف المشترك الأصغر LCM للرقمين 72 و 144 هو 138528 .

يُعرَّف القاسم المشترك الأكبر(Greatest Common Divisor, GCD) بأنه أكبر عدد صحيح موجب يقسم كل عدد من الأعداد الصحيحة المعطاة دون باقٍ.

هل يفترض في كل عددين أياً كانا أن يكون لهما قاسم مشترك أكبر و مضاعف مشترك أصغر؟

نعم، يُفترض عمومًا أن أي عددين صحيحين لهما قاسم مشترك أكبر ومضاعف مشترك أصغر بشرط ألا يكون العددان صفرًا. لأي زوج من الأعداد الصحيحة غير الصفرية يوجد عدد صحيح موجب وحيد هو قاسمهما المشترك الأكبر، وعدد صحيح موجب وحيد هو مضاعفهما المشترك الأصغر.

القاسم المشترك الأكبر(العامل المشترك الأكبر) Greatest Common Divisor أكبر عدد صحيح موجب يقسم كلًا من العددين المعطيين دون باقٍ.

المضاعف المشترك الأصغر Least Common Multiple (LCM) أصغر عدد صحيح موجب يقبل القسمة على كل من العددين المعطيين.

يتطلب تعريف القاسم المشترك الأكبر عادةً أن يكون أحد العددين على الأقل غير صفري. إذا كان كلا العددين يساوي صفرًا، فإن بعض التعريفات تترك القاسم المشترك الأكبر غير مُعرَّف، بينما تُعرِّف تعريفات أخرى القاسم المشترك الأكبر للعددين 0 و0 على أنه صفر للحفاظ على الاتساق في البنى الجبرية.

يكون كل من القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر عددين صحيحين موجبين، حتى لو كانت المدخلات سالبة (على سبيل المثال، المضاعف المشترك الأصغر للعددين -5 و-2 هو 10).

الأعداد الأولية النسبية: إذا لم يكن لعددين أي عامل مشترك سوى 1 (على سبيل المثال، 9 و28)، فإنهما يُعتبران "أوليين نسبيًا"، ويكون قاسمهما المشترك الأكبر هو 1.

بالنسبة لأي عددين صحيحين و (ليس كلاهما صفرًا)، يوجد دائمًا قاسم مشترك أكبر ومضاعف مشترك أصغر.

طريقة أخرى لإيجاد القاسم المشترك الأكبر

إيجاد العامل المشترك الأكبر (القاسم المشترك الأكبر) للرقمين 888 و 666

اقوم بتحليل الرقمين 888 و 666 إلى عواملهما (قواسمهما) و **لكنني في هذه الطريقة لا أثبت الرقم ذاته بين نتائج التحليل يعني لا أقول مثلاً بأن 888 هي من عوامل الرقم 888 لأن 888 تقسيم 1 تعطي 888** :

أقوم بتحليل عوامل الرقمين 888 و 666 :

نبدأ بتحليل الرقم 888 إلى عوامله :

888 ÷ 2 =444

444 ÷ 2 =222

222 ÷ 6 =37

37

إذاً فإن عوامل الرقم 888 هي : 2 ,2,6,37

نتأكد من صحة عملية التحليل بضرب نتائج التحليل ببعضها فإذا حصلت على الرقم موضوع التحليل فذلك يعني بأن العملية التي قُمت بها صحيحة:

2 ×2 ×6 ×37 = 888

الآن نقوم بتحليل الرقم 666 إلى عوامله :

666 ÷ 2=333

333 ÷ 3 = 111

111 ÷ 3 =37

37

إذاً فإن عوامل الرقم 666 هي : 2 ,3,3 37

أتأكد من صحة عملية التحليل بضرب العوامل مع بعضها :

2 ×3 ×3 × 37 = 666

إذاً فإن عمية التحليل صحيحة .

لا ننسى أن نثبت آخر عددٍ نحصل عليه في عملية تحليل العوامل (القواسم) أي العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه و على العدد 1 بين العوامل و هو هنا مثلاً الرقم 37 .

888= 2 ,2,6,37

666= 2 ,3,3 37

ما هي العوامل المشتركة بين هذين الرقمين ، أي ما هي العوامل (القواسم) التي تتكرر في كلا الرقمين ؟

إنها 2 التي تتكرر مرتين و 37 التي تتكرر مرتين كذلك .

أتجاهل جميع العوامل التي لا تتكرر في كلا الرقمين .

الأن أضع العاملين المكررين أي 37 و 2 في عملية ضرب :

$2 \times 37 = 74$

أي أن العامل المشترك الأكبر (القاسم المشترك الأكبر) للرقمين 888 و 666 هو 74 .

الآن أتأكد من صحة العملية التي قمت بها :

$888 \div 74 = 12$

$666 \div 74 = 9$

الآن نقوم بحساب المضاعف المشترك الأصغر للرقمين 888 و 666 .

ما هو المضاعف المشترك الأصغر أي ما هو أول مضاعفٍ مشترك نحصل عليه عند مضاعفة الرقمين 888 و 666 ؟

نقوم باستعراض عوامل (قواسم) الرقمين السابقين كما قمنا بتحليلهما سابقاً:

888= 2 ,2,6,37

666= 2 ,3,3 37

و لكن هذه المرة أقوم بإجراء عملية معاكسة للعملية التي قمت بها سابقاً حيث أقوم بحذف العوامل المشتركة بين الرقمين بينما أبقي العوامل غير المشتركة أي أنني أقوم بحذف العوامل التي تتكرر بينهما:

888= 2 ,2,6,37

666= 2 ,3,3 37

كما ترون فإن لدي عاملين (قاسمين) مكررين بين عوامل كلا الرقمين و هما 2 و 37 أقوم بحذفهما فتتبقى لدي العوامل غير المكررة التالية :3 , 3 , 6 , 2

أقوم بضرب هذه العوامل غير المكررة ببعضها البعض :

2 × 6 × 3 × 3 =108

اقوم بضرب ناتج عملية الضرب أي 108 بالعامل المشترك الأكبر أي القاسم المشترك الأكبر الذي حصلت عليه سابقاً أي الرقم 74 :

108 × 74 = 7992

إذاً فإن الرقم 7992 هو المضاعف المشترك الأصغر أي أول رقمٍ مشترك نحصل عليه عند مضاعفة الرقمين 888 و 666 .

أتأكد من صحة العملية التي قمت بها :


7992 ÷ 888 = 9

7992 ÷ 666 = 12

العملية صحيحة لأنني حصلت على أرقام صحيحة صحيحة أي أن القسمة تامة.



و هنالك طريقةٌ ثانية لإيجاد القاسم المشترك الأكبر (العامل المشترك الأكبر) GCF و المضاعف المشترك الأصغر LCM و ذلك باستخدام مخطط فن Venn diagram حيث أقوم برسم دائرتين متقاطعتين تمثل كلٌ منهما رقماً من الرقمين و أضع في القطاع الذي تتقاطع فيه هاتين الدائرتين العوامل المشتركة بينهما ، بينما أبقي في القطاعين غير المشتركين (غير المتقاطعين) العوامل (القواسم) التي ينفرد بها كلٌ من هذين الرقمين :



لإيجاد القاسم المشترك الأكبر GCF فإنني أقوم بضرب العوامل (القواسم) المشتركة بين الرقمين أي العوامل الموجودة ضمن القطاع المشترك Intersection ببعضها البعض أي 2 و 37 ببعضها البعض :

2 × 37 = 74

لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر فإننا نقوم بضرب العوامل غير المشتركة اي العوامل الموجودة خارج القطاع المشترك :

2,6,3,3

2×6×3×3 = 108

نقوم بضرب ناتج عملية الضرب أي 108 بالعامل المشترك الأكبر أي القاسم المشترك الأكبر الذي حصلت عليه سابقاً أي الرقم 74 :

108 × 74 = 7992

إذاً فإن الرقم 7992 هو المضاعف المشترك الأصغر أي أول رقمٍ مشترك نحصل عليه عند مضاعفة الرقمين 888 و 666 .

نتأكد من صحة النتيجة :

حتى نحسب المضاعف المشترك الأصغر للرقمين 666 و 888 فإننا نضربهما ببعضهما البعض ثم نقسم الناتج على قاسمهما المشترك الأكبر و هو العدد 74 :

$$\frac{666 \times 888}{74} = 7992$$

النتيجة صحيحة .

ترتيب إجراء العمليات الرياضية order of operations

ما هو ناتج العملية التالية :

2+3×4

هل هو 20 أم 14 ؟

أي هل هو ؟

2+3=5×4=20

أم أنه :

2+12=14

إذا وقع عددٌ ما بين شارتين عملياتيتين مثل شارة الضرب و الجمع فإن هاتين الشارتين تتنازعان للحصول على ذلك العدد و الشارة التي تحصل عليه في النهاية هي الشارة الأقوى و في مثالنا السابق فإن شارة الضرب أقوى من شارة الجمع و لذلك فإننا نجري عملية الضرب بين العددين المحيطين بها أولاً ثم نجمع ناتج عملية الضرب مع العدد السابق أي العدد 2 .

أي أن ناتج العملية السابقة الصحيح هو 14 لأنني أضرب 3 بالعدد 4 أولاً ثم أجمع ناتج عملية الضرب مع العدد 2 .

عندما نقوم بتنفيذ معادلة رياضية ما تتألف من عدة عمليات رياضية فإننا نحصل على نتائج مختلفة وفقاً لترتيب تلك العمليات الرياضية و لذلك فلابد من اتباع ترتيبٍ معين عند إجراء العمليات الرياضية و ذلك وفق اختصار يدعى (بيمداس) PEMDAS :

P=parentheses ( ) أقواس

E=Exponents ^ الرفع للقوة

M=multiplication × ضرب

D = division ÷ قسمة

A= Addition جمع

S= Subtraction طرح

أي أننا لا نجري العمليات الحسابية بطريقة خطية تسلسلية و إنما فإننا نجريها بطريقةٍ قافزة بادئين بالعملية الأكثر أولوية و منتهين بالأدنى من حيث الأولوية :

5 × (3+7) = 5 × 10 = 50

و يعني أن تكون الأولوية لعملية رياضية ما أن اقوم بإجرائها ككتلة واحدة ثم أن أضع مكانها نتيجتها .

ففي المثال السابق **قمت بإجراء العمليات المحصورة بين قوسين أولاً أي (3+7) و وضعت مكانها نتيجتها أي 10 ثم اتجهت إلى تنفيذ العملية الأدنى من حيث الأولوية أي عملية الضرب فقمت بضرب العدد 5 بناتج عملية ضرب الأقواس أي 10 و هي العملية التي قمت بإجرائها أولاً** ، و ذلك خشية أن أجري هذه العملية الرياضية على الصورة الخاطئة التالية :

5 × 3 =15 +7=22

و التي هي بالتأكيد نتيجةٌ خاطئة.

Simplify:	5^2 - (2 + 3) × 2	
	5^2 - 5 × 2	Parentheses
	25 - 5 × 2	Exponents
	25 - 10	Multiplication & Division
	15	Addition & Subtraction

إذاً فإنني أبدأ بإجراء العمليات ذات الأولوية الأعلى و أقوم بتنفيذها ككتلةٍ واحدة ثم أضع مكانها نتائجها التنفيذية و بعد ذلك فإنني أقوم بإجراء العمليات الرياضية بطريقةٍ خطية تسلسلية .

أبدأ دائماً بإجراء العمليات الرياضية المحصورة بين قوسين و أجريها ككتلةٍ واحدة و أضع مكانها نتائجها .

$2 + 5 \times 3$

هل اقول بأن النتيجة هي :

$2+5\times3=21$

أم أقول بأنها تساوي :

$2 + 5 = 7 \times 3 = 21$

أم أنها تساوي $2 + 15 = 17$

أي

$2 + (5\times3) = 2 + 15=17$

إذا قمت بإجراء العملية السابقة بشكلٍ خاطئ أي إذا بدأت بالعدد 2 و انتهيت بالعدد 3 فسوف أحصل على نتيجةٍ خاطئة و هي 21 ، أما إذا اتبعت الأولويات فإنني سوف أبدأ بعملية الضرب لأن عملية الضرب مقدمة على عملية الجمع أي أن لها أولوية على عملية الجمع و لذلك فإنني أبدأ أولاً بتنفيذ عملية الضرب :

$5 \times 3=15$


ثم أضع النتيجة التي حصلت عليها أي الرقم 15 ككتلةٍ واحدة مكان عملية الضرب.

$2+15$

الآن أقوم بتنفيذ العملية السابقة بشكلٍ خطي تسلسلي اعتيادي :

$2+15=17$

يمثل الشكل السفلي أولوية العمليات الرياضية فالقرنين هما القوسين ( ) و الحاجبين ^ ^ هما رمزي الرفع للقوة و العين اليمنى هي عملية قسمة ÷ بينما العين اليسرى هي عملية ضرب (رمز عملية الضرب يمكن أن يكون نقطة . أو ×) الأنف شارة جمع + بينما الفم شارة طرح - طالما تذكرت هذا الشكل فلن تنسى أولويات العمليات الرياضية أبداً .



Simplify:	$5n + 3^3 \div 9 - 3(5n - 2n)$	
	$5n + 3^3 \div 9 - 3(3n)$	Parentheses
	$5n + 27 \div 9 - 3(3n)$	Exponents
	$5n + 3 - 9n$	Multiplication & Division
	$-4n + 3$	Addition & Subtraction

Note: Only like terms can be combined.

لتكن لدي العملية التالية :

45 -10 ÷ 5

فهل أقول :

45 -10 ÷ 5 =7

أي هل اقول 45 ناقص 10 تساوي 35 ثم أقول 35 تقسيم 5 تساوي 7 .

أم أقول :

45 -10 ÷ 5 =43

أي :

45 -2 =43

إن الحل الثاني هو الحل الصحيح لأن عملية القسمة مقدمة على عملية الطرح أي أن لعملية القسمة أولوية على عملية الطرح ، أي أنني ابدأ أولاً بإجراء عملية القسمة فأقول :

10 ÷ 5 =2

و أضع ناتج عملية القسمة أي العدد ككتلة واحدة مكان عملية القسمة .

ثم اقوم بعد ذلك بتنفيذ عملية الطرح فاقول :

45 - 2=43

قم بالتدرب على الأولويات باستخدام آلة حاسبة علمية لأن الآلات الحاسبة العلمية تجري العمليات الرياضية وفق هذه الأولويات.



أقوم بالانتباه إلى العمليات ذات الأولوية العليا و أقوم بتنفيذها أولاً بأول فإذا رأيت مثلاً عملية محصورة بين قوسين أقوم بتنفيذها فوراً و أضع نتيجتها و إذا رأيت رقماً مرفوعاً لقوةٍ ما أقوم بتفكيك قوته و إذا رأيت شارة ضربٍ أو قسمة اقوم بتنفيذها على الرقمين المحيطين بها و اسجل نتيجتها .

مثال آخر :

لتكن لدي العملية التالية :

20 -3×4 +2 =

هل اجري هذه العملية بشكلٍ خطي فاقول :

20 -3×4 +2 =

20 -3 =17

17 ×4 = 68

68 + 2 =

70

ام أحسبها على الشكل التالي :

20 -3×4 +2 =

20 – 12 =8

8 + 2 =10

إن الحل الثاني هو الحل الصحيح لأنني راعيت فيه مبدأ أولوية العمليات الرياضية حيث بدأت بالعملية ذات الأولوية العليا من بين العمليات الأخرى الموجودة و كانت عملية الضرب 3×4

فقمت فوراً بتنفيذها على العددين المحيطين بشارة عملية الضرب حتى لا تقوم عمليةٌ أخرى سابقة أو لاحقة ذات أولويةٍ أدنى باعتبار أحد هذين العددين تابعين لها ، ثم إنني قمت بعد ذلك بوضع ناتج عملية الضرب أي 12 بدلاً من عملية الضرب 3×4 و بذلك لن تتمكن عمليةٌ أخرى أو شارة عملياتية سابقة أو لاحقة من سرقة أحد العددين التابعين لعملية الضرب 3 أو 4 .

ثم قمت بعد ذلك بتنفيذ العمليات الرياضية بشكلٍ خطي :

20 -12 +2 = 8 +2=10

إذاً فإن العمليات الرياضية و الشارات العملياتية المختلفة تتنازع فيما بينها حتى تعتبر العدد الملاصق لها خاضعاً لها 3- 20

20 – 3 =17

و لكن وجود عملية ذات أولوية عليا يفرض علينا أن نعتبر العددين المحيطين بها ملكاً لها و منعاً لأن تقوم عمليةٌ أخرى أدنى من حيث الأولوية بسرقة أحدهما فإننا نقوم بتنفيذ هذه العملية ذات الأولوية و نضع مكانها نتيجتها و بذلك فإننا نمنع بذلك أي عملية سابقة أو لاحقة أدنى أولويةً من سرقة أحدهما.

قبل أن تبدأ بحل أي مجموعة عمليات رياضية بطريقة خطية تسلسلية قم بتنفيذ العمليات ذات الأولوية العليا و ضع نتائجها مكانها أي ضع مكان كل عملية نتيجتها.

حالة خاصة :

ماذا لو كانت لدي عمليتين متساويتين من حيث الأولوية مثل عمليتي الضرب و القسمة؟

في مثل هذه الحالة لا تنطبق طريقة الكتل أبداً و إنما فإنني أقوم بإجراء العمليات الحسابية بشكلٍ اعتيادي خطي ابتداءً من الجهة اليسرى و دون تطبيق مبدأ الكتل.

مثال :

12 ÷ 2 × 3

فإذا طبقت مبدأ الأولوية على العملية السابقة و قمت بإجراء عملية الضرب أولاً فسوف أحصل على العدد 6 :

2 × 3 =6

ثم قمت بعد ذلك بإجراء عملية القسمة :

12 ÷ 6 =2

فسوف تكون النتيجة خاطئة و سبب ذلك أنني قمت بتطبيق مبدأ الأولوية من الجهة المعاكسة لجهة العمليات الاعتيادية و هذا لا يصح لأنه **إذا كانت لدي عمليتين متساويتين من حيث الأولوية العملياتية فإننا أقوم بإجرائهما بشكلٍ خطي تسلسلي اعتيادي ابتداءً من الجهة اليسرى** و هذا يعني أن أقوم أولاً بإجراء عملية القسمة 12 ÷ 2 =6 ثم أضع الناتج أي العدد 6 مكان عملية القسمة ثم أجري عملية الضرب :

6 × 3=18

مثال آخر على العمليات المتماثلة من حيث الأولوية (الجمع و الطرح)

$44 - 22 + 14 = 36$

نقوم بتنفيذ عملية الطرح الأولى 22 – 44 و نضع مكانها نتيجتها أي 22 ثم نتابع إجراء عملية الجمع :

$22 + 14 = 36$

كيف نقوم بحل العملية التالية :

$2 + 6^{2} - (8 - 4) \times 3$

أبدأ بتنفيذ العملية ذات الأولوية العليا و هي هنا العملية المحصورة ما بين القوسين (4 - 8) و أضع نتيجتها أي العدد 4 في مكانها.

$2 + 6^{2} - (4) \times 3$

$2 + 6^{2} - \boxed{4} \times 3$

أقوم بتنفيذ العملية ذات الأولوية الثانية و هي عملية الرفع للقوة أي أنني أقوم بتفكيك تلك القوة :

$6^{2} = 6 \times 6 = 36$

أضع ناتج تفكيك القوة أي الرقم 36 مكان العدد 6^2 المرفوع للقوة الثانية.

$2 + \boxed{36} - \boxed{4} \times 3$

أقوم بتنفيذ العملية ذات الأولوية الثالثة و هي عملية الضرب :


$4 \times 3 = 12$

$2 + \boxed{36} - \boxed{12}$

و الآن أقوم بتنفيذ العمليات الرياضية بشكلٍ خطي متسلسل ابتداءً من الجهة اليسرى :

$2 + \boxed{36} - 12 = 38 - 12 = \boxed{26}$

إذاً كما مر معنا فقد كنت أقوم بتنفيذ العمليات ذات الأولوية القصوى أولاً بأول و من ثم فقد كنت أضع ناتج تلك العمليات في موضع تلك العمليات.




تعاريف هندسية عامة

يبلغ قياس الدورة الكاملة ° 360 درجة .


يتراوح قياس الزاوية الحادة acute angle ما بين صفر 0 و °89 درجة .

يبلغ قياس الزاوية القائمة right angle °90 درجة و هي تساوي ربع دورة ذلك أن الدورة الكاملة تبلغ °360 درجة.





يتراوح قياس الزاوية المنفرجة obtuse angle ما بين 91 و °179 درجة .


حيث أن °90 درجة هو قياس الزاوية القائمة بينما °180 درجة هو قياس الزاوية الخطية المستقيمة.





يبلغ قياس الزاوية المستقيمة straight angle (الخط المستقيم) 180° درجة أي نصف دورة كاملة :













الزاوية المنعكسة Reflex angle


الزاوية المنعكسة هي زاويةٌ يتم قياسها من الخارج (و ليس من الداخل كما تقاس بقية الزوايا) و يبلغ قياس هذه الزاوية أكبر من 180° درجة .




زاوية منعكسة (خارجية) يبلغ قياسها °315 درجة و قد تمت الإشارة لها بخطٍ دائري.




الزاوية a زاوية منعكسة و هي زاوية خارجية و قد تمت الإشارة لها بالخط الدائري الأزرق اللون.






زاوية منعكسة (خارجية) يبلغ قياسها °210 درجة و هي الزاوية التي يشار لها بالخط الأزرق اللون و التي تم قياسها من الخارج.



يبلغ قياس الدائرة °360 درجة.


يبلغ مجموع قياس الزوايا التي تؤلف زاوية قائمة °90 درجة.

إذا كان مجموع قياس زاويتين يبلغ °90 درجة فإننا نقول بأن هاتين الزاويتين متكاملتين : complementary angles



زاويتين متكاملتين لأن قياسهما معاً يبلغ 90° درجة :

50 + 40 =90°




زاويتين متكاملتين حيث يبلغ قياسهما معاً 90° درجة :

65 +25=90°

يبلغ قياس جميع الزوايا التي تقع ضمن خطٍ مستقيم 180° درجة.


إذا كان مجموع قياس زاويتين اثنتين يبلغ 180° درجة فإن هاتين الزاويتين توصفان بأنهما زاويتين تكميليتين supplementary angles أو زاويتين خطيتين linear pair of angles

.



زاويتين خطيتين حيث يبلغ قياسيهما معاً 180° درجة فيشكلان بذلك زاوية مستقيمة (خط مستقيم) .

110 + 70 =180°



زاويتين تكميليتين (خطيتين) حيث يبلغ قياسيهما معاً 180° درجة فيشكلان بذلك زاوية مستقيمة (خط مستقيم) .

135+ 45 =180°

يبلغ قياس الزوايا التي تتوضع حول نقطة °360 درجة.




الخطوط المتوازية parallel lines

الخطين المتوازيين هما خطين يكون البعد بينهما ثابتاً مهما امتدا و لذلك فإنهما مهما امتدا لا يلتقيان.

و عندما يتقاطع intersect خطٌ مستقيم مع خطين متوازيين فإنه يشكل زوجاً من الزوايا المتطابقة congruent angles أي الزوايا المتماثلة في القياس .


congruent متطابق – متماثل [كانغرونت'kɑŋgrʊənt كونغرونت'kɒŋgrʊənt adj. صفة

و **عندما يتقاطع مستقيم مستعرض transversal مستقيمين متوازيين أو أكثر فإن هذا المستقيم المستعرض يُشكل زاويتين متطابقتين أو أكثر** و هذه الزوايا تدعى بأسماء متعددة وفقاً لموقعها بالنسبة لبعضها البعض .



الزوايا المتقابلة عمودياً vertically opposite angles

الزوايا المتقابلة بالرأس



الزوايا المتقابلة بالرأس هي أزواج من الزوايا المتساوية التي تقع مقابل بعضها البعض عند نقطة تقاطع خطين مستقيمين، **وهي متطابقة دائمًا (متساوية في القياس) وتشترك في نفس الرأس**.

عند تقاطع خطين، يتكون زوجان من هذه الزوايا، حيث يكون مجموع قياس الزاويتين المتجاورتين على خط مستقيم 180 درجة.


الخصائص الرئيسية: التساوي: إذا كانت إحدى الزوايا تساوي س، فإن الزاوية المقابلة لها تساوي س أيضًا.

التقاطع: يتشكل تحديدًا من تقاطع خطين مستقيمين.

الرأس: تشترك الزاويتان في نقطة رأس واحدة.

التكامل: الزاوية المتقابلة بالرأس مكملة للزاوية المجاورة لها (مجموع قياس الزاويتين 180 درجة). مثال: إذا تقاطع خطان وكانت إحدى الزوايا تساوي 55 درجة، فإن الزاوية المتقابلة بالرأس تساوي 55 درجة أيضًا. الزوايا المتجاورة هي: 180° - 55° = 125°.

الفيزيائية.




انتبه جيداً :


الزاويتين d و b هما زاويتين متقابلتين في الرأس و هما زاويتين متطابقتين تماماً و يجب أن يكون قياسهما واحداً أياً يكن.

الزاوية a هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية b حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.

الزاوية c هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية d حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.



الزاوية c هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية b حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.



الزاويتين c و a هما زاويتين متقابلتين في الرأس و هما زاويتين متطابقتين تماماً و يجب أن يكون قياسهما واحداً أياً يكن.

الزاوية c هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية b حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.


إبحث عن جميع الزوايا المتجاورة الخطية في الشكل السابق ، أي الزوايا التي تُشكل معاً خطاً مستقيماً يبلغ قياسه 180° درجة.

التطبيقات الشائعة للزوايا المتقابلة بالرأس و الزوايا الخطية المتكاملة:

الهندسة: إيجاد الزوايا المجهولة في الأشكال الهندسية.


التصميم/الهندسة: يُستخدم في البناء، والهندسة المعمارية، وبرمجة الأذرع الروبوتية.

البصريات: يُستخدم في تحليل زوايا الضوء في التجارب



الزاويتين 1 و 3 هما زاويتين متقابلتين في الرأس و هما زاويتين متطابقتين تماماً و يجب أن يكون قياسهما واحداً أياً يكن.


الزاوية 1 هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية 4 حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.



الزاويتين 4 و 2 هما زاويتين متقابلتين في الرأس و هما زاويتين متطابقتين تماماً و يجب أن يكون قياسهما واحداً أياً يكن.


الزاوية 4 هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية 3 حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.

إبحث عن جميع الزوايا المتجاورة الخطية في الشكل السابق ، أي الزوايا التي تُشكل معاً خطاً مستقيماً يبلغ قياسه 180° درجة.



الزاويتين C و A هما زاويتين متقابلتين في الرأس و هما زاويتين متطابقتين تماماً و يجب أن يكون قياسهما واحداً أياً يكن.

الزاوية C هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية B حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.




الزاويتين D و B هما زاويتين متقابلتين في الرأس و هما زاويتين متطابقتين تماماً و يجب أن يكون قياسهما واحداً أياً يكن.

الزاوية C هي الزاوية المكملة و المجاورة للزاوية D حيث يبلغ قياس هاتين الزاويتين معاً 180° درجة أي أن هاتين الزاويتين المتجاورتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة.


إبحث عن جميع الزوايا المتجاورة الخطية في الشكل السابق ، أي الزوايا التي تُشكل معاً خطاً مستقيماً يبلغ قياسه 180° درجة.

ما هي الزوايا المتقابلة بالرأس و الزوايا الخطية المتجاورة التي تشكل خطاً مستقيماً يبلغ قياسه 180° درجة في الشكل السفلي؟



الزوايا المتقابلة عمودياً (الزوايا المتقابلة بالرأس) هي الزوايا التي تتشكل على الجهات المتقابلة لخطين متوازيين و هذه الزوايا المتقابلة عمودياً تكون زوايا متطابقة ، اي انها تكون متماثلةُ في القياس.

عندما يقطع مستقيمٌ ما خطين متوازيين تتشكل لدينا 8 ثمانية زوايا متقابلة عمودياً (زوايا متقابلة بالرأس):




الزوايا المتطابقة المتقابلة بالرأس في الشكل السابق :

b,d

c,a

f,h

g,e



الزوايا الخطية المتجاورة التي يبلغ قياسها معاً °180 درجة هي الزوايا :

a,b

c,d

a,d

b,c

f,e

e,h

h,g


g,f

في الزوايا المتقابلة عمودياً اي الزوايا المتقابلة بالرأس فإن كل زاويتين متقابلتين تكونان متساويتين.

في حال الزوايا المتقابلة عمودياً يكون لدينا ثمانية 8 زوايا : أربعة منها تكون زوايا منفرجة (قياسها أكبر من 90° درجة) بينما تكون الزوايا الأربعة الأخرى زوايا حادة قياسها أقل من 90° درجة .


كل زاويتين منفرجتين متقابلتين بالرأس تكونان متساويتين و كذلك فإن كل زاويتين حادتين متقابلتين بالرأس تكونان كذلك متساويتين.

أي ان الزاويتين الحادتين المتقابلتين بالرأس a و c هما متساويتين من حيث القياس و كذلك فإن الزاويتين المنفرجتين المتقابلتين بالرأس b و d هما كذلك متساويتين.



الزاويتين الحادتين المتقابلتين بالرأس e و g هما متساويتين من حيث القياس و كذلك فإن الزاويتين المنفرجتين المتقابلتين بالرأس f و h هما كذلك متساويتين.

يمكننا استخدام المعلومات السابقة في حساب قياس الزوايا ، و على سبيل المثال فإن الزوايا الخطية أو الزوايا المستقيمة يكون قياسها °180 درجة فإذا علمنا قياس إحدى زاويتين متجاورتين تشكلان معاً زاوية خطية و تكملان معاً خطاً مستقيماً فإن بإمكاننا ان نحسب قياس الزاوية ذات القياس المجهول عن طريق طرح الزاوية المعلومة القياس من °180 درجة .



180 - 45=135




corresponding angles الزوايا المتناظرة

تتشكل الزوايا المتناظرة عندما يتقاطع خط مستقيم، يُعرف بالقاطع المتقاطع intersecting transversal ، مع خطين مستقيمين.


الزوايا المتناظرة هي أزواج الزوايا التي تقع في نفس الموضع النسبي عند نقاط تقاطع مختلفة.

على خطٍ مستقيم يتقاطع مع خطين متوازيين فإن الزاويتين التين تقعان على مستقيم واحد تكون إحداهما منفرجة (أكبر من °90 درجة) بينما تكون الثانية زاويةً حادة (أقل من °90 درجة) و قياس هاتين الزاويتين يجب أن يكون °180 درجة.

و بالمقابل فإن الزاويتين اللتين تقعان في الجهة الأخرى تكون إحداهما حادة قياسها مساوي لقياس الزاوية الحادة المقابلة لها من الجهة الأخرى للخط المستقيم ، و كذلك فإن قياس الزاوية المنفرجة يكون مساوياً لقياس الزاوية المنفرجة المقابلة لها.



الزاويتين a و b زاويتين حادتين متناظرتين متطابقتين.



الزاويتين الفا a و بيتا β زاويتين متناظرتين حادتين متساويتين .

و كذلك فإن الزاويتين A و B هما زاويتين منفرجتين متطابقتين (متساويتين).


A+α=180°

لأنهما زاويتين خطيتين تشكلان خطاً مستقيماً فياسه بالطبع 180°.


β+ B=180°

لأنهما زاويتين خطيتين تشكلان خطاً مستقيماً فياسه بالطبع 180°.


فإذا كانت الزاويتين ألفا a و بيتا β زاويتين متناظرتين حادتين متساويتين فيجب حتماً أن تكون الزاويتين المنفرجتين المكملتين لهما أي A و B كذلك متساويتين.



الزاويتين b و f زاويتين حادتين مقابلتين متساويتين و كذلك هي حال الزاويتين المنفرجتين المكملتين لهما إلى زاوية خطية (خط مستقيم) قياسه °180 درجة.



الزاويتين الفا a و بيتا β زاويتين مقابلتين منفرجتين متساويتين حيث يبلغ قياس كلٍ منهما 139.69°.




كما مر معنا سابقاً في فقرة الزوايا المتقابلة بالرأس فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس تكونان متساويتين :

b=c

a=d

e=h

g=f



كل زاويتين متجاورتين تشكلان زاويةً خطية (خطاً مستقيماً) يكون قياسهما معاً °180 درجة.

a+b=180°

b+d=180°

c+d=180°


c+a=180°

e+f=180°

f+h=180°

h+g=180°

g+e=180°



الزوايا المتناظرة الحادة تكون متطابقة مع بعضها البعض :

a=e


d=h

الزوايا المتناظرة المنفرجة تكون متطابقةً مع بعضها البعض:

b=f

c=g

جميع الحالات السابقة تحدث عندما يُقاطع مستقيمٌ قاطع مستقيمين متوازيين.



جميع الزوايا المتقابلة بالرأس بالطبع تكون متساوية (الحادة تساوي الحادة و المنفرجة تساوي المنفرجة) :

6=1

2=5

4=7

8=3


كل زاويتين متجاورتين تشكلان خطاً مستقيماً أي تشكلان زاوية خطية يكون قياسهما معاً 180 درجة :

180=1+5

180=2+6

180=3+7

180=4+8



كل زاويتين حادتين متناظرتين تكونان متطابقتين (يكون قياسهما واحداً) :

7=5


هاتين الزاويتين المتناظرتين تقعان على جهة واحدة هي الجهة اليسرى بالنسبة للمستقيم القاطع للمستقيمين المتوازيين ،

كما أنم أولاهما أي الزاوية العليا 5 تقع خارج المستقيمين المتوازيين (فوق المستقيمين المتوازيين) بينما تقع ثانيهما و هي الزاوية السفلى 7 داخل و ضمن المستقيمين المتوازيين.

4=2

هاتين الزاويتين المتناظرتين تقعان على جهة واحدة هي الجهة اليمنى بالنسبة للمستقيم القاطع للمستقيمين المتوازيين ،

كما أن أولاهما أي الزاوية العليا 2 تقع داخل المستقيمين المتوازيين بينما تقع ثانيهما و هي الزاوية السفلى 4 خارج المتوازيين.




كل زاويتين منفرجتين متناظرتين تكونان متطابقتين (يكون قياسهما واحداً) :

3=1

هاتين الزاويتين المتناظرتين المنفرجتين تقعان على جهة واحدة هي الجهة اليمنى بالنسبة للمستقيم القاطع للمستقيمين المتوازيين ، كما أن أولاهما أي الزاوية العليا 1 تقع خارج المستقيمين المتوازيين بينما تقع ثانيهما و هي الزاوية السفلى 3 خارج المتوازيين.


8=6

هاتين الزاويتين المتناظرتين المنفرجتين تقعان على جهة واحدة هي الجهة اليسرى بالنسبة للمستقيم القاطع للمستقيمين المتوازيين ، كما أن أولاهما أي الزاوية العليا 6 تقع داخل المستقيمين المتوازيين بينما تقع ثانيهما و هي الزاوية السفلى 8 داخل المتوازيين.



الزاويتين a و e زاويتين منفرجتين متناظرتين متساويتين متطابقتين.

لاحظ بأنهما تقعان في جهةٍ واحدة هي الجهة اليسرى، كما أن أولاهما (العليا) a تقع خارج الخطين المتوازيين بينما تقع ثانيهما e داخل الخطين المتوازيين.



الزاويتين b و f زاويتين حادتين متناظرتين متساويتين متطابقتين لاحظ بأنـهما تقعان في جهةٍ واحدة هي الجهة اليمنى.

الزوايا المتبادلة Alternate angles

الزوايا المتبادلة هي أزواج من الزوايا تقع على جانبي قاطع transversal line يقطع خطين متوازيين.

عندما يكون الخطان المتقاطعان متوازيين، تكون الزوايا الداخلية المتبادلة alternate interior angles (داخل الخطين المتوازيين) والزوايا الخارجية المتبادلة alternate exterior angles(خارج الخطين المتوازيين) متساوية.

غالبًا ما يُرمز لها بشكل حرف "Z" أو "N".

الزوايا المتبادلة: هي زوايا غير متجاورةnon-adjacent angles ، تقع على جانبي قاطع و تكون متساوية القياس:

تمييز الزوايا المتبادلة :

يُعد شكل الحرفين زد Z و N أسهل طريقة لتحديد الزوايا الداخلية المتبادلة :

ZN

كما تلاحظون فإن لدينا زاويتين داخليتين متبادلتين في كلٍ من الحرف زد Z و الحرف N:

إذا كانت الخطوط التي يقطعها القاطع متوازية، فإن الزوايا المتبادلة Alternate angles تكون متساوية (متطابقة). الزوايا الداخلية المتبادلة alternate interior angles هي زوايا تقع داخل الخطوط المتوازية (على سبيل المثال، في شكل حرف Z فإن الزوايا هي زوايا داخلية متطابقة).

الزوايا الخارجية المتبادلة: تقع خارج الخطوط المتوازية.

التمييز البصري: يُعد شكل حرف Z أسهل طريقة لتحديد الزوايا الداخلية المتبادلة.

مثال: **إذا قطع خط مستقيم خطين متوازيين وكانت إحدى الزوايا المتبادلة 60 درجة، فإن الزاوية المتبادلة الأخرى تكون أيضًا 60 درجة.**

النظريات الأساسية: نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة: إذا قطع قاطع خطين متوازيين، فإن الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متساوية.

Converse of Alternate Interior Angles Theorem

عكس نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة: إذا قطع قاطع خطين وكانت الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، فإن الخطين متوازيان.


مفاهيم خاطئة شائعة: يجب أن تكون الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية فقط إذا كان الخطان متوازيين. إذا لم تكن الخطوط متوازية، فإن الزوايا لا تزال تسمى "زوايا متبادلة"، لكنها ليست متساوية.

تقع الزاويتين المتبادلتين على جهتين مختلفتين من خطٍ مستقيم يقطع مستقيمين متوازيين و تكون هاتين الزاويتين المتبادلتين متطابقتين congruent أي متماثلتين في القياس .

عندما يتقاطع مستقيمٌ ما مع مستقيمين متوازيين فإنه يُشكل أربع زوايا متبادلة اثنتين منهما تكونان منفرجتين (قياسهما اكبر من 90°) و اثنتين منهما تكونان حادتين قياسهما أقل من 90° درجة .

الزاويتين المنفرجتين تكونان متبادلتين مع بعضهما البعض و كذلك فإن الزاويتين الحادتين تكونان متبادلتين مع بعضهما البعض.

الزاويتين الحادتين المتبادلتين تكونان متطابقتين و كذلك فإن الزاويتين المنفرجتين المتبادلتين تكونان متطابقتين مع بعضهما البعض.




A=B

Y=X

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .

الزاويتين AوB هما زاويتين متبادلتين خارجياً لأنـهما تقعان خارج المستقيمين المتوازيين.

الزاويتين Y وX متبادلتين داخلياً لأنـهما تقعان ضمن المستقيمين المتوازيين.




$\alpha=\beta$

ألفا = بيتا

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .

الزاويتين ألفا α و بيتا β هما زاويتين متبادلتين داخلياً لأنهما تقعان ضمن المستقيمين المتوازيين.




$\alpha=\beta$

ألفا = بيتا

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .

الزاويتين ألفا α و بيتا β هما زاويتين متبادلتين خارجياً لأنهما تقعان خارج المستقيمين المتوازيين.




$\alpha=\beta$

ألفا = بيتا

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .


الزاويتين ألفا α و بيتا β هما زاويتين متبادلتين داخلياً لأنهما تقعان ضمن المستقيمين المتوازيين.



b=g

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .


الزاويتين b و g هما زاويتين متبادلتين خارجياً لأنـهما تقعان خارج المستقيمين المتوازيين.



c=f

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .


الزاويتين c وf هما زاويتين متبادلتين داخلياً لأنـهما تقعان ضمن المستقيمين المتوازيين.



a=h

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .

الزاويتين a و h هما زاويتين متبادلتين خارجياً لأنـهما تقعان خارج المستقيمين المتوازيين.



e=d

تخيل وجود حرف Z أو حرف N .

الزاويتين e و d هما زاويتين متبادلتين داخلياً لأنهما تقعان ضمن المستقيمين المتوازيين.

التمييز بين الزوايا المتناظرة والزوايا الداخلية المتبادلة

يتم التمييز بين الزوايا المتناظرة والزوايا الداخلية المتبادلة عن طريق استخدام الحروف المرئية ("F" مقابل "Z") والتحقق من موقعها بالنسبة للخط القاطع.

الزوايا المتناظرة تتوضع في جهةٍ واحدة كما هي حال زوايا الحرف F بينما الزوايا المتبادلة تتوضع على جهتين مختلفتين كما هي حال زوايا الحرف Z.

تشكل الزوايا المتناظرة شكل "F": فهي تقع في نفس الجانب عند كل تقاطع (مثلاً، كلاهما في الزاوية العلوية اليسرى) وعلى نفس جانب الخط القاطع.

تشكل الزوايا الداخلية المتبادلة شكل "Z": فهي تقع على جانبين متقابلين من الخط القاطع وتقع داخل الخطين المتوازيين.

الزوايا المتناظرة ("نفس الموضع"): إذا كانت الزاوية المتناظرة الأولى هي الزاوية العلوية اليمنى عند التقاطع الأول، فإن الزاوية المتناظرة الثانية هي الزاوية العلوية اليمنى عند التقاطع الثاني.

الزوايا الداخلية المتبادلة (التقاطع الداخلي): تخيّل المساحة داخل الخطين المتوازيين. إذا كانت إحدى الزوايا على يسار الخط القاطع المائل، فإن الأخرى تقع على يمينه.

شرط الخطوط المتوازية: تتساوى الزوايا من كلا النوعين فقط عندما يكون الخطان الذين يقطعهما مستقيمٌ قاطع متوازيين.

يمكن قلب حرف "F" للزوايا المتناظرة، أو عكسه، أو تدويره. وبالمثل، يمكن عكس حرف "Z" للزوايا الداخلية المتبادلة أي أنه لا يشترط بحرفي F و Z الافتراضيين أن يكونا بالوضع السوي إذ يمكن أن يكون الحرف Z على شكل N.

التمييز النهائي ما بين الزوايا المتناظرة و الزوايا المتبادلة :

تقع كلتا الزاويتين المتناظرتين على جهةٍ واحدة فإما أن تقعان كلاهما إلى ميمنة المستقيم القاطع للمستقيمين المتوازيين أو أن تقعا كلتاهما إلى ميسرته.

F

تقع الزاويتين المتبادلتين على جهتين متعاكستين فإن كانت إحداهما إلى ميسرة المستقيم القاطع للمستقيمين المتوازيين فإن الثانية يجب أن تقع إلى ميمنته.

Z N

تتوضع إحدى الزاويتين المتناظرتين ضمن المستقيمين المتوازيين بينما تقع الثانية خارج المستقيمين المتوازيين.

F

إما أن تقع كلتا الزاويتين المتبادلتين ضمن المستقيمين المتوازيين (تبادل داخلي) أو أن تقع كلاهما خارج المستقيمين المتوازيين (تبادل خارجي).

Z N

الزوايا المتقابلة عمودياً (الزوايا المتقابلة بالرأس) هي الزوايا التي يُشكلها مستقيمٌ قاطعٌ لمستقيمين متوازيين و هي ثمانية زوايا تتقابل بالرأس حادة مع حادة و منفرجة مع منفرجة حيث تتقابل زاوية حادة مع زاوية حادة بالرأس كما تتقابل زاوية منفرجة مع زاوية منفرجة بالرأس .

كل زاويتين حادتين تتقابلان بالرأس تكونان متطابقتين و كل زاويتين منفرجتين تتقابلان بالرأس تكونان كذلك متطابقتين مع بعضهما البعض.


الزوايا المتبادلة

هي عبارة عن 4 زوايا ، زاويتين منهما حادتين متطابقتين و الزاويتين الأخريين تكونان منفرجتين و متطابقتين.

تقاس الزوايا بوحدة الدرجة degree و يتم قياسها بأداةٍ تدعى بالمنقلة protractor .


نضع مركز المنقلة عند رأس الزاوية vertex.

نستخدم المنقلة في قياس الزوايا كما تُستخدم في رسم زوايا بقياسٍ معين.



التنـاظر

في الحياة هنالك أشكالٌ متناظرة symmetrical و هنالك أشكالٌ غير متناظرة asymmetric .



الشكل الأيمن غير متناظر بينما الشكل الأيسر متناظر.

و هنالك شكلين من أشكال التناظر : تناظرٌ خطي line symmetry و تناظرٌ دائري(تناظرٌ دوراني) rotational symmetry .


التناظر الخطي : يمكن للأشكال الثنائية الأبعاد أن تكون ذات تناظرٍ خطي و ذلك عندما يُمكن أن يقسمها خطٌ مستقيم إلى جزئين متساويين و هذا الخط يُدعى بخط التناظر line of symmetry .

يمكن لعدة خطوط تناظر أن تقسم شكلٌ ما إلى أجزاء متساوية و ليس خطٌ واحدٌ فقط.


يُمكن لنا أن نطوي الشكل ذو التناظر الخطي إلى نصفين متساويين تماماً.

في المثلث المتساوي الساقين يكون لدينا ثلاثة خطوط للتناظر الخطي :


خط التناظر الأول هو الخط الذي يمر من رأس المثلث ثم يقسم قاعدته إلى نصفين متساويين .



خط التناظر الثاني هو الخط الذي يمر من رأس المثلث الثاني أو زاويته الثانية و يصل إلى منتصف الضلع المقابل لها:



خط التناظر الثالث هو الخط الذي يمر من زاوية المثلث الثالثة إلى منتصف الضلع المقابل:



يحدث **التناظر الخطي**، **أو التناظر الانعكاسي، عندما يقسم خطٌ ما شكلٌ ما إلى نصفين متطابقين تمامًا، كلٌ منهما صورة معكوسة للآخر.**

عند طي الشكل على طول هذا الخط، يتطابق النصفان تمامًا. يمكن أن تكون خطوط التناظر رأسية أو أفقية أو مائلة، وقد تحتوي الأشكال على خطٍ واحد أو عدة خطوط.

الجوانب الرئيسية للتناظر الخطي:

يقسم محور التناظر شكلٌ ما إلى جزئين متطابقين، كلٌ منهما صورة معكوسة للآخر.

axis of symmetry محور التناظر

reflectional symmetry تناظر انعكاسي

Line symmetry خط التناظر.

mirror-image صورة مرآتية

الخط العمودي: يقسم الشكل إلى يمين ويسار (مثلاً وجه الإنسان).

ЖШФmwxм


الخط الأفقي: يقسم الشكل إلى أعلى وأسفل مثل

H BE Ө


الخط القطري: يقسم بزاوية مائلة من الزاوية إلى الزاوية (مثلاً، في المربع).

أمثلة على الأشكال المتناظرة و كيفية تناظرها:


الدائرة تحوي عدد لا نهائي من خطوط التناظر ذلك أن أي خط يصل بين نقطتين على محيط الدائرة و يمر بمركزها (قطر الدائرة) فإنه خط تناظر يقسم الدائرة إلى نصفين متساويين متطابقين.



المربع: 4 خطوط تناظر (أفقي، عمودي، و خطين قطريان مائلان من الزاوية إلى الزاوية).



المستطيل: خطان تناظر (أفقي، عمودي).



لماذا لا يوجد خط تناظر قطري (مائل) في المستطيل؟


لأن خط التناظر الحقيقي هو خط الطي و لا يوجد خط طيٍ قطري في المستطيل و دليل ذلك أحضر قطعة ورق مستطيلة الشكل و حاول أن تطويها بشكل قطري مائل إلى نصفين متساويين و متطابقين . هل يُمكن القيام بذلك؟

لا يُمكن طبعاً.


ارسم خط قطري (مائل يصل بين زاويتين) في قطعة ورق مستطيلة الشكل و حاول طي ذلك المستطيل وفق هذا الخط القطري إلى نصفين متطابقين. هل يمكن القيام بذلك؟



المثلث متساوي الأضلاع Equilateral Triangle : 3 خطوط تناظر.



المثلث متساوي الساقين Isosceles Triangle: خط تناظر واحد.



الشكل غير المتناظر: لا توجد له خطوط تناظر (مثلاً، متوازي الأضلاعparallelogram).

تذكر دائماً بأن خط التناظر هو خط الطي الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين يمكن طيهما بحيث يتطابقان مع بعضهما البعض ، و لذلك أي شكلٍ تشكك في أنه غير متناظر مثل متوازي الأضلاع قم بقص ورقة على شكله و حاول طيها إلى نصفين متطابقين.

أمثلة من الحياة الواقعية على الشكال المتناظرة : الفراشات، ووجوه البشر، والعديد من حروف الأبجدية، غالباً ما تُظهر تناظراً خطياً.

يُطلق على خط التناظرline of symmetry عادةً اسم خط الانعكاس، أو خط المرآة mirror line ، أو محور التناظرaxis of symmetry .

إن عدد أضلاع الشكل المتعدد الأضلاع (المضلع) polygon يساوي دائماً عدد خطوط التناظر فيه.

محور التناظر هو خط وهمي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين تمامًا، أي أنك إذا طويت الشكل على طول هذا المحور، يتطابق النصفان تمامًا. يُسمى أيضًا خط المرآةmirror line .

الخصائص الرئيسية


الانعكاس: أحد جانبي الشكل هو انعكاس تام للآخر حول هذا المحور.

اختبار الطي: عند طي الشكل المتناظر على طول المحور، يتطابق النصفان تمامًا.

الأنواع: يمكن أن يكون محور التناظر رأسيًا (عمودياً) أو أفقيًا أو قطريًا (خط مائل يصل بين زاويتين .

التناظر الدائري أو التناظر الدوراني Rotational symmetry


يُقال عن شكلٍ ثنائي الأبعاد بأنه شكلٌ متناظر تناظرٌ دائري أو تناظرٌ دوراني إذا كان بالإمكان تدويره وفق دوران عقارب الساعة أو بخلاف اتجاه دوران عقارب الساعة دون أن يتغير شكله في أوضاعه كلها.





إن عدد الأوضاع التي تبدوا فيها الأشكال دون تغيير أي و كأنها هي تدعى بالترتيب order.

إن لم يكن لشكلٍ ما تناظرٌ دائري rotational symmetry إي إن لم يحافظ ذلك الشكل على شكله الظاهري عند تدويره فإننا نقول بأن لذلك الشكل تناظرٌ دورانيٌ بترتيبٍ واحد order 1 .



كما ترون فإن المربع قد حافظ على شكله الأول عندما قمت بإدارته بمقدار °90 درجة أربع دورات كل دورة بمقدار °90 (دورة كاملة °360 درجة) وفق اتجاه دوران عقارب الساعة.

90+90+90+90=360°

أي أن للشكل المربع تناظرٌ دوراني من الترتيب 4 .

الشكل المربع متناظرٌ دورانياً.

يكون الشكل الثنائي الأبعاد ذو تناظرٌ خطي line symmetry إذا كان بإمكان خطٍ مستقيم أن يقسمه إلى جزئين متساويين.

يكون الشكل الثنائي الأبعاد ذو تناظرٍ دائري rotational symmetry إذا حافظ على شكله الظاهري الأول عند تدويره باتجاه دوران عقارب الساعة أو بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

يتمتع الشكل بتناظر دوراني عندما يظل متطابقًا تمامًا بعد دورانه دورة كاملة.

عند إتمام دورة كاملة، يمكننا حساب عدد مرات تطابقه مع نفسه.


يُسمى هذا العدد ترتيب التناظر الدورانيOrder of rotational symmetry .

يتمتع الشكل بتناظر دوراني عندما يظل متطابقًا تمامًا بعد دورانه دورة كاملة.

عندما نقوم بتدوير شكل ثنائي الأبعاد دورة كاملة، يمكننا حساب عدد المرات التي يتطابق فيها الشكل مع وضعه الأول. يُسمى هذا العدد رتبة التناظر الدوراني.

أي كم مرة عاد الشكل لوضعه الأول أثناء تدويره دورة كاملة °360 درجة ؟

بالنسبة لمثالنا السابق فقد كان المربع يعود لشكله الأصلي بعد كل ربع دورة ، أي بعد كل تدويرٍ بمقدار °90 درجة و لذلك فقد عاد لوضعيته الأصلية الأولى أربع مراتٍ عندما قمنا بتدويره دورة كاملة °360 درجة.



عدد مرات التطابق خلال الدورة الكاملة يُسمى الرتبة.

We can calculate the angle of each turn! Take the full rotation of 360° :and divide by the order n

Angle of Each Turn = 360°n

symmetry art order 4

Example: Order 4

Angle of Each Turn = 360°4 = 90°

هل يوجد تناظر دوراني من الرتبة الأولى Rotational Symmetry of Order 1؟

إذا كان الشكل يتطابق مع نفسه مرة واحدة فقط عند الدوران (أي بعد دورة كاملة)، فلا يوجد له تناظرٌ على الإطلاق...



حساب زاوية التناظر

يمكننا حساب زاوية كل دورة عن طريق قسمة درجات الدورة الكاملة 360° على الرتبة n:

زاوية كل دورة =n/ 360°

مثال: ما هو قياس زاوية التناظر في شكلٍ تناظره من الرتبة الرابعة كما في مثالنا السابق (مثال المربع) ؟

360°÷4=90°

هو قياس كل زاوية من زوايا التناظر في شكل رتبة تناظره 4.

قمت بقسمة درجات الدورة الكاملة أي 360° درجة على ترتيب التناظر أي 4.

الحرف S عند تدويره له تناظرٌ دائري من الترتيب 2 ORDER2 حيث يحافظ على شكله الطبيعي الأول عند تدويره دورةً كاملة مرتين أي أنه يحافظ على شكله عند تدويره دورةُ كاملة في وضعين اثنين .


S S

ما هو قياس زاوية التناظر في شكلٍ تناظره من الرتبة الثانية كما هي حال الحرف S ؟

360°÷2=180°

هو قياس كل زاوية من زوايا التناظر في شكل رتبة تناظره 2.


قمت بقسمة درجات الدورة الكاملة أي 360° درجة على ترتيب التناظر أي 2.




عندما قمت بتدوير الحرف S دورة كاملة °360 فإنه قد حافظ على شكله الأصلي مرتين فقط.

المُضلعات المُنتظمة

تمتلك المُضلعات المُنتظمة regular polygons عدداً من خطوط التناظر مماثلٌ لعدد أضلاعها ، كما أن هذه الأشكال المنتظمة المتعددة الزوايا تمتلك أعداداً مختلفة من الترتيب الدوراني rotational symmetry .






Isosceles right triangle المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين (المثلث الذي يحتوي على زاوية قائمة يبلغ قياسها 90° .


للمثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين خط تناظرٍ line of symmetry واحد.

يمتلك المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين ترتيب تناظرٍ دائري واحدٍ فقط .

Rotational symmetry order 1



و هذا يعني بأن المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين لا يمتلك تناظراً دورانياً NO **rotational symmetry.**




المثلثات Triangles

المثلث شكلٌ متعدد الزوايا له ثلاثة أضلاع و ثلاث نقاط تلتقي فيها تلك الأضلاع تدعى بالرؤوس vertices و ثلاث زوايا ، **و كل رأسٍ vertex من رؤوس المثلث الثلاثة يُدعى بحرفٍ كبير مثال ΔABC حيث يرمز Δ لكلمة (مثلث).**


المثلث المتساوي الأضلاع Equilateral triangle

يمتلك المثلث المتساوي الأضلاع ثلاثة اضلاع متساوية و ثلاث زوايا متطابقة كذلك و ثلاث خطوط تناظرٍ خطي line symmetry (خطوط مستقيمة تمتد من كل زاوية من زوايا هذا المثلث إلى منتصف الضلع المقابل) ، كما يمتلك هذا المثلث تناظرٌ دوراني rotational symmetry من الترتيب الثالث order 3 ، بمعنى أن هذا المثلث يُحافظ على شكله عندما نقوم بتدويره دورةً كاملة في ثلاثة أوضاع.



زوايا المثلث المتساوي الأضلاع متماثلة القياس أي أن زواياه تكون متطابقة.

يُشار إلى تساوي أطوال أضلاع أو سوق المثلث بخطوط معترضة قصيرة :



المثلث القائم الزاوية Right triangle

المثلث القائم الزاوية هو مثلثٌ يحتوي على زاوية واحدة قائمة (يبلغ قياسها 90°).

في المثلث القائم الزاوية يُمكن أن تكون قياسات جميع الأضلاع مختلفة عن بعضها البعض.

في المثلث القائم الزاوية يمكن أن يكون هنالك ضلعين ذوي قياسٍ متماثل.



من غير الممكن بل من المستحيل في المثلث القائم الزاوية أن تكون جميع أضلاعه متساويةً في الطول.

لماذا ؟

لأن فيه وتر ، و الوتر يجب أن يكون أطول من جميع الأضلاع الأخرى في المثلث القائم الزاوية.

لا يُمكن ان يكون هنالك تناظر symmetry في المثلث القائم الزاوية ، أي لا يمكن قسمته إلى جزئين متطابقين إلا إذا كان فيه ضلعين متساويين في الطول.

أطول ضلعٍ في المثلث القائم الزاوية هو الوتر hypotenuse و هو الضلع الوحيد المائل في المثلث القائم الزاوية ، كما انه الضلع المقابل للزاوية القائمة.


المثلث المتساوي الساقين Isosceles triangle

في المثلث المتساوي الساقين يكون لدينا ضلعين متساويين في الطول.

في المثلث المتساوي الساقين لدينا زاويتين متماثلتين في القياس.

في المثلث المتساوي الساقين يكون لدينا خطٌ واحد للتناظر الخطي بمعنى أن هنالك مستقيمٌ واحد يستطيع أن يقسم المثلث المتساوي الساقين إلى قسمين متطابقين .

في المثلث المتساوي الساقين لا يكون هنالك ابداً تناظرٌ دوراني rotational symmetry بمعنى أن شكله يتغير بمجرد تدويره .



تتم الإشارة إلى الزوايا الحادة المتماثلة في القياس في المثلث بقوس صغير .

المثلث ذو أطوال الأضلاع المختلفة Scalene triangle (المثلث ذو الزاوية المنفرجة أي المثلث الذي يحوي زاوية أكبر من 90°)

تكون أطوال الأضلاع في المثلث ذو الزاوية المنفرجة الأضلاع مختلفة.

لا يوجد ضلعين متماثلين في الطول في المثلث المتباين الأضلاع (المثلث ذو الزاوية المنفرجة).

تكون قياسات جميع زوايا المثلث المتباين الأضلاع (المثلث ذو الزاوية المنفرجة) متباينة و مختلفة.

لا توجد زاويتين متطابقتين أي لا توجد زاويتين متماثلتين في القياس في المثلث المنفرج الزاوية.



يتوضع أطول ضلعٍ في المثلث مقابل أكبر زوايا المثلث قياساً.

مثال : في المثلث القائم الزاوية يتوضع الوتر الذي هو أطول ضلعٍ فيه مقابل الزاوية القائمة °90 درجة و هي بالطبع أكبر زوايا المثلث القائم الزاوية قياساً.

المثلث المتساوي الأضلاع equilateral

في المثلث المتساوي الأضلاع تكون هنالك ثلاثة أضلاع متساوية في الطول و ثلاثة زوايا متطابقة (متساوية في القياس).

في المثلث القائم الزاوية يكون هنالك زاويةٌ واحدة قائمة (قياسها ° 90 درجة) .


في المثلث المتباين الأضلاع (المثلث الذي يحتوي على زاوية منفرجة قياسها أكبر من °90 درجة) لا يوجد ضلعين متساويين في الطول و لا زاويتين متطابقتين (متساويتين في القياس).


الأشكال الرباعية Quadrilaterals


الشكل الرباعي هو شكلٌ ذو أربعة أضلاع و أربع زوايا ، و الأشكال الرباعية هي على نوعين : أشكالٌ رباعية منتظمة و هي الأشكال الرباعية التي تكون أطوال أضلاعها و قياسات زواياها متماثلة ، و أشكال رباعية غير منتظمة و هي الأشكال الرباعية التي تكون أطوال أضلاعها و قياسات زواياها غير منتظمة.


المربع


للمربع أربعة أضلاع متساوية الطول و أربع زوايا متطابقة (قياس كلٍ منها ° 90 درجة) و أربع خطوط تناظرٍ خطي Line symmetry ، أي أن هنالك أربعة خطوط يمكن لكلٍ منها ان يقسم المربع إلى نصفين متساويين.















للمربع تناظر دوراني من الترتيب 4 أي أي أنه عند تدوير المربع دورةُ كاملة فإنه يحافظ على شكله الأول أربع مرات.

Square rotational symmetry of order 4

يوجد في المستطيل خطي تناظرٍ line symmetry أي خطين يقسمان المستطيل إلى نصفين متطابقين.



لماذا يوجد في المستطيل خطي تناظرٍ فقط و ليس أربعة كما في المربع؟


للمستطيلات خطان فقط للتناظر لأن الأضلاع المتقابلة متساوية، وليس جميعها.

خط التناظر هو خط الطي الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين تماماً –أحضر قطعة ورق و حاول أن تطويها بشكلٍ قطريٍ مائل إلى نصفين متساويين؟

هل يمكن ذلك؟ بالطبع لا يُمكن.

غير انه يُمكن طي المستطيل إلى نصفين متطابقين بالطول أو العرض ، و لكن ليس بشكلٍ قطريٍ مائل.

في المستطيل يوجد تناظرٌ دوراني ثنائي الترتيب أي أن المستطيل يحافظ على شكله الأصلي الأول عند تدويره دورةً كاملة مرتين فقط .



متوازي الأضلاع parallelogram

في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين يكونان متساويين و متوازيين .


علامة التوازي عبارة عن سهمين >> أما علامة التساوي فهي عبارةٌ عن خطٌ عمودي أو خطين.


في متوازي الأضلاع تكون كل زاويتين قطريتين متقابلتين بشكلٍ مائل متطابقتين (متساويتين)

.

الزاوية دلتا Δ تساوي الزاوية B لأنهما متقابلتين قطرياً (بشكلٍ مائل)

الزاوية A تساوي الزاوية Γ لأنهما متقابلتين قطرياً (بشكلٍ مائل)





الزاوية D تساوي الزاوية B لأنهما متقابلتين قطرياً (بشكلٍ مائل)

الزاوية A تساوي الزاوية C لأنهما متقابلتين قطرياً (بشكلٍ مائل).

حتى تتأكد من أن شكلاً ما متناظر أو غير متناظر قم بقص قطعة ورق على شكله و قم بطيها قُطرياً (بشكلٍ مائل) ثم قم بطيها بشكلٍ عمودي و إن لم تحصل على نصفين متطابقين فذلك يعني بأن الشكل غير متناظر.

إذا قطع مستقيمٌ قُطري مائل شكلاً ما إلى نصفين فلا يعني ذلك بأن هذا الشكل متناظرٌ قطرياً ما لم يجتز اختبار قطعة الورق.


المَعين Rhombus


المعين شكلٌ رباعي متوازي parallelogram أضلاعه متساوية الطول ، **و كما هي حال متوازي الأضلاع فإن كل زاويتين متقابلتين تكونان متطابقتين.**

لدينا في المُعين خطي تناظرٍ خطي أي أن هنالك خطين مستقيمين يقسمان المعين إلى قسمين متساويين.

الشكل المعين له تناظرٌ دائري ثنائي الترتيب بمعنى أنه عند تدوير الشكل المعين دورةُ كاملة فإنه يحافظ على شكله الأصلي مرتين حاله كحال المستطيل .

Opposite angles are equal






في المَعين كل زاويتين متقابلتين متساويتين.


C=A

D=B




شبه المنحرف Trapezoid

في شبه المنحرف يكون لدينا ضلعين متوازيين غير متساويين في الطول و ضلعين غير متوازيين و لكنهما متساويين في الطول.



Isosceles trapezoid شبه المنحرف متساوي الساقين



Isosceles trapezoid


AB || CD

AD = BC

$\angle A = \angle B$ & $\angle C = \angle D$

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360$


A + C = 180 & B + D = 180





في شبه المنحرف خطٌ واحدٌ فقط للتناظر الخطي.

.

كم وضعاً للتناظر الدوراني لورقة اللعب ، أي في كم وضع عندما نقوم بتدوير ورقة اللعب هذه دورة كاملة تحافظ على شكلها؟








لورقة اللعب هذه و لكل ورقة لعب تناظرٌ دوراني من النمط الثاني order 2 حيث أنها تحافظ على شكلها في وضعين اثنين إذا قمنا بتدويرها دورة كاملة °360 (كحال المستطيل)، و بذلك فإنه في أي وضعية طولية يُمسك بها اللاعب بورقة اللعب فإنه يستطيع رؤية الحرف العلوي بشكلٍ سوي.

لاحظ بأن أوراق اللعب مستطيلة الشكل و تذكر دائماً بأن للشكل المستطيل تناظرٌ دوراني من الترتيب الثاني order 2 أي أنه يُحافظ على شكله إذا قمنا بتدويره دورةً كاملة مرتين أياً كان وضعه الأصلي.

شكل الطائرات الورقية



في شكل الطائرة الورقية لدينا 4 أضلاع كل اثنين منهما متساويين في الطول .

كل ضلعين متجاورين يكونان متساويين في الطول .

في شكل الطائرة الورقية يكون هنالك خطٌ واحد للتناظر الخطي.

لا يوجد في شكل الطائرة الورقية تناظرٌ دوراني بمعنى أننا عندما نقوم بتدوير هذا الشكل فإنه لا يحافظ أبداً على شكله الأصلي.

No rotational symmetry.

إن لم يكن للشكل تناظرٌ دائري فإننا نقول بأن تناظره الدوراني ترتيبه واحد rotational symmetry order 1. يتحقق في وضعه الذي كان عليه في البداية فقط ،أي أننا عندما نديره دورةً كاملة فإنه لا يمر بحالتين اثنتين متماثلتين يكون شكله فيهما واحداً ، أي أنه عند كل إدارة يتخذ شكلاً جديداً لم يتخذه من قبل.

يحتوي الشكل المتعدد الأضلاع المنتظم (المُضلع المنتظم)على زوايا متطابقة (متساوية القياس) و أضلاع متساوية الطول.

أما متعدد الأضلاع غير المنتظم (المُضلع غير المنتظم) فيجب أن يحتوي على الأقل على ضلعين مختلفين في الطول أو زاويتين مختلفتين في القياس.

خواص الأشكال المتعددة الأضلاع polygons (المُضلعات)

متعدد الأضلاع شكلٌ ثنائي الأبعاد 2D له ثلاثة أضلاعٍ مستقيمة أو أكثر و يُسمى متعدد الأضلاع و فقاً لعدد أضلاعه و زواياه .

متعددات الأضلاع المنتظمة Regular polygons

في متعددات الأضلاع المنتظمة تكون جميع الأضلاع متساوية في الطول كما تكون جميع الزوايا متطابقة (متساوية القياس).

أقل عدد للأضلاع و الزوايا في متعددات الأضلاع هو ثلاثة أضلاع و ثلاث زوايا (الشكل المثلث) و تقريباً **لا يوجد حدٌ أقصى لعدد أضلاع عديدات الأضلاع فالميرياغون Myriagon مثلاً له عشرة آلاف ضلع و زاوية.**

Myriagon

المضلع ذو العشرة آلاف ضلع هو شكل هندسي يتكون من عشرة آلاف ضلع. في المضلع المنتظم، يبلغ قياس كل زاوية 179.964 درجة. قد يبدو المضلع المنتظم دائريًا إذا لم يتم تكبيره بدرجة كافية. اشتق اسمه من الكلمة اليونانية القديمة "myriad" التي تعني عشرة آلاف.

في عديدات الأضلاع (المُضلعات) يكون عدد الزوايا مساوياً لعدد الأضلاع.


متعدد الأضلاع المقعر concave polygon (المُضلع المُقعر)

الخصائص التالية للمضلع البسيط تُكافئ جميعها خاصية التحدب:


كل زاوية داخلية فيه لا تتجاوز 180 درجة.


كل قطعة مستقيمة بين رأسين من رؤوس المضلع لا تخرج منه (أي أنها تبقى داخله أو على حدوده).

متعدد الأضلاع المُقعر- المُضلع المُقعر concave polygon



المُقعر المُحدب Convex polygon






جميع زوايا متعدد الأضلاع (المضلع) المنتظم متطابقة (متماثلة في القياس) كما أن جميع أضلاعه متساوية في الطول.


يجب أن يحتوي المُضلع غير المنتظم على ضلعين على الأقل مختلفين في الطول أو زاويتين غير متطابقتين (مختلفتي القياس).

يجب أن يحتوي متعدد الأضلاع (المضلع) المقعر على زاوية منعكسة Reflex angle واحدة على الأقل ، و الزاوية المنعكسة هي الزاوية التي يتم قياسها من الخارج .



لا يحتوي المُضلع المحدب إلا على زوايا حادة (أقل من 90°) أو زوايا منفرجة (أكبر من 90°) .

لا يمكن للمضلع المحدب أن يحتوي على زوايا قائمة 90° أو زوايا منعكسة (منقعرة نحو الداخل) .



الشكل الهندسي الذي يحتوي على الأقل على ضلعين غير متساويين في الطول أو زاويتين غير متطابقتين يوصف بأنه شكلٌ غير منتظم .

هنالك نمطين من الأشكال الغير منتظمة و هي الأشكال المقعرة concave و الأشكال المحدبة convex .


تحتوي الأشكال المتقعرة على زوايا منعكسة (زوايا متقعرة نحو الداخل).

يجب أن يحتوي الشكل المتقعر على زاوية واحدة على الأقل قياسها أكبر من 180° درجة .

جميع زوايا الشكل المحدب إما أن تكون حادة (أقل من 90°) أو منفرجة (أكبر من 90°) و لا يُمكن أبداً للشكل المحدب أن يحتوي على زاوية قائمة 90°.

الزاوية المنعكسة هي زاوية متقعرة منخمصة نحو الداخل يتم قياسها من الخارج.

أضلاع الشكل المحدب تكون متباينةً من حيث الطول.



المثلثات

المثلث شكلٌ ثنائي الأبعاد .


لا يزيد قياس الزوايا الداخلية في المثلث عن 180° درجة.


تشكل زوايا المثلث الداخلية الثلاث مجتمعة زاويةً خطياً أي خطاً مستقيماً يبلغ قياسه بالطبع 180° درجة .

يبلغ مجموع قياس الزوايا الداخلية interior angles triangle في أي مثلث 180° درجة.

في الشكل السفلي كم يبلغ مجموع قياس كلٍ من الزاوية b و الزاوية d ؟

تشكل كلٌ من الزاوية b و الزاوية d زاوية خطية (خطٌ مستقيم) يبلغ قياسها دائماً 180° درجة.






على مستقيم الأعداد ما بين العددين 1- و 1 مثلاً لدينا نصف دورة (خط مستقيم) أي زاوية خطية يبلغ قياسها °180.

لكل مثلث ثلاث زوايا داخلية و يجب أن يكون مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث °180 درجة .

إن قياس الزاوية الخارجية يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين التين لا تمسهما.

لكل زاويةٍ داخلية زاوية خارجية مجاورة تكملها إلى خطٍ مستقيم °180 درجة ، و هذا يعني بأن لدينا ثلاث زوايا خارجية في كل مثلث تكمل كلٌ منهم إحدى زوايا المثلث الى خطٌ مستقيم

يبلغ قياسه بالطبع °180 درجة.



الزاوية الداخلية +الزاوية الخارجية المجاورة لها و التي تُكملها إلى خطٍ مستقيم=180° درجة

الزوايا الخارجية exterior angles


قياس الزوايا الخارجية للمثلث.


يُمكننا قياس الزوايا الخارجية في المثلث عن طريق تمديد كل ضلعٍ من أضلاعه .

إن مجموع قياس زاوية خارجية مع الزاوية أو الزوايا الداخلية المجاورة لها يبلغ حتماً 180° درجة لأننا عن طريق دمج زاوية داخلية مع الزاوية الخارجية المجاورة لها نحصل على زاوية خطية أي خطٌ مستقيم و كما تعلمون فإن الخط المستقيم يبلغ قياسه 180° درجة.

إن مجموع قياس جميع الزوايا الخارجية في المثلث يبلغ 360° درجة أي دورة كاملة أو دائرة كاملة.

إن مجموع قياس جميع الزوايا الداخلية في المثلث يبلغ 180° درجة أي خطٌ مستقيم.


b
a
c
a + b + c = 180°



B
a
c
A
C
b

ما هي العلاقة الرياضية ما بين زاوية المثلث الداخلية و الزاوية الخارجية المجاورة لها؟

إن هاتين الزاويتين تتكاملان معاً لتصنعا زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسه °180 درجة.

ما هي علاقة أي زاوية مثلث خارجية بالزاويتين الأخريين في المثلث غير المجاورتين لها؟

إن قياس أي زاوية خارجية من زوايا المثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين الأخريين غير المجاورتين لها.



طبعاً ° d+e+f=360

الآن أصبحت لدينا مجموعة علاقات ذهبية تمكننا من حساب و قياس زوايا المثلث المجهولة.

مجموع قياس زوايا المثلث الداخلية يساوي °180 درجة.


مجموع قياس زوايا المثلث الخارجية °360 درجة.

مجموع قياس أي زاوية مثلث داخلية مع الزاوية الخارجية المجاورة لها أي الزاوية التي تكملها إلى خطٍ مستقيم يبلغ °180 درجة(قياس الخط المستقيم أو قياس الزاوية الخطية).

قياس أي زاوية داخلية في المثلث + قياس الزاوية الخارجية المجاورة لها =°180 درجة.

قياس كل زاوية خارجية في المثلث يساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها من الجهة الأخرى.

ما هو قياس الزاويتين a و b ؟



كما مر معنا سابقاً فإن مجموع قياس الزاوية الداخلية في المثلث مع الزاوية الخارجية المجاورة و المكملة لها أي التي تكملها إلى خطٍ مستقيم يبلغ °180 درجة لأن قياس الزاوية الخطية (الخط المستقيم) يبلغ °180 درجة فإذا علمنا قياس أحداهما أمكننا معرفة قياس الزاوية الأخرى ، فإذا كان قياس الزاوية الخارجية يبلغ °145 درجة فإن قياس الزاوية الداخلية b المجاورة لها و المكملة لها إلى زاوية خطية (خط مستقيم) يساوي :

$180° - 145° = 35°$

الأن نتوجه لحساب قياس الزاوية a .


كما مر معنا سابقاً فإن مجموع قياس زوايا أي مثلث يجب أن يكون °180 درجة ، فإذا كان قياس رأس هذا المثلث °125 درجة و قياس الزاوية b يبلغ °145 درجة فإن قياس الزاوية a يساوي :

$a = 125°+35°= 160°$

$180° – 160° = 20°$

جمعت قياس الزاويتين المعلومتين ثم طرحت مجموعهما من °180 درجة فحصلت على قياس الزاوية المجهولة الثالثة .

أي أن قياس الزاوية المجهولة a يبلغ °20 درجة.



كم يبلغ قياس الزوايا الخارجية ´Y´,β´,α (المميزة بشارة فتحة) :

كما مر معنا سابقاً فإن قياس الزاوية الخارجية في المثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين (الداخليتين) المقابلتين لها.

Y´=α +β

α´ = y +β

β´ =α +y


كم يبلغ قياس الزوايا الخارجية x,y,z منفردة ؟

كما مر معنا سابقاً فإن قياس الزاوية الخارجية في المثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين (الداخليتين) المقابلتين لها :

X=p+r

Y=p+q

Z=r+q



كم يبلغ مجموع قياس الزوايا الخارجية x,y,z ؟

مجموع قياس الزوايا الخارجية في المثلث يبلغ دائماً 360°

z+y+X=360°

تُحدد الزاوية الخارجية للمثلث بتمديد أحد أضلاعه، مُشكلةً خطًا مستقيمًا مع الزاوية الداخلية المجاورة، ليشكلا معاً زاوية خطية يبلغ قياسها 180° درجة.

الزاوية الخارجية تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها (البعيدتين).

توجد ست زوايا خارجية ممكنة (اثنتان لكل زاوية داخلية).

الزاوية الخارجية ليست أي زاوية خارج المثلث، بل هي الزاوية التي تُشكل خطًا مستقيمًا ( ) مع زاوية داخلية.

الزوايا الست: على الرغم من إمكانية تمديد كل ضلع من الأضلاع الثلاثة في اتجاهين (واحد عند كل طرف)، فإن هذه التمديدات تُنتج زوايا متقابلة بالرأس. ونتيجةً لذلك، توجد ثلاثة قياسات مختلفة فقط للزوايا الخارجية، قياس واحد لكل رأس.

قياس الزاوية الخارجية يساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها أي غير المتجاورتين (المقابلتين)

يبلغ مجموع قياس زوايا الشكل رباعي الأضلاع و الزوايا 360° حتماً فإذا كان لدينا شكلٌ رباعي (رباعي الأضلاع و الزوايا) يحتوي ثلاث زوايا قياسها معلوم يبلغ مجموع قياساتها مثلاً 300° درجة و زاوية واحدة مجهولة القياس فكم يبلغ قياس تلك الزاوية المجهولة؟


بما أن مجموع قياس زوايا الشكل الرباعي يجب أن يكون 360° درجة و بما أن هذا الشكل شكلٌ رباعي الأضلاع و الزوايا و بما أن مجموع قياس ثلاث زوايا من زواياه المعلومة يبلغ 300° درجة فإن قياس الزاوية الرابعة المجهولة فيه يساوي :

$360° - 300° = 60°$

أثبت لي بأن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي الأضلاع و الزوايا يجب أن يكون 360° درجة.

لدينا في المربع و المستطيل أربع زوايا قائمة قياس كلٍ منها 90° درجة حتماً و لذلك فإن مجموع قياساتها يساوي :

$90 + 90+ 90 +90=360°$



الزوايا الخارجية في متعددات الأضلاع (المضلعات) polygon

الزوايا الخارجية كما مر معنا هي الزوايا التي تتشكل عند مد أضلاع الشكل المضلع نحو الخارج.


إن مجموع قياس الزوايا الخارجية في أي مضلع (متعدد أضلاع) يجب أن يكون 360° درجة أي دورة كاملة.

الزوايا الخارجية في مضلعٍ غير منتظم irregular polygon لا تكون متساوية.

و كما هي الحال بالنسبة للمثلث فإن مجموع قياس أي زاوية داخلية في مضلعٍ مع الزاوية الخارجية المجاورة و المكملة لها يجب أن يكون 180° درجة أي زاوية خطية (خطّية) أو خطٌ مستقيم.

يبلغ مجموع قياس جميع زوايا المضلعات polygon 360° درجة حتماً.

يبلغ مجموع قياس الزوايا الخارجية في أي مضلع 360° درجة حتماً أي دورة كاملة .



المضلعات المنتظمة Regular Polygon

يبلغ مجموع قياس الزوايا الخارجية في أي مضلع (متعدد أضلاع) 360° درجة.

قياس الزوايا الخارجية في أي مضلع منتظم يجب أن يكون متماثلاً.

يكون قياس الزوايا الخارجية في أي مضلع منتظم متماثلاً و ذلك بخلاف المضلعات غير المنتظمة حيث يكون قياس زواياها الخارجية مختلفاً ، فإذا قيل لك بأن قياس زاوية ما في شكلٍ مضلع منتظم يبلغ مثلاً °95 درجة و طلب منك معرفة قياس زاوية أخرى مجهولة في ذلك المضلع المنتظم فإن عليك أن تجيب بأن قياس تلك الزاوية المجهولة في ذلك المضلع المنتظم يبلغ كذلك °95 درجة لأن جميع زوايا المضلع المنتظم متماثلةً في القياس.

مجموع قياس الزوايا الخارجية في مضلعٍ منتظم يساوي °360 درجة .



إن قياس الزاوية الخارجية في أي مضلع (متعدد أضلاع) منتظم يساوي 360 تقسيم عدد أضلاع ذلك المضلع المنتظم.

لماذا ؟

لأن مجموع قياس الزوايا الخارجية في متعدد الأضلاع المنتظم (المُضلع المنتظم) يبلغ °360

درجة ، و لأن قياس جميع زوايا متعدد الأضلاع المنتظم يكون واحداً و لأن عدد أضلاع المُضلع المنتظم يساوي عدد زواياه أي أننا عندما نقسم °360 درجة على عدد الأضلاع فإننا نقسم تلك القيمة على عدد الزوايا فنحصل على قياس الزاوية الواحدة.

احسب قياس إحدى الزوايا الخارجية في متعدد أضلاع منتظم ثماني الأضلاع.

نقوم بقسمة °360 درجة على عدد الأضلاع و هو هنا 8 :

$$360 \div 8 = 45°$$

إذاً فإن قياس أي زاوية في متعدد الأضلاع الثماني ذاك يبلغ °45 درجة :

$$45 \times 8 = 360$$

لأن عدد أضلاع المضلع المنتظم يساوي عدد زواياه.

جميع الزوايا الخارجية في متعدد اضلاع منتظم تكون متساويةً في القياس.

الزوايا الداخلية في متعدد أضلاع

Interior angles of a polygon

مر معنا بأن مجموع قياس الزوايا الخارجية في متعدد الأضلاع هو °360 درجة دائماً ، أما بالنسبة لمجموع قياس الزوايا الداخلية في متعدد أضلاع فإنه يرتبط بعدد الأضلاع.

الزوايا الداخلية في متعدد أضلاع محدب


Interior angles of a convex polygon

يمكننا حساب مجموع قياس جميع زوايا متعدد أضلاع محدب عن طريق تقسيم ذلك الشكل إلى عدة مثلثات ، و كما تعلمون فإن قياس جميع زوايا المثلث (أي مثلث) تبلغ حتماً °180 درجة و لذلك و ببساطة شديدة فإن بإمكاننا أن نحسب مجموع قياس أي متعدد اضلاع محدب عن طريق ضرب عدد المثلثات التي يُمكن رسمها في متعدد الأضلاع ذاك بمجموع قياس زوايا المثلث أي °180 درجة.

ما هو مجموع قياس زوايا متعدد أضلاع محدب رباعي quadrilateral .

يتألف متعدد الأضلاع الرباعي المحدب (شكل الطائرة الورقية) من مثلثين اثنين ، و بما أن مجموع قياس زوايا المثلث يبلغ °180 درجة فإن مجموع قياس زوايا الشكل الرباعي يساوي :


$180° \times 2=360°$



ما هو مجموع قياسات زوايا الشكل المحدب الخماسي المتعدد الأضلاع (البينتاغون) شكل مبنى وزارة الدفاع الأمريكية pentagon ؟

انتبه إلى ان المثلثات التي نقسم الشكل إليها تغطي الزوايا الداخلية التي كانت موجودة أصلاً في ذلك الشكل و لا تقوم بتشكيل زوايا داخلية لم يكن لها وجود في الشكل الأصلي.

لتقسيم متعدد أضلاع محدب إلى مثلثات صل زاوية بزاوية فقط و بذلك فإنك لا ترسم زوايا جديدة داخله لم تكن موجودة بالأصل فتحصل على نتائج قياس خاطئة.




يحتوي الخماسي المحدب المتعدد الأضلاع على ثلاثة مثلثات و بما أن مجموع قياس زوايا المثلث يبلغ 180° درجة فإن مجموع قياس الزوايا في خماسيٍ محدب يبلغ :

$180° \times 3 = 540°$

ما هو مجموع قياسات الزوايا الداخلية في شكلٍ سداسي محدب Hexagon ؟


بما أن السداسي المحدب يحتوي على أربعة مثلثات ، و بما أن مجموع قياس زوايا المثلث 180° درجة فإن مجموع قياس الزوايا في شكلٍ سداسيٍ محدب يبلغ :

$4 \times 180° = 720°$



انتبه إلى ان المثلثات التي نقسم الشكل إليها تغطي جميع الزوايا الداخلية الموجودة أصلاً في ذلك الشكل و لا تقوم بتشكيل زوايا داخلية لم يكن لها وجود في الشكل الأصلي أي أننا نحصل عليها عن طريق وصل زاوية بزاوية.

ما هو مجموع قياسات الزوايا الداخلية في مضلعٍ سباعي محدب heptagon ؟



بما ان الشكل السباعي المحدب يحتوي على خمسة مثلثات و بما أن مجموع قياس زوايا المثلث يبلغ °180 درجة فإن مجموع قياس زوايا متعدد أضلاع سباعي محدب يساوي :

$5 \times 180° = 900°$

معادلة حساب مجموع قياس الزوايا الداخلية في أي متعدد اضلاعٍ محدب(مُضلع مُحدب) convex polygon .

n = عدد اضلاع (المُضلع) ، متعدد الأضلاع.

مجموع قياس الزوايا الداخلية في مُضلع مُحدب (متعدد أضلاعٍ محدب) يساوي عدد الأضلاع في متعدد الأضلاع ذاك ناقص 2 ضرب 180° درجة.

Sum of interior angles of a convex polygon=(n-2) × 180°

لماذا؟

لأن عدد المثلثات الموجودة في أي متعدد اضلاعٍ محدب يساوي عدد أضلاع متعدد الأضلاع ذاك ناقص 2 .

أثبت لي هذا الأمر .

يحتوي رباعي الأضلاع على مثلثين :

4 -2=2


4 أضلاع – ناقص 2 = 2 و هو عدد المثلثات الموجودة في المضلع الرباعي كالمربع أو المستطيل).

2 × 180° = 360°

و هو مجموع قياس الزوايا الداخلية في شكلٍ رباعي (كما في المربع أو المستطيل).

90×4=360°

90+90+90+90=360°




يحتوي المُضلع الخماسي على ثلاثة مثلثات .

5 – 2 =3

5 أضلاع ناقص 2 يساوي عدد المثلثات الموجودة في مُضلعٍ خُماسي.

3 × 180° = 540°

هو مجموع قياس الزوايا الداخلية في شكلٍ خماسي.




يحتوي الشكل السداسي على أربعة مثلثات .

6 – 2= 4

6 أضلاع ناقص 2 تساوي عدد المثلثات الموجودة في مُضلعٍ سُداسي أي 4 مثلثات.

4 × 180° = 720°

مجموع قياس الزوايا الداخلية في مُضلعٍ سداسي.




يحتوي الشكل السباعي على خمسة مثلثات .

7 -2 =5

سبعة أضلاع ناقص 2 = 5 و هو عدد المثلثات في الشكل السُباعي.

5 ×180° = 900°

مجموع قياس الزوايا الداخلية في شكلٍ سباعي.



يمكن حساب الزاوية الداخلية في مُضلعٍ منتظم عن طريق قسمة مجموع قياس الزوايا الداخلية في ذلك المُضلع المنتظم على عدد أضلاعه.

لماذا ؟

لأن عدد أضلاع المُضلع المنتظم يُساوي عدد زواياه و لأن قياس جميع الزوايا في مُضلعٍ منتظم موحد.

قياس إحدى الزوايا الداخلية في متعدد اضلاعٍ منتظم = مجموع قياس زواياه الداخلية ÷ عدد أضلاعه.

قياس إحدى الزوايا الداخلية في متعدد اضلاعٍ منتظم يساوي مجموع قياس زواياه الداخلية تقسيم عدد أضلاعه.

لماذا ؟

لأن عدد أضلاع المُضلع المنتظم يُساوي عدد زواياه و لأن قياس جميع الزوايا في مُضلعٍ منتظم موحد.

و بالطبع لا يمكننا حساب قياس زاوية في متعدد اضلاعٍ غير منتظم irregular polygon بالطريقة ذاتها لأن قياس زواياه لا يكون واحداً (قياس كل زاويةٍ من زواياه يكون مختلفاً عن قياس الزاوية الأخرى).

احسب قياس إحدى الزوايا الداخلية في متعدد أضلاعٍ منتظم عدد أضلاعه يبلغ تسعة 9 أضلاع.

اتبع الخطوات التالية :

أقوم أولاً بحساب مجموع الزوايا الداخلية في شكلٍ مضلعٍ مُنتظم ذو تسعة أضلاع وفق طريقة المثلثات التي مرت معنا سابقاً أي عن طريق استخدام المعادلة التي مرت معنا سابقاً:

عدد أضلاع متعدد أضلاعٍ محدب ناقص 2 ضرب مجموع قياس الزوايا الداخلية في المثلث أي 180° درجة ، فأقول بان مجموع قياس الزوايا الداخلية في متعدد أضلاعٍ محدب ذو تسعة أضلاعٍ تساوي :

$9 -2 \times 180° = 7 \times 180° =1260°$

عدد الأضلاع في مُضلعٍ مُنتظم ناقص 2 يُساوي عدد المثلثات في ذلك المُضلع ضرب 180°

درجة و هو قياس الزوايا الداخلية في أي مثلث و هو ما يعطينا مجموع قياس الزوايا الداخلية في ذلك المُضلع المُنتظم.

الآن،قياس إحدى الزوايا الداخلية في متعدد أضلاعٍ محدب ذو تسعة أضلاع يساوي مجموع قياس زواياه و هو هنا °1260 درجة تقسيم عدد أضلاع متعدد الأضلاع المحدب المنتظم و هو هنا 9 فنقول :

1260° ÷ 9 =140°

إذاً فإن قياس زاوية من زوايا شكلٍ محدب منتظم ذو تسعة أضلاع يساوي °140 درجة.

لإيجاد مجموع الزوايا الداخلية في متعدد أضلاعٍ محدب منتظم فإننا نستخدم المعادلة :

n-2×180°

حيث n هو عدد أضلاع المثلث.

لإيجاد قياس زاوية داخلية في متعدد أضلاعٍ منتظم فإننا نقسم مجموع قياس زواياه الداخلية على عدد أضلاعه.

مثال تطبيقي على شكلٍ نعرف قياس زواياه بشكلٍ مسبق

الشكل التالي يمثل متعدد أضلاعٍ خماسيٍ محدب يتألف من خمسة أضلاع و خمس زوايا قياس ثلاثٍ منها °120 و قياس اثنتين منها 90 درجة أي أن مجموع قياس زواياه يساوي :

120+120+120+90+90=540°

يتألف الشكل الخماسي من ثلاثة مثلثات كما مر معنا سابقاً :


عدد أضلاع متعدد الأضلاع ناقص 2 يساوي عدد المثلثات.

5 – 2=3

مجموع قياس زوايا المثلث الداخلية يبلغ °180 درجة.

قياس زوايا ثلاثة مثلثات يساوي :

180° × 3= 540°




الدائرة

الدائرة هي مجموعة نقاط تتوضع جميعها على مسافةٍ واحدة من نقطةٍ ثابتة تقع في المركز و هذه النقاط تشكل ما يدعى بمحيط الدائرة Circumference و هو خطٌ منحني جميع النقاط الموجودة عليه تتوضع على مسافةٍ واحدة من مركز الدائرة.

يُمكن طي الدائرة إلى نصفين متطابقين ، و الخط الفاصل بين هذين النصفين المتطابقين هو قطر الدائرة diameter .


إذاً فإن قطر الدائرة هو خطٌ مستقيم يمر عبر ثلاثة نقاطٍ في الدائرة و هما نقطتين غير متطابقتين على محيط الدائرة و مركز الدائرة.



O هو مركز الدائرة

Δ Oг هو قطر الدائرة

AB وتر الدائرة



гo نصف قطر يصل ما بين مركز الدائرة و نقطة على محيطها.

AOB هو قطر الدائرة و هو مستقيم يمر عبر مركز الدائرة O و يصل إلى نقطتين على محيطها و هما A و B .

و من ناحية التناظر فإن تناظر الدائرة هو تناظرٌ كليٌ و تام حيث يمكن للدائرة أن تدور حول مركزها أو حول محورها دون أن تفقد شكلها أو أن يتغير تناظرها و هذا يعني بأن **تناظر الدائرة هو تناظرٌ خطي لانهائي infinite line symmetry و ذلك لأن كل قطرٍ من أقطار الدائرة**

يمكن أن يكون خط تناظرٍ line of symmetry كما أن تناظر الدائرة هو تناظرٌ دوراني لانهائي infinite rotational symmetry لأنها تبقى كما هي في أي لحظةٍ كانت مهما أدرناها.

يمكن تقسيم الدائرة إلى عدة أجزاء مختلفة :

محيط الدائرة و هو الخط المنحني الذي يحدد أبعاد الدائرة الخارجية.

قطر الدائرة هو المستقيم الذي يمر من نقطتين غير متطابقتين على محيط الدائرة و يمر عبر مركزها.

نصف القطر radius هو خطٌ مستقيم يصل ما بين مركز الدائرة و أي نقطة (نقطة واحدة) على محيط الدائرة و يبلغ طول نصف القطر بالطبع نصف طول قطر الدائرة.

أما وتر الدائرة chord فهو مستقيمٌ يصل بين نقطتين غير متطابقتين على محيط الدائرة و لكن دون أن يمر بمركزها.

يقسم قطر الدائرة الدائرة إلى نصفين متطابقين تماماً ، بينما يقسم الوتر (الذي لا يمر طبعاً عبر مركز الدائرة) الدائرة إلى قطاعين غير متساويين ، و من المستحيل أن يكونا متساويين .

لماذا؟

لأن الوتر عندها لا يكون و تراً بل نصف قطر يمر عبر مركز الدائرة إذ لا يُمكن قسمة الدائرة إلى نصفين متطابقين متساويين إلا إذا مر المستقيم الذي يقسمها عبر مركزها.

يدعى القطاع الدائري الأكبر بالقطاع الدائري الأكبر major segment بينما يدعى القطاع الأقل مساحةً بالقطاع الدائري الأصغر minor segment .


القوس arc


القوس هو جزءٌ من محيط الدائرة .


القطاع الدائري المثلثي sector يشبه في شكله تماماً قالب الجبنة المثلثي ، و القطاع الدائري المثلثي هو جزءٌ من أجزاء الدائرة محصورٌ ما بين نصفي قطرين و قوس .

إنه يشبه قالب الجبنة المثلثي فضلعي قالب الجبنة المستقيمين هما نصفي قطرين ، أما ضلعه المنحني فهو قوس الدائرة (جزءٌ من محيط الدائرة) ، أما رأس قالب الجبنة فيقع عند مركز الدائرة .

يمكن أن تكون القطاعات المثلثية الدائرية غير متساوية و عندها يكون هنالك قطاعٌ مثلثي دائري أكبر و قطاعٌ دائري أصغر.








المماس tangent هو مستقيمٌ يمس محيط الدائرة في نقطةٍ واحدة.

يعني الاستدلال الهندسي استخدام القواعد الهندسية في حل المعضلات.



الجزء الأيسر المكتمل هو جزءٌ من متعدد أضلاع منتظم regular polygon .

كم هي عدد أضلاع متعدد الأضلاع هذا ؟

ما هو قياس الزاوية a ؟

تقع الزاوية a على خطٍ مستقيم تكمله الزاوية الخارجية المجاورة لها ، و كما تعلمون فإن قياس الزاوية الخطية يبلغ ° 180 درجة ، أي الزاويتين أو الزوايا المتجاورة التي تكمل خطاً مستقيماً يكون قياسها معاً °180 درجة و بما أن قياس الزاوية المجاورة °62 درجة فإن قياس الزاوية a يساوي :

$180 – 62 = 118°$

ما هو قياس الزاوية b ؟

الزاوية b هي زاوية خارجية في متعدد الأضلاع المنتظم الأيسر (بينما هي زاوية داخلية في المُضلع الأيمن)

بما أن **الشكل الأيمن هو متعدد أضلاعٍ محدب خماسي الأضلاع غير منتظم فإن مجموع قياس زواياه الداخلية يساوي :**

5-2 × 180° = 3 × 180°= 540°

أي أن المضلع الأيمن يتألف من ثلاثة مثلثات قياس كلٌ منها بالطبع 180° درجة.

و الآن يمكننا حساب قياس الزاوية المجهولة b عن طريق طرح قياس الزوايا المعروفة بالنسبة لنا من مجموع قياس زوايا متعدد الأضلاع أي 540° درجة.

لدينا زاويتين قائمتين في الشكل قياس كلٍ منهما هو بالطبع 90° درجة :

90 + 90 = 180°


لدينا زاوية معروفة بالنسبة لنا يبلغ قياسها 140° درجة :

180 +140 = 320°

و كما ذكرت سابقاً فإن الزاوية a هي الزاوية المجاورة و المكملة للزاوية الخارجية التي يبلغ قياسها 62° درجة .

إن هاتين الزاويتين تشكلان معاً زاويةً خطية (خط مستقيم) يبلغ قياسها 180° درجة ، أي أن قياس الزاوية a يساوي :


180° - 62° =118°



و الآن أصبح بإمكاننا أن نحسب قياس الزاوية المجهولة b عن طريق طرح قياس جميع الزوايا المعلومة القياس من إجمالي قياس زوايا متعدد الأضلاع المحدب الخماسي وهو °540 درجة فنقول :

540 – 180 – 140 -118 =102

أي أن قياس الزاوية b هو °102 درجة.




لحساب قياس الزوايا الداخلية في متعدد الأضلاع المحدب المنتظم الأيسر نستخدم المعادلة :

Sum of interior angles of a convex polygon = (n-2) × 180°

مجموع قياس الزوايا الداخلية في متعدد الأضلاع المحدب تساوي عدد أضلاع متعدد الأضلاع ناقص 2 ضرب 180° درجة ، أي عدد المثلثات الموجودة في ذلك الشكل ضرب مجموع قياس الزوايا الداخلية في المثلث 180° درجة.

الآن أصبح بإمكاننا أن نحسب قياس زاوية واحدة من زوايا متعدد الأضلاع المنتظم الأيسر .




كما ترون فإن **لدينا زاوية خارجية z يبلغ قياسها 123° درجة ، كما ان لدينا الزاوية الداخلية c التي تكمل الزاويتين الأخريين إلى دورةٍ كاملة أي 360° و بالتالي فإن قياس الزاوية C يُساوي :**

360° - Z –B =C

360° – 123° -102°= 135°

و بالتالي فإن قياس الزاوية C يبلغ ° 135 درجة .

رسم كاروكي توضيحي قياس الزوايا كما هو مكتوب قربها و ليس قياسها الحقيقي




150 + 108 +102 =360°

و **بما أن قياس جميع زوايا متعدد الأضلاع المنتظم Regular polygon واحد فإن قياس الزاوية d يجب أن يكون مساوياً كذلك لقياس الزاوية** C أي 135° درجة .

d = c = 135°

رسم كاروكي توضيحي قياس الزوايا كما هو مكتوب قربها و ليس قياسها الحقيقي



حساب عدد اضلاع متعدد الأضلاع المنتظم المحدب الأيسر

لحساب عدد أضلاع متعدد الأضلاع المنتظم علينا أن نعرف قياس إحدى زواياه الخارجية exterior angles و على سبيل المثال فإن **الزاوية e مثلاً هي زاوية مجاورة للزاوية d و تكملها إلى زاويةٍ خطية أي أنها تُكملها إلى خطٍ مستقيم قياسه 180° درجة و بما ان قياس الزاوية الداخلية d يبلغ 135° درجة على اعتبار أن جميع قياسات الزوايا الداخلية في متعدد أضلاعٍ منتظم تكون متماثلة** فنقول :

180 – 135 =45°


أي أن قياس الزاوية الخارجية e هو 45° درجة .

و الآن ي**مكننا حساب عدد أضلاع متعدد الأضلاع المنتظم من خلال قسمة مجموع زوايا متعدد الأضلاع الخارجية أي 360° درجة على قياس إحدى زواياه الخارجية المعروفة** و هي هنا الزاوية e التي يبلغ قياسها 45° :

360 ÷ 45° =8

أي أن متعدد الأضلاع المحدب المنتظم الأيسرهذا هو شكلٌ مُثمن يتألف من ثمانية أضلاع .

رسم كاروكي توضيحي قياس الزوايا كما هو مكتوب قربها و ليس قياسها الحقيقي



و كما مر معنا سابقاً فإن **مجموع الزوايا الخارجية في أي متعدد اضلاعٍ منتظم يساوي °360 درجة بينما قياس زاوية خارجية واحدة من زوايا متعدد أضلاع محدب منتظم تساوي :**

$$\frac{360}{n}$$

حيث n هو عدد أضلاع متعدد الأضلاع.

$45° = \frac{360}{8}$

مجموع قياس الزوايا الداخلية في متعدد أضلاعٍ محدب :

(n-2) × 180°

حيث n هو عدد اضلاع متعدد الأضلاع.

8 – 2= 6

طرحت العدد 2 من عدد أضلاع متعدد الأضلاع هذا فحصلنا على العدد 6 ، أي أن هذا المُضلع يتألف من ستة مثلثات مجموع قياس الزوايا الداخلية لكلٍ منها يبلغ °180 درجة .

6 × 180° = 1080°


قمت بضرب العدد 6 بالرقم °180 فحصلت على مجموع قياس الزوايا الداخلية في متعدد الأضلاع هذا أي °1080.

لأن الشكل المثمن يتألف من ستة 6 مثلثات و المعروف بأن مجموع قياس زوايا المثلث يبلغ °180 درجة أي أن مجموع قياس الزوايا الداخلية في الشكل المثمن يساوي مجموع قياس الزوايا في ستة مثلثات أي °1080.

1080° ÷ 8 =135°

إذا قسمنا مجموع قياس الزوايا الداخلية في المثمن أي °1080 درجة على عدد الزوايا الداخلية في الشكل المثمن و هي ثمانية زوايا فسوف نحصل على قياس زاوية واحدة من الزوايا الداخلية لهذا الشكل و هي °135 درجة.

الكسور Fractions



تستخدم الكسور للتعبير عن جزءٍ من كل ، إنها تعبر عن كم جزءٍ من الكل يوجد.


يتألف الكسر من جزءٍ علوي (البسط) numerator و جزءٍ سفلي (المقام) denominator

يُشير البسط إلى الأجزاء المتوفرة لدينا ، بينما يشير المقام إلى عدد الأجزاء المتساوية التي تم تقسيم الكل إليها فإذا كان لدي قالبي جبنة اثنين من علبة جبنة تتألف من ثمانية قوالب فإنني أعبر عن هذه الحالة بالكسر :

2/8

$$\frac{2}{8}$$

حيث ان العدد 2 هو عدد الأجزاء المتوفرة لدينا بينما العدد 8 هو عدد الأجزاء المتساوية التي تم تقسيم الكل (عبة الجبنة) إليها .




فإذا أكلت قالبي جبنة من أصل علبة جبنة تتسع لثمانية قوالب فإنني أقول بأنني قد تناولت ما نسبته :

2/8

$$\frac{2}{8}$$

يعبر الكسر (و خصوصاً بعد اختزاله) عن نسبة و ليس عن كمية أو مقدار و لذلك فإن أي كسرين يعبران عن النسبة ذاتها هما كسرين متساويين.



اختزال الكسور – اختصار الكسور Scaling down

يمكن اختزال الكسر و تبسيطه من خلال قسمة كلٍ بسطه و مقامه أي قسمة عاليه و أدناه على عددٍ واحد.

مضاعفة الكسور Scaling up

عملية مضاعفة الكسر هي العملية المعاكسة لعملية اختزال الكسور و تعني ضرب كلٍ من بسط الكسر و مقامه (عاليه و أدناه) بالعدد ذاته.

إن المقام (أسفل الكسر) يدل على عدد الأجزاء التي تم تقسيم الكل إليها (الكل يعني هنا العدد واحد أو الوحدة الواحدة) ، أما البسط أو عالي الكسر فهو يدل على عدد الأجزاء المتوفرة لدي من ذلك الكل ،فعلبة الجبنة المثلثات الواحدة التي تحتوي على ثمانية قوالب يتم تمثيلها كسرياً على شكل مقام مقداره 8 و هو يساوي علبة جبنة واحدة .

أما البسط فإنه يشير إلى عدد قوالب الجبنة المتوفرة لدي من تلك القوالب الثمانية ، فإذا كانت لدي ثمانية قوالب جبنة فإنني أعبر عن هذه الحالة بالكسر $\frac{8}{8}$ و هذا الكسر يساوي واحد 1 أي علبة جبنة واحدة.

كل كسرٍ بسطه أقل من مقامه ، أي عاليه أقل من أدناه فإن قيمته تكون أقل من واحد ، و كل كسرٍ عاليه يساوي سافله أي بسطه يساوي مقامه فهو يساوي العدد واحد:

$$\frac{1}{1} = 1$$

$\frac{2}{2}$= 1

$\frac{3}{3}$= 1

$\frac{4}{4}$= 1

$\frac{100}{100}$= 1

$\frac{1000}{1000}$= 1

$\frac{3000}{3000}$= 1

و هكذا إلى ما لا نهاية ...

و لكن ماذا لو كان البسط أكبر من المقام اي ماذا لو كان عالي الكسر أكبر من أدناه؟

إن ذلك يعني بأن هذا الكسر أكبر من العدد واحد 1 و هو ما يدعى بالكسر غير المتناسب improper fraction أو الكسر الذي يتركز ثقله في أعلاه a top-heavy fraction ، و يمكن التعبير عن هذا الكسر غير المتناسب كذلك برقمٍ مختلط ، و الرقم المختلط هو عبارة عن عددٍ صحيح بجواره كسر.

إذاً فإن الكسر الاعتيادي proper fraction هو الكسر الذي تكون قيمته أدنى من واحد ، و هو الكسر الذي يكون بسطه أقل من مقامه أي عاليه أقل من سافله.

$$\frac{6}{8}$$

الكسر السابق هو كسرٌ اعتيادي قيمته أدنى من العدد واحد لأن بسطه أقل من مقامه و إذا مثلناه بعلبة جبنة فإنه يعني بأن لدي ستة قوالب جبنة بينما العلبة تتألف من 8 قوالب أي أن لدي أقل من واحد1 .

الكسر غير المتناسب improper fraction هو كسرٌ قيمته أكبر من واحد 1 أي أن بسطه (عاليه) أكبر من مقامه (سافله) .

مثال الكسر غير المتناسب $\frac{18}{6}$

الأرقام المختلطة mixed numbers و هي الكسور التي تتألف من عددٍ صحيح بجواره كسرٌ اعتيادي متناسب proper fraction حتماً أي عددٌ صحيح و بجواره كسرٌ قيمته أدنى من واحد أي أن مقامه أكبر من بسطه :

$3\frac{2}{8}$

إن المثال السابق إذا طبقته على علب الجبنة فإنه يعني بأن لدي ثلاث علب جبنة كاملة و قالبي جبنة منفردين.

ماذا يعني أن يكون البسط أكبر من المقام ؟


إن المقام (أدنى الكسر) هو المفتاح الذي يحدد لنا قيمة الواحد أو قيمة الوحدة الواحدة المتكاملة في الكسر فالعدد 8 في علب جبنة المثلثات يعني بأن الكل أو 1 واحد أي علبة الجبنة الكاملة تتألف من ثمانية قوالب، فالكسر $\frac{8}{8}$ يعني بأنه تتوفر لدينا ثمانية قوالب جبنة أي علبة جبنة كاملة لأن علبة الجبنة الكاملة تتألف من ثمانية قوالب ، و لو قلت $\frac{16}{8}$ فذلك يعني بان لدي علبتي جبنة كاملتين أي 16 قالب و لو قلت $\frac{12}{8}$ فذلك يعني بأن لدي علبة و نصف جبنة:

8 +4 =12

و لو قلت $\frac{10}{8}$ فذلك يعني بأن لدي علبة جبنة و ربع ، اي علبة جبنة 8 قوالب و قالبين منفردين ، و لو كتبت $\frac{24}{8}$ فذلك يعني بأن لدي ثلاث علب جبنة تتألف كلٌ منها من ثمانية قوالب :

8 × 3=24

تذكر دائماً بأن المقام أو سافل الكسر هو المفتاح الذي يحدد لنا من كم جزء تتألف الوحدة الكاملة (واحد) أو إلى كم جزءٍ تم تقسيم الوحدة الكاملة 1 .



تحويل الكسر غيرالمتناسب improper fraction (أي الكسر الذي بسطه أكبر من مقامه و الذي قيمته أكبر من واحد) إلى رقمٍ مختلط (عددٍ صحيح و كسر).

ليكن لدي الكسر غير المتناسب $\frac{19}{8}$ و هو يساوي علبتي جبنة كاملتين 8+8=16 و 3 ثلاثة قوالب :

3 +16=19

لتحويل كسرٍ غير متناسب إلى رقمٍ مختلط فإنني أقوم بالخطوات التالية :

أقسم البسط على المقام :

19 ÷ 8 =2.4

أضع العدد الصحيح أي العدد 2 بجوار الكسر و أجعل من العدد العشري (الكسر) 4 بسطاً للمقام القديم ذاته أي 8 ليصبح لدي الرقم المختلط التالي :

$2\frac{4}{8}$

الكسر غير المتناسب $\frac{20}{8}$ يساوي الرقم المختلط $2\frac{4}{8}$.

تحويل رقمٍ مختلط إلى كسرٍ غير متناسب improper fraction

لتحويل رقمٍ مختلط إلى كسرٍ غير متناسب فإننا نضرب العدد الصحيح المرافق للكسر بمقام الكسر (أدنى الكسر) ثم نضيف الناتج إلى البسط أي أعلى الكسر.

ليكن لدي الرقم المختلط $4\frac{2}{8}$ و هو يعني بأن لدي أربع 4 علب جبنة كاملة أي 32 قالب جبنة و قالبين منفردين $\frac{2}{8}$.

لتحويل هذا الرقم المختلط إلى كسر غير متناسب (عاليه أكبر من سافله و قيمته أكبر من واحد) فإنني أضرب العدد الصحيح أيٍ العدد 4 بالمقام 8 :

$4 \times 8 = 32$

ثم أضيف البسط لناتج عملية الضرب :

$32 + 2 = 34$

ثم أضع الناتج بسطاً لمقام الكسر فأحصل على الكسر غير المتناسب $\frac{34}{8}$ و بالفعل فإن الكسر غير المتناسب $\frac{34}{8}$ يساوي الرقم المختلط $4\ \frac{2}{8}$ و هو يعني بأن لدي 4 علب جبنة كاملة و قالبين منفردين.

ليكن لدي الكسر غير المتناسب $\frac{19}{8}$ و هو يعني بالنسبة لمثال علب الجبنة بأن لدي علبتي جبنة كاملتين $8+8=16$ و ثلاثة قوالب منفردة .

لتحويل هذا الكسر غير المتناسب إلى رقمٍ مختلط (عدد صحيح و كسر) :

اقسم البسط 19 على المقام 8 :

$19 \div 8 = 2.3$

أضع العدد الصحيح 2 بجوار الكسر بينما أجعل الرقم العشري أو باقي القسمة أي العدد 3 بسطاً للمقام ذاته فأحصل على الرقم المختلط $2\frac{3}{8}$

الكسر غير المتناسب $\frac{19}{8}$ يساوي الرقم المختلط $2\frac{3}{8}$.



مقارنة الكسور

من الصعب مقارنة الكسور إذا كانت مقاماتها غير متماثلة و لذلك لا بد أولاً من القيام بتوحيد المقامات و ذلك عن طريق إيجاد المضاعفات المشتركة common multiples حيث نقوم باستعراض المضاعفات المشتركة لكل مقام حتى نعثر على المقام المشترك الأصغر the least common denominator LCD فنجعل من هذا المقام المشترك الأصغر مقاماً مشتركاً لكلا هذين الكسرين.

قم بترتيب الكسور التالية :

$\frac{2}{5}$، $\frac{4}{15}$, $\frac{3}{10}$

أقوم بتسجيل مضاعفات كل مقام من مقامات هذه الكسور الثلاثة :

5 : 10 , 15 , 20 , 25 , **30** , 35 , 40 , 45
10 : 20 , **30** ,40 ,50 ,60
15 : **30** , 45 , 60 , 75 , 90

كما ترون فإن المضاعف المشترك الأصغر للمقامات 5 , 10 ,15 هو 30 و لذلك فإننا نتخذ منه مقاماً مشتركاً ، و لكن علينا الانتباه دائماً إلى أن الكسر هو نسبةٌ بين عددين و ليس مقداراً و حتى لا تختل تلك النسبة و حتى نحافظ على تلك النسبة و ذلك التناسب فإن علينا أن نضرب عالي الكسر أي البسط كذلك بالعدد ذاته الذي ضربنا به المقام (أدنى الكسر) حتى يصبح 30 .

بالنسبة للكسر $\frac{2}{5}$ فإننا نضرب 5 ب 6 حتى تصبح 30 و كذلك فإن علينا أن نضرب البسط 2 بالعدد 6 :

2 × 6 =12

فنحصل على الكسر $\frac{12}{30}$ و بالنسبة للكسر $\frac{3}{10}$ فإننا نضرب الرقم عشرة بالعدد 3 ليصبح 30 و كذلك فإننا نضرب البسط 3 بثلاثة فيصبح هذا الكسر $\frac{9}{30}$ ، و بالنسبة للكسر $\frac{4}{15}$ فإننا نضرب المقام 15 بالعدد 2 :

$2 \times 15 = 30$

و لا ننسى كذلك أن نضرب البسط أي العدد 4 بالعدد ذاته الذي ضربنا به المقام أي العدد 2

$2 \times 4 = 8$

و بذلك أصبح بإمكاننا ان نقوم بترتيب الكسور السابقة :

$\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

$\frac{9}{30} = \frac{3}{10}$

$\frac{8}{30} = \frac{4}{15}$

إذاً فإن الكسر $\frac{2}{5}$ هو أكبر هذه الكسور بينما الكسر $\frac{4}{15}$ هو أقل تلك الكسور قيمةً.

LCD= The Least Common Denominator

المقام المشترك الأصغر هو الرقم الذي يقبل القسمة على جميع مقامات الكسور التي يتوجب إجراء العمليات الرياضية عليها أو ترتيبها.

لا تنسى دائماً ان تضرب البسط (العالي) كذلك بالعدد ذاته الذي تضرب به المقام حتى تحافظ على تناسب الكسر.

تذكر دائماً بأن مقام الكسر (أدنى الكسر) هو المفتاح و المقياس الذي يبين لنا إلى كم جزءٍ تم تقسيم الوحدة الأساسية (في مثال علبة الجبنة يدلنا العدد 8 بأن علبة الجبنة الواحدة تم تقسيمها إلى ثمانية قطع).

جمع و طرح الكسور ذات المقامات المتماثلة :

لجمع و طرح الكسور ذات المقامات المتماثلة فإننا و بكل بساطة نجمع أو نطرح عاليي الكسرين (البسطين) من بعضهما البعض بينما نترك المقام كما هو :

$$\frac{6}{5} + \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$$

$$\frac{6}{5} - \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

لجمع أو طرح الكسور ذات المقامات المختلفة فإنه يتوجب علينا أولاُ ً توحيد مقامات تلك الكسور.

كما ذكرت سابقاً فإن **الكسر غير المتناسب improper fraction هو الكسر الذي يكون عاليه أكبر من أدناه أي الذي يكون بسطه أكبر من مقامه ، أي أنه كسرٌ قيمته أكبر من العدد واحد1 .**

الآن **بالنسبة للأرقام المختلطة mixed numbers أي الأرقام المؤلفة من عددٍ صحيح و كسر فإننا و قبل القيام بجمعها مع بعضها أو طرحها من بعضها البعض فإننا نقوم بتحويلها إلى كسور غير متناسبة .** لماذا؟

ما هو وجه الشبه بين الرقم المختلط و الكسر غير المتناسب؟

إن كلٌ منهما قيمته أكبر من العدد واحد ، فالكسر غير المتناسب بسطه أكبر من مقامه و كما تعلمون فإن قيمة المقام في الكسر تكون دائماً مساويةً للعدد واحد أياً كانت قيمته.

القيمة الفعلية لمقام الكسر تساوي واحد و بالتالي فإذا كان البسط أكبر من المقام فذلك يعني بأن هذا الكسر أكبر من العدد واحد ، أما الرقم المختلط فهو يتألف من عددٍ صحيح لا يقل عن العدد واحد مع كسر أي أن الرقم المختلط يجب أن يكون أكبر من العدد واحد حتماً.

ما هو ناتج جمع الرقمين المختلطين :

$$2\ \frac{3}{4} + 5\ \frac{6}{7}$$

لدينا رقمين مختلطين يتألف كلٌ منهما من عددٍ صحيح و كسر و للقيام بجمعهما معاً فإنه يتوجب علينا أولاً أن نقوم بتحويلهما .

لتحويل رقمٍ مختلطٍ إلى كسر غير متناسب فإننا نضرب العدد الصحيح المرافق للكسر بالمقام ثم نجمع الناتج مع البسط.

2 × 4+3=8 +3=11

إذاً فإن :

$5\frac{6}{7}$= 5 ×7 =35 +6 =41

نجعل من هذين الناتجين بسطين للمقامين السابقين فنحصل على :

$\frac{11}{4} + \frac{41}{7}$

و بذلك أكون قد حصلت على كسرين غير متناسبين ، أي كسرين بسطيهما أكبر من مقاميهما و **بما أن قيمة المقام هي دائماً تكون مساوية ً للعدد واحد 1 فذلك يعني بأن قيمة كلٍ من هذين الكسرين هي أكبر من واحد.**

الآن لإتمام عملية جمع هذين الكسرين فلا بد من توحيد مقاميهما و هذا الأمر يتطلب منا إيجاد القاسم المشترك الأصغر LCD .

نقوم بمضاعفة البسطين السابقين و نقوم باستعراض نتائج المضاعفة :

4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28|

7 | 14 | 21 | 28|

نوقف عملية المضاعفة عند التوصل إلى أول رقمٍ مشترك و هو هنا 28 .

إذاً فإن القاسم المشترك الأصغر هو 28 أي أن الرقم 28 هو أقل رقمٍ يقبل القسمة على المقامين 4 و 7 .

28 ÷ 7 = 4

28 ÷ 4 =7

نضرب المقامين بالعددين 4 و 7 حتى نحصل على الرقم 28 :

4 × 7 = 28

7 × 4 =28

و **حتى نحافظ على تناسب الكسر لا ننسى أن نضرب كل بسط بالعدد ذاته الذي ضربنا به المقام** :

11 × 7 =77

41 × 4 = 164

و بذلك تصبح لدينا عملية الجمع التالية :

$$\frac{77}{28} + \frac{164}{28}$$

و الآن بكل بساطة فإننا نجمع البسطين مع بعضهما البعض دون أن نمس المقامين :

77 + 164 =241

فيصبح لدينا الكسر التالي :

$$\frac{241}{28}$$

و الآن تتبقى **أمامنا الخطوة الأخيرة هي عملية تحويل هذا الكسر الغير متناسب** $\frac{241}{28}$ **(الذي بسطه أكبر من مقامه و الذي قيمته أكبر من واحد) إلى رقمٍ مختلط حيث نقسم البسط على المقام :**

241 ÷ 28 =8.6

نضع العدد الصحيح 8 بجوار الكسر بينما نجعل من الكسر العشري 6 بسطاً للمقام الذي نبقيه كما هو دون تغيير لنحصل على ناتج الجمع التالي :

$$8\ \frac{6}{28}$$



لن تنسى ذلك أبداً

لماذا نقوم بتحويل الرقم المختلط (المؤلف من عددٍ صحيح و كسر) بضرب العدد الصحيح فيه بمقام الكسر ثم القيام بجمع الناتج مع البسط ؟

حسناً ، لنفترض بأن لدي الرقم المختلط التالي $2\frac{3}{8}$ ، و كنت قد ذكرت سابقاً بأن مقام الكسر و هو هنا العدد 8 هو مفتاح الكسر و مقياسه لأنه يدلنا على عدد الأجزاء التي تم تقسيم الواحدة الواحدة إليها.

الآن بالنسبة لعلب جبنة المثلثات التي تتألف العلبة الواحدة فيها من ثمانية قوالب كم يساوي هذا الكسر؟

كم علبة جبنة و كم قالب؟

إنه يساوي علبتي جبنة كاملتين (العدد الصحيح 2 المجاور للكسر) $2\frac{3}{8}$ و ثلاثة قوالب منفردة (البسط 3) ، أما المقياس هنا فهو المقام 8 و الذي يدلنا على أن كل علبة جبنة واحدة تتألف من ثمانية قوالب و أن علبة الجبنة الكاملة تساوي $\frac{8}{8}$:

$\frac{8}{8}=\frac{1}{1}=1$

الآن ، كم قالب جبنة يساوب الرقم المختلط $2\frac{3}{8}$ ؟

إنه يساوي علبتي جبنة كاملتين على اعتبار أن علبة الجبنة تتألف من ثمانية قوالب :

$2 \times 8 = 16$

تحتوي العلبتين على 16 قالب جبنة .

أقوم بإضافة القوالب المنفرد :

$16 + 3 = 19$

الآن عندما اضرب العدد الصحيح 2 بالمقام 8 ثم أجمعه مع البسط 3 :

$2 \times 8 + 3 = 16 + 3 = 19$

فإنني أحصل على الرقم 19 أي تسعة عشر قالب جبنة.

الآن عندما أضرب العدد الصحيح 2 بالمقام 8 فكانني أقول للآلة الحاسبة بأن لدي وحدتين اثنتين من الثمانيات باعتبار أن 8 هي المقياس (المقام) و أريد أن أعرف عدد الأجزاء التي تتألف منها هاتين الوحدتين الكاملتين فأحصل على النتيجة 16و التي تعني بأن لدي 16 قالب جبنة على اعتبار أن كل علبة جبنة واحدة (وحدة كاملة) تتألف من ثمانية قوالب .

ثم عندما أجمع ناتج عملية الضرب أي 16 مع البسط 3 :

16 + 3=19

فإنني بذلك أضيف قوالب الجبنة المنفردة و التي هي أقل عدداً من أن تشكل علبة جبنة كاملة (وحدة كاملة) .



هل يصح بأن أكتب رقماً مختلطاً يتألف من عددٍ صحيح و كسرٍ غير متناسب؟

مثلاً $3\frac{9}{8}$

طبعاً لا يصح ذلك.

لأن الكسر غير المتناسب $\frac{9}{8}$ يعني وحدةً كاملة أي 8 (علبة جبنة كاملة) زائد قطعة منفردة أي واحد ، أي أن الرقم المختلط $3\frac{9}{8}$ بالنسبة لمثال علبة جبنة المثلثات تعني ثلاثة علب كاملة كما يشير العدد الصحيح 3 و تسعة قوالب جبنة (كما يشير البسط 9) ، و بما أن المقام أي المقياس هو 8 فذلك يعني علبة جبنة كاملة + قالب منفرد واحد أي ان الرقم المختلط $3\frac{9}{8}$ يعني أربع وحدات كاملة (4 علب جبنة) و جزءٌ واحدٌ منفرد (قالب) و بالتالي فإن الصحيح ان نعبر عن هذا الرقم المختلط بالشكل التالي :

$4\frac{1}{8}$

4 × 8 = 32 + 1 =33

33 ÷ 8 = 4.1

أي 4 علب جبنة كاملة و قالب واحد منفرد.

و بالمثل فإنه من غير الصحيح أن أكتب رقماُ مختلطاً يحتوي مع العدد الصحيح على كسرٍ قيمته واحد فأقول مثلاً :

$3\frac{8}{8}$

لأن الكسر $\frac{8}{8}$ يساوي واحد 1 كامل أي علبة جبنة كاملة :

3 +1 =4

اي انه يتوجب علي أن أعبر ببساطة عن هذا الرقم المختلط اي $3\frac{8}{8}$ بالعدد الصحيح 4 أي أربع علب جبنة كاملة.

3 × 8 + 8=3 × 8 +8 =24 +8 =32

32 ÷ 8 =4

أي أربع علب جبنة كاملة.

الآن سوف أنتقل لشرح العملية المعاكسة أي عملية تحويل كسر غير متناسب (كسر أكبر من واحد 1) إلى عددٍ مختلط (عدد صحيح و كسر).

لنقم بتحويل الكسر غير المتناسب $\frac{34}{8}$ إلى رقمٍ مختلط .

كما ترون فإن **المقام 8 يشير غلى أن الوحدة الكاملة تتألف من ثمانية أجزاء (علبة جبنة كاملة) حيث أن المقام هو مفتاح و مقياس الكسر.**

بينما يشير البسط 34 إلى أن لدي أربع وحدات كاملة و جزئين منفردين اي أربع علب جبنة و قالبين منفردين:

34 ÷ 8 =4.2

بكل بساطة فإننا عند تحويل كسرٍ غير متناسب إلى رقمٍ مختلط فإننا نقسم البسط 34 على المقام 8 و ذلك لنعرف كم وحدةً كاملة في البسط ، اي كم ضعفاً من المقام يساوي البسط على اعتبار أن المقام هو المقياس ، أي كم وحدةً أو كم واحداً كاملاً لدينا في البسط؟

43 ÷ 8 =4.2

إن قسمة البسط على المقام تدلنا على أن لدينا أربع وحداتٍ كاملة ، و بما أنها وحداتٌ كاملة فإننا نجعل منها عدداً صحيحاً نضعه بجوار الكسر.

ثم إن لدينا الكسر العشري 2 و هو يقع بعد النقطة العشرية ، و بما أن العدد 2 هذا أقل من واحد لأن واحد هنا يساوي 8 أجزاء لأن المقام أو المقياس يخبرنا بأن واحد في هذا الكسر يساوي 8 علب جبنة مثلثات و لذلك فإنني أجعل من العدد 2 هذا بسطاً للكسر بما أنه أقل من واحد ثم أترك المقام القديم 8 دون تغيير فأحصل على الرقم المختلط :

$$4\ \frac{2}{8}$$

اي 4 علب جبنة و قالبين منفردين اي :

4 × 8 = 32 + 2 = 34

أي 34 قالب جبنة .

لماذا نقسم البسط على المقام؟

لماذا نقسم عالي الكسر على أدناه ؟

حتى نعرف من كم وحدة كاملة يتألف البسط على اعتبار أن المقام السفلي هو المقياس ، أما باقي القسمة فهي الأجزاء الأقل من واحد (الكسر العشري) أي أقل من وحدة كاملة و هذه نجعلها بسطاً للكسر.

طرح كسرٍ من رقمٍ مختلط :

$$\frac{2}{6} - 2\ \frac{3}{4}$$

في البداية نتجاهل وجود العدد الصحيح 2 بشكلٍ مؤقت لنقوم بإضافته لاحقاً إلى ناتج عملية طرح الكسرين، و كما مر معنا سابقاً و **حتى نجري عملية طرحٍ بين كسرين فإننا نقوم بتوحيد المقامين و لذلك فإننا نقوم باستخراج مضاعفات المقامين 4 و** 6 :

4 |8 | **12** | 16 | 20|

6 | **12** | 18 |...

نتوقف عن عملية المضاعفة بعد التوصل إلى أول مضاعفٍ مشترك.

نتوقف عندما يتكرر مضاعفٍ واحد في كلا القائمتين و هو هنا الرقم 12 و هو الرقم الذي سوف نجعل منه مقاماً مشتركاً عن طريق ضرب مقامٍ كلٍ منهما بعددٍ ما.

لا تنسى أن تضرب البسط اي عالي الكسر بالعدد نفسه:

3 × 4 =12

3 × 3 =9

و بذلك فإن الكسر $\frac{3}{4}$ يصبح $\frac{9}{12}$ ، و بالنسبة للكسر الثاني $\frac{2}{6}$:

$2 \times 6 = 12$

$2 \times 2 = 4$

فيصبح لدينا الكسر $\frac{4}{12}$ لتصبح عملية الطرح على الشكل التالي :

$$\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$$

و الآن نضيف العدد الصحيح 2 الذي سبق لنا أن نحيناه جانباً لناتج عملية الطرح :

$$2 + \frac{5}{12} = 2\frac{5}{12}$$

و هو ناتج عملية الطرح.

إذا كان أحد المقامين من مضاعفات المقام الآخر فإننا نجعل المقام الأكبر مقاماً موحداً لكلا الكسرين عن طريق ضرب المقام الأصغر بعددٍ يجعله مماثلاً للمقام الأكبر.

لا تنسى أن تضرب بسط الكسر بالعدد ذاته حتى تحافظ على تناسب الكسر.

$$\frac{8}{6} - \frac{2}{12} =$$

الرقم 12 هو من مضاعفات العدد 6 و لذلك فإننا نجعله مقاماً موحداً عن طريق ضرب العدد 6 بالعدد 2 .

$2 \times 6 = 12$

لا ننسى أن نضرب البسط 8 بالعدد 2 كذلك حتى نحافظ تناسب الكسر:

$2 \times 2 = 4$

لتصبح لدينا عملية الطرح التالية :

$$\frac{4}{12} - \frac{2}{12} = \frac{2}{12}$$

قيمة الكسر في المقادير غير القابلة للعد

مر معنا سابقاً في مثال علبة الجبنة كيفية تمثيل الكسر بالنسبة للمقادير المعدودة ، و لكن كيف نحسب قيمة الكسر و كيف نمثل الكسر في غير المعدودات؟

الطريقة التقليدية :

مثال :

ما هي قيمة الكسر $\frac{3}{6}$ من 900 g من السكر ؟

لتسهيل هذه العملية فإننا نعتبر بأن قيمة الكسر $\frac{3}{6}$ هي $\frac{1}{6}$.

الآن نقسم الكمية المتوفرة أي 900 g غرام على المقام 6 :

900 ÷ 6 = 150

150 × 6 =900

الآن نضرب ناتج القسمة أي 150 بالبسط الأصلي أي العدد 3 :

3 × 150 =450 g

الأن نضرب البسط القديم 3 بالكمية أي 900 g :

3 × 900 = 2700

نقسم ناتج عملية الضرب أي 2700 على المقام 6 :

2700 ÷ 6=450

أي أن ما نسبته $\frac{3}{6}$ من 900 g غرام تساوي 450 g غرام.

$$\frac{3}{6} - 900\ g$$

نقسم الكمية على المقام 6 :

900 ÷ 6 =150

نضرب ناتج القسمة بالبسط :

$150 \times 3 = 450\ g$

نضرب الكمية أي 900 g غرام بالبسط 3 :

$3 \times 900 = 2700$

نقسم الناتج أي 2700 على المقام :

$2700 \div 6 = 450\ g$

أي أن $\frac{3}{6}$ من 900 غرام تساوي 450 g غرام.

نتأكد من صحة العملية التي قمنا بها :

$\frac{3}{6}$ تساوي $\frac{1}{2}$ اي نصف الكمية.

$900g \div \ = 450\ g$

تحليل العملية السابقة :

لدينا 900 g غرام سكر و الكسر $\frac{3}{6}$.

إن المقام هو المفتاح و هو مقياس الكسر و يدلنا على أن الوحدة الكاملة في هذا الكسر تتألف من ستة أجزاء أي :

$900 \div 6 = 150$

أما بسط الكسر أي العدد 3 فإنه يدلنا على أن لدينا ثلاثة أجزاء من 6 أي نصف الكمية:

$900 \div 2 = 450$

إن الخطوة الأولى التي قمت بها أي قسمة إجمالي الكمية أي 900 g غرام على المقام 6 تعني بأنني قد ربطت النسبة التي في المقام 6 بقيمة رقمية هي 150 غرام ، أي أن كل جزءٍ من أجزاء المقام يساوي 150 غرام أي أن المقام كاملاً يساوي 900g غرام.

الخطوة التالية تتمثل في ضرب تلك القيمة اي قيمة كل جزء أي 150g غرام بالبسط 3 :

$3 \times 150 = 450\ g$

اي أن لدي 450 غرام من 900 غرام.

$\frac{450}{900}$

ثم قمت بضرب كامل الكمية أي 900 g بالبسط :

$3 \times 900 = 2700\ g$

أي أنني اعتبرت بأن كل جزءٍ هو وحدة كاملة و بذلك فقد حصلت على قيمة تعادل أضعاف الكمية الأصلية .

قمت بقسمة الكمية بعد مضاعفتها على المقام فحصلت على النسبة المكافئة:

$2700 \div 6 = 450\ g$

كما ترون فإنها عملية متعددة المراحل و يمكن أن ينساها المرء بسهولة ، حسناً ، يمكننا اختصار العملية المعقدة السابقة إلى خطوتين بسيطتين :



أضرب البسط بكامل الكمية ثم نقسم ناتج عملية الضرب على المقام و بذلك فإنني أحصل على قيمة الكسر على شكل كمية و مقدار رقمي ثابت و ليس على شكل نسبة :

ما هي قيمة الكسر $\frac{3}{6}$ من 900 g من السكر ؟

أضرب البسط 3 بالقيمة 900 g :

$3 \times 900 = 2700$

اقسم ناتج عملية الضرب على المقام :

$2700 \div 6 = 450$

أي أن $\frac{3}{6}$ من 900 غرام تساوي 450 g غرام.

و هو الحل ذاته الذي توصلت إليه باستخدام العملية المعقدة السابقة.

ما هي قيمة الكسر $\frac{3}{4}$ من كيس إسمنت يبلغ وزنه 25 kg ؟


أضرب البسط 3 بالقيمة 25 kg :

3 ×25 = 75

اقسم ناتج عملية الضرب على المقام :

75 ÷ 4= 18.7 kg

أي أن $\frac{3}{4}$ من 25 كيلو غرام تساوي 18.7 kg كيلو غرام.



تتمثل الخطوة الأولى في ضرب الكمية ببسط الكسر و بذلك فإننا نماهي ما بين تلك الكمية و بين بسط الكسر و بذلك فإننا نحدد عدد الوحدات المتوفرة من الوحدة الكلية ، أي أننا بذلك نحول النسبة الكسرية $\frac{3}{4}$ أو $\frac{9}{5}$ أو أياً تكن تلك النسبة إلى قيمةٍ رقمية ثابتة(وزن أو طول أو أي شيءٍ آخر).

الخطوة الثانية تتمثل في أننا نقسم ناتج عملية الضرب على المقام بما هو مقياسٌ للكسر و بذلك فإننا نحصل على القيمة الرقمية الفعلية للكسر.

كم تساوي النسبة $\frac{5}{15}$ من كيس طحين يبلغ وزنه 50 kg كيلو غرام؟

نضرب البسط بالوزن الكلي :

5 × 50 = 50

نقسم ناتج عملية الضرب على المقام 15 :

250 ÷ 15 = 16.6 kg

إذاً فإن النسبة $\frac{5}{15}$ تساوي نسبة الثلث و كذلك فإن الكسر العشري 16.6 يساوي ثلث 50 kg :

16.6× 3 =50

إن العملية السابقة شديدة الأهمية في مجالاتٍ مثل تقسيم الحصص و تقسيم الإرث و ما شابه ذلك من أشياء و تحويل النسب المجردة إلى قيمٍ رقمية ثابتة.

رجلٌ ثري تبلغ ثروته 300 مليون دولار حدد في وصيته نصيب أبنائه و زوجته بالثلث $\frac{1}{3}$ و نصيب أمه و شقيقاته و أشقائه $\frac{1}{4}$ و نصيب الأيتام و الأرامل و المعاقين و المشردين و المسنين بالخمس $\frac{1}{5}$ و حدد نسبة السدس $\frac{1}{6}$ من ثروته للمخترعين و الكتاب المبدعين إبداعاً مفيداً للبشرية و طلاب العلوم الدينية و نسبة $\frac{1}{20}$ من ثروته لشراء أرض لإيواء المشردين، فكم تبلغ حصة كلٌ من ورثته؟

أضرب البسط بكامل الكمية أو المبلغ 300 مليون دولار$ ثم أقسم ناتج عملية الضرب على المقام و بذلك فإنني أحصل على قيمة الكسر على شكل كمية و مقدار رقمي ثابت و ليس على شكل نسبة :

نصيب زوجته و ابناؤه يبلغ الثلث $\frac{1}{3}$ أي :

1 × 300 ÷ 3 =300 ÷3=100

نصيب أبنائه 100 مليون دولار.

نصيب أمه و شقيقاته و أشقائه الربع $\frac{1}{4}$:

1 × 300 ÷ 4 = 300 ÷ 4 = 75

نصيب أمه و زوجته و شقيقاته و أشقائه تبلغ 75 مليون دولار.

نصيب الفقراء و الأيتام و المشردين هو الخمس $\frac{1}{5}$:

$1 \times 300 \div 5 = 300 \div 5 = 60$

نصيب الفقراء 60 مليون دولار.

نصيب المخترعين و المبدعين السدس $\frac{1}{6}$:

$1 \times 300 \div 6 = 300 \div 6 = 50$

50 مليون دولار للمخترعين و المبدعين و الكتاب.

كما حدد $\frac{1}{20}$ من ثروته لشراء أرض لإيواء المشردين :

$1 \times 300 \div 20 = 15$

الحصة المخصصة لشراء أرضٍ لإيواء المشردين تبلغ 15 مليون دولار.

نتأكد من صحة العمليات السابقة عن طريق جمع المبالغ التي حصلنا عليها فإذا حصلنا على المبلغ الأصلي أي 300 مليون دولار فذلك يعني بأن العمليات التي قمنا بها صحيحة.

$100 + 75 + 60 + 50 + 15 = 300$

العمليات صحيحة

لن تنسى أبداً

تخيل بأنه قد طُلب منك توزيع كمية ما او مقدار ما وفق كسرٍ بسيط أنت تعرف مسبقاً نتيجة القسمة عليه : تخيل مثلاً بأنه قد طُلب منك تقسيم كيس اسمنتٍ وزنه 50 كيلو غرام وفق الكسر $\frac{1}{2}$

نصف و أنت تعرف مسبقاً بأن النتيجة سوف تكون 25 كيلو غرام ، كما أنك تعرف مسبقاً بأنك سوف تحصل على هذه النتيجة عملياتياً بضرب الكمية 50 كيلو غرام بالبسط 1 ثم قسمة النتيجة على المقام 2، و هذا ما سوف تفعله في كل حالةٍ مماثلة مع أرقام و كسور أكثر تعقيداً.

إن ضرب عددٍ ما بكسر يعني إيجاد كسر ذلك الرقم فمثلاً عندما نضرب الكسر نصف $\frac{1}{2}$ 0.5 برقمٍ ما فذلك يعني بأننا نريد معرفة كم يبلغ نصف هذا الرقم :

$\frac{1}{2} \times 10 = 5$

$\frac{1}{2}$× 100 =50

$\frac{1}{2}$× 1000 =500

و عند ضرب كسرٍ بعددٍ صحيح فإن ذلك يشبه إضافة ذلك الكسر إلى نفسه بذلك العدد من المرات التي يمثلها ذلك العدد، فإذا ضربنا الكسر ربع $\frac{1}{4}$ بنفسه مرتين فإن ذلك يماثل جمعه مع نفسه مرتين :

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

أي ربع + ربع تساوي نصف.

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

ربع + ربع +ربع = ثلاثة أرباع

تذكر دائماً بأننا نقوم فقط بجمع البسط مع البسط (العالي مع العالي) بينما نترك مقام الكسر كما هو .

لا يُمكن جمع الكسور مع بعضها البعض إلا إذا كانت مقاماتها متماثلة.

ضرب كسرين متناسبين proper fraction

الكسر المتناسب كما علمتم هو الكسر الذي يكون بسطه أقل من مقامه و بالتالي فإنه الكسر الذي تكون قيمته أقل من واحد .

إن ضرب كسرين متناسبين ببعضهما البعض يعني بكل بساطة ضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

فإذا ضربنا الكسر ربع $\frac{1}{4}$ بالكسر نصف $\frac{1}{2}$ فإن ذلك يعني إيجاد ربع النصف أي :

1 × 1 =1

2 × 4 =8

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

$\frac{1}{8}$ الثُمن

$$\frac{2}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

2 × 3 =6

4 × 5 =20

نختزل الكسر عن طريق قسمة كلٌ من بسطه و مقامه على عددٍ واحد يقبل القسمة التامة على بسطه و مقامه:

6 ÷ 2 =3

10 ÷ =5

إن ضرب كسرين متناسبين مع بعضهما البعض يعني ضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام .

ضرب رقمين مختلطين mixed numbers ببعضهما البعض

الأرقام المختلطة كما علمتم هي الأرقام التي تتألف من عددٍ صحيحٍ و كسر.

لضرب كسر متناسب proper fraction (كسرٌ قيمته أقل من واحد لأن بسطه أكبر من مقامه) برقمٍ مختلط فإننا نقوم أولاً بتحويل الرقم المختلط إلى كسرٍ غير متناسب improper fraction (كسر بسطه أكبر من مقامه و لذلك فإن قيمته أكبر من واحد) :

مثال :

ما هو ناتج ضرب :

$$\frac{2}{4} \times 2\ \frac{3}{8}$$

لإنجاز عملية الضرب هذه لابد من تحويل الرقم المختلط $2\ \frac{3}{8}$ إلى كسرٍ غير متناسب حتماً لأن كل رقم مختلط يساوي كسراً غير متناسب ، و كما علمنا سابقاً فإننا لتحويل رقمٍ مختلط إلى كسرٍ متناسب فإننا نضرب العدد الصحيح المرافق للكسر (و هو هنا العدد 2) بالمقام (و هو هنا العدد 8) ثم نجمع الناتج مع البسط 3 و بذلك فإننا نحصل على كسرٍ غير متناسب بسطه أكبر من مقامه و قيمته أكبر من واحد .

و بالنسبة لمثال علبة الجبنة فإن الكسر $2\frac{3}{8}$ يعني علبتي جبنة كاملتين 2 و ثلاثة قوالب منفردة 3 حيث أن المقام 8 هو المفتاح أو مقياس الكسر الذي يعني بأن الواحد في هذا الكسر (علبة الجبنة الواحدة) ينقسم إلى ثمانية أجزاء.

نجعل الناتج بسطاً للمقام القديم ذاته أي العدد 8 .

$2 \times 8 + 3 = 16 + 3 = 19$

و بذلك فإننا نحصل على الكسر التالي $\frac{19}{8}$ و بذلك تصبح عملية الضرب على الصورة التالية :

$\frac{19}{8} \times \frac{2}{4}$

لإنجاز عملية ضرب هذين الكسرين فإننا نضرب العالي بالعالي (نضرب البسط بالبسط) :

$2 \times 19 = 38$

نضرب الداني بالداني (المقام بالمقام) :

$4 \times 8 = 32$

ليصبح لدينا الكسر التالي $\frac{38}{32}$ الذي نقوم باختزاله و ذلك عن طريق قسمة كلا حديه على أقل عددٍ يقبل القسمة التامة على كلا حديه و هو هنا العدد 2 :

$38 \div 2 = 19$

$32 \div 2 = 16$

فنحصل على الكسر $\frac{19}{16}$ ، و كما ترون فإنه كسرٌ غير متناسب أي أن قيمته أكبر من واحد 1 لأن بسطه 19 أكبر من مقامه 16 ، نقوم بتحويله إلى رقمٍ مختلط وفق الخطوات السابقة:

نقسم البسط على المقام و نضع الناتج الصحيح كعددٍ صحيح منفرد بجوار الكسر بينما نجعل من الباقي (الرقم العشري الذي يأتي بعد النقطة العشرية) بسطاً للمقام السابق ذاته.

$19 \div 16 = 1.2$

و بذلك فإننا نحصل على الكسر التالي :

$1\frac{2}{16}$

* في الحقيقة فإن الرقم المختلط $1\frac{2}{16}$ يساوي 18 و ليس 19 :

$1 \times 16 + 2 = 18$

قسمة الكسور Dividing fractions

قسمة عددٍ صحيح على كسر

لتكن لدي عملية القسمة التالي :

$$4 \div \frac{2}{8}$$

بما أن الكسر هو عملية قسمةٍ معلقة ، أي عملية قسمة البسط على المقام فإن قسمة عددٍ صحيح على كسر تستدعي قسمة البسط على المقام ثم القيام بقسمة العدد الصحيح على ناتج قسمة البسط على المقام ذاك.

$$4 \div \frac{2}{8}$$

أقسم بسط الكسر على مقامه :

$2 \div 8 = 0.25$

اقسم العدد الصحيح على ناتج قسمة بسط الكسر على مقامه.

$4 \div 0.25 = 16$

إذاً فإن :

$$4 \div \frac{2}{8} = 16$$

مثال آخر :

$$4 \div \frac{1}{2}$$

إن عملية القسمة السابقة تشبه قولك : كم نصفاً يحتوي العدد الصحيح 4 ؟

ننفذ عملية القسمة المعلقة في الكسر $\frac{1}{2}$:

$1 \div 2 = 0.5$

نقسم العدد الصحيح 4 على 0.5 :

$4 \div 0.5 = 8$

إذاً فإن **$4 \div \frac{1}{2} = 8$**

و بالفعل فإن العدد الصحيح 4 يحتوي على ثمانية أنصاف .

$4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

ما هو ناتج قسمة العدد الصحيح 3 على الكسر $\frac{3}{4}$:

$3 \div \frac{3}{4}$

ننفذ عملية القسمة المعلقة في الكسر $\frac{3}{4}$:

$3 \div 4 = 0.75$

نقسم العدد الصحيح على 0.75 :

$3 \div 0.75 = 4$

و بالفعل فإن **العدد 3 يحتوي على أربعة ثلاثة أرباع، فالعدد الصحيح ثلاثة يتألف من ثلاث وحداتٍ كاملة يتألف كلٌ منها من ثلاثة أرباع + واحد 1 فيصبح لدينا ثلاثة ثلاثة أرباع زائد الأرباع الثلاثة المتبقية فيصبح لدينا 4 أربعة ثلاثة أرباع .**

الآن نأتي إلى العملية المعاكسة و هي عملية قسمة كسرٍ على عددٍ صحيح .

لقسمة كسرٍ على عددٍ صحيح فإننا نبقي عالي الكسر (البسط) كما هو دون تغيير بينما نضرب العدد الصحيح بالمقام و هذا الأمر يؤدي إلى تضخم الكسر ، أي أن قيمة الكسر تهبط بشكلٍ يتناسب مع قيمة المقسوم عليه.

تذكر دائماً بأن عملية ضرب عددٍ صحيح بكسر هي في الحقيقة عملية قسمة و لذلك فإن القسمة هي عملية ضرب (قسمة كسرٍ على عددٍ صحيح) ، و على سبيل المثال فإن ضرب عددٍ صحيح بالكسر نصف $\frac{1}{2}$ هو في الحقيقة عملية قسمة .

$1 \div 2 = 0.5$

$10 \times \frac{1}{2} = 5$

$10 \times 0.5 = 5$

$6 \times \frac{1}{2} = 3$

$6 \times 0.5 = 3$

أما عملية قسمة عددٍ صحيح على كسر فهي عملية ضرب :

$6 \div \frac{1}{2} = 12$

انتبه جيداً :

$6 \times 2 = 12$

$6 \div 0.5 = 12$

0.5 هو ناتج قسمة بسط الكسر على مقامه.

$10 \div \frac{1}{2} = 20$

$10 \times 2 = 20$

$10 \div 0.5 = 20$

هل سبق أن قال لك هذا أحدٌ من قبل؟

و إن كنت في شكٍ من ذلك فقم بقسمة بسط الكسر على مقامه ثم اقسم العدد الصحيح على العدد العشري الناتج عن عملية القسمة كما فعلت انا في الأمثلة السابقة لتتأكد بالفعل بأن عملية قسمة عددٍ صحيح على كسر هي عملية ضرب فعلية.

قسمة كسرٍ على كسرٍ آخر

لقسمة كسرٍ على كسرٍ آخر فإننا نقوم بقلب الكسر الثاني رأساً على عقب ثم نضرب هذين الكسرين ببعضهما :

$$\frac{2}{4} \times \frac{3}{6} = \frac{2}{4} \times \frac{6}{3}$$

لاحظ كيف قلبنا الكسر الثاني رأساً على عقب .

$$2 \times 6 = 12$$

$$4 \times 3 = 12$$

إن عملية قسمة كسرين على بعضهما البعض تعني ضرب الكسر الأول بمقلوب الكسر الثاني reciprocal ، و كما مر معنا سابقاً فإننا في عملية الضرب نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{2}{4}$$

للتأكد من صحة العملية السابقة نقسم البسط على المقام فنحصل على كسور عشرية تمثل الكسور السابقة .

$$0.5 \times 0.25 = 0.125$$

$$\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{2}{4} = 0.5$$

ربع $\frac{1}{4}$ تقسيم نصف $\frac{1}{2}$ تماثل 0.5 تقسيم 0.25 و هي تساوي :

$0.5 \times 0.25 = 0.125$

$1 \div 8 = 0.125$


كما ترون فقد أجريت عملية الضرب دون إجراء عملية قلب الكسر الثاني فحصلت على نتيجةٍ خاطئة و هي ثُمن 0.125 بينما النتيجة الصحيحة يجب أن تكون 2:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

ثمن

$0.125 \times 8 = 1$

نتيجة خاطئة



و ما أدراني أن هذه النتيجة خاطئة ، و ما أدراني أن نصف $\frac{1}{2}$ تقسيم ربع $\frac{1}{4}$ لا تساوي ثمن 0.125؟

حسناً بما أن الكسور هي عبارة عن عمليات قسمة معلقة أي قسمة البسط على المقام أي قسمة عالي الكسر على أدناه.

$$\frac{1}{2} = 1 \div 2 = 0.5$$

$$\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0.25$$

الآن نقسم 0.5 (نصف) على ربع 0.25 :

$$0.5 \div 0.25 = 2$$

وهي النتيجة الصحيحة.

إذاً فإننا نحصل على نتيجة صحيحة عندما نقلب الكسر الثاني راساً على عقب :

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = 0.5 \times 4 = 2$$

2 نتيجة صحيحة

إذاً فإن إجراء عملية الضرب دون القيام بقلب الكسر الثاني في عملية قسمة الكسور يعطي نتيجةً خاطئة.


إن المثال السابق شديد الأهمية ذلك أنه يبين لنا بأن نتيجة عملية قسمة كسرين على بعضهما البعض ستكون نتيجةً خاطئة إن لم نضرب الكسر الأول بمقلوب الكسر الثاني :

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\frac{1}{4} \rightarrow \frac{4}{1} = 4$$

$$0.5 \times 4 = 4 \div 2 = 2$$

إن لم نجري عملية قلبٍ للكسر الثاني فإن النتيجة ستكون خاطئةً حتماً.



استخدم الآلة الحاسبة مع كسرين بسيطين مثل نصف و ربع بالطريقة التي قمت بها سابقاً حتى تتأكد بنفسك من ضرورة قلب الكسر الثاني عند إجراء عملية قسمة بين كسرين للحصول على نتيجةٍ صحيحة.

الرقم المختلط هو عبارة عن عددٌ صحيح بجوار كسر.

لقسمة الأرقام المختلطة فلا بد أولاً من تحويلها إلى كسور غير متناسبة improper fraction و الكسور غير المتناسبة كما علمنا هي الكسور التي يكون بسطها أكبر من مقامها أي أنها الكسور التي تكون قيمتها أكبر من واحد.

إن تحويل عددٍ مختلط إلى كسر غير متناسب يتطلب ضرب العدد الصحيح المرافق لذلك الكسر بالمقام ثم جمع النتيجة مع البسط ، و يعني ذلك استخدام المقام بما هو مقياسٌ لعدد أجزاء الوحدة الواحدة و ذلك لمعرفة كم يبلغ عدد أجزاء العدد الصحيح المرافق للكسر و ذلك بالطبع عن طريق ضرب العدد الصحيح المرافق بالمقام و من ثم القيام بجمع النتيجة مع الأجزاء الموجودة في البسط لأننا بعد أن نضرب العدد الصحيح المرافق للكسر بالمقام فإن الناتج يصبح مماثلاً للبسط من حيث الماهية أي أنه يُصبح مجموعة كسور أقل من واحد و تصبح قابلةً للجمع معها ممكنة و لذلك فإننا نقوم بجمعها معاً و نجعل منها بسطاً للمقام السابق ذاته.

فالكسر $\frac{3}{8}$ 2 بالنسبة لمثال علب الجبنة يعني علبتي جبنة و ثلاثة قوالب بينما يشير المقام باعتباره مفتاح الكسر و مقياسه إلى أن الوحدة الواحدة (هنا علبة الجبنة) تتألف من ثمانية أجزاء.

2 × 8 =16

3 + 16 =19

$2\ \frac{3}{8} = \frac{19}{8}$

عندما نقسم الكسر $\frac{1}{2}$ مثلاً على 2 فذلك يعني بأن هذا الكسر قد انقسم إلى جزئين و ذلك يعني بأن قسمة كسرٍ ما على 2 تساوي نتيجة ضرب كسرٍ ما بالكسر نصف $\frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2} \div 2 = (1\div2)\div2 = 0.5\div2 = 0.5$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{1}{2} = 4\div8 \times 1 \div 2 = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

إن قسمة كسرٍ ما على 2 تماثل نتيجة ضرب ذلك الكسر بالكسر $\frac{1}{2}$

،فإذا كان لدينا الكسر $\frac{4}{8}$ مثلاً و أردنا تطبيق القاعدة السابقة عليه :

لقسمة الكسر $\frac{4}{8}$ على 2 فإننا نقوم أولاً بتحويله إلى رقم و بما أن الكسر هو عملية قسمة معلقة (قسمة البسط على المقام) فإننا ننفذ عملية القسمة المعلقة تلك و ذلك من خلال قسمة البسط 4 على المقام 8 :

$4 \div 8 = 0.5$

و الآن نقسم 0.5 على 2 :

$0.5 \div 2 = 0.25$

الآن نضرب الكسر $\frac{4}{8}$ بالكسر $\frac{1}{2}$:


$4 \div 8 = 0.5$

$1 \div 2 = 0.5$

$0.5 \times 0.5 = 0.25$

كما ترون فقد حصلنا على النتيجة ذاتها .

أعد تنفيذ الخطوات السابقة باستخدام آلةٍ حاسبة و سوف لن تنسى هذه القاعدة أبداً.



تنبيه

لا تقم ابداً بتحويل الكسر إلى رقم عشري عن طريق قسمة بسطه على مقامه على ورقة الامتحان لأن أنظمة التعليم السائد المتحجرة لا تسمح بذلك مع أنها الطريقة الوحيدة التي تتيح لنا التعامل مع الكسور و إجراء العمليات الرياضية المختلفة عليها باستخدام الآلة الحاسبة.

قسمة كسرٍ على عددٍ صحيح

لقسمة كسرٍ على عددٍ صحيح فإننا نقوم بتحويل ذلك العدد الصحيح إلى كسرٍ غير متناسب (كسر بسطه أكبر من مقامه و لذلك فإنه أكبر من واحد) و يتم تحويل العدد الصحيح إلى كسر بأن نجعل من ذلك العدد بسطاً لمقامٍ قيمته واحد 1 .

فإذا أردت أن أقسم كسراً ما على العدد 3 مثلاً فإنني أجعل من العدد 3 بسطاً لكسرٍ مقامه العدد واحد 1 فأحصل على الكسر $\frac{3}{1}$ و هو كما ترون كسرٌ غير متناسب ذلك أن بسطه 3 أكبر من مقامه 1 و بالتالي فإن قيمته أكبر من العدد 1 واحد ، و الحقيقة أن قيمة هذا الكسر هي ثلاثة 3 .

الخطوة التالية لإتمام عملية القسمة تتمثل في القيام بقلب الكسر رأساً على عقب ليصبح $\frac{1}{3}$ أي أن قيمته تصبح ثلث بعد أن كانت قيمته ثلاثةٌ كاملة.

الخطوة التالية إتمام عملية القسمة تتمثل في ضرب الكسر بهذا المقلوب $\frac{1}{3}$ ، و ليكن الكسر المقسوم يبلغ مثلاً $\frac{2}{4}$:

$$\frac{2}{4} \div \frac{3}{1} = \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{12}$$

قسمة رقمين مختلطين على بعضهما البعض

الرقم المختلط mixed number هو عبارة عن عددٍ صحيحٍ و كسر.

قسمة رقمين مختلطين على بعضهما البعض يتوجب تحويل هذين الكسرين المختلطين إلى كسرين غير متناسبين أي كسرين تبلغ قيمة كلٍ منهما أكبر من واحد أي بسطيهما أكبر من مقاميهما.

ما هو ناتج قسمة هذين الكسرين المختلطين على بعضهما البعض :

$$3\ \frac{3}{8} \div 2\ \frac{4}{8}$$

عندما ترى المقام 8 تذكر دائماً مثال علبة الجبنة لأن المقام هو المفتاح و المقياس الذي يدلنا إلى كم قسمٍ تم تقسيم وحدة الكسر.

البسط 3 يدلنا على أن هنالك ثلاثة أجزاء من ثمانية أي ثلاثة قوالب جبنة منفردة.

العدد 3 المرافق للكسر يشير إلى أن هنالك ثلاث وحدات كاملة أي ثلاث علب جبنة .

لتحويل رقمٍ مختلط إلى كسرٍ غير متناسب فإن علينا أن نقوم أولاً بتحويل العدد الصحيح المرافق للكسر إلى أجزاءٍ كسرية و ذلك عن طريق ضرب ذلك العدد الصحيح بمقياس الكسر أي بمقام الكسر:

3 × 8 =24

أي أن العدد الصحيح 3 (ثلاثة علب جبنة) يتألف من 24 جزءاً أي 4 قالب.

و لا ننسى أن نجمع تلك النتيجة مع القوالب الموجودة في البسط و هي ثلاثة قوالب بينما نبقي المقام السابق كما هو :

24 + 3 =27

ثم نجري هذه العملية ذاتها على الرقم المختلط الثاني $2\ \frac{4}{8}$:

2 × 8 =16 + 4 =20

فيصبح لدينا الكسرين غير المتناسبين التاليين $\frac{27}{8} \div \frac{20}{8}$

نقلب الكسر الثاني $\frac{20}{8}$ رأساً على عقب ليصبح $\frac{8}{20}$


ثم نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام :


27 ×8 =216


8 × 20 = 160


فنحصل على الكسر التالي $\frac{216}{160}$ الذي هو ناتج قسمة هذين الكسرين على بعضهما البعض.


$$\frac{27}{8} \div \frac{20}{8} = \frac{27}{8} \times \frac{8}{20} = \frac{216}{160}$$









3/8


5/8


8/8


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


6
8


7
8

%

النسبة المئوية Percentage

تحويل كسر إلى نسبة مئوية

لتحويل كسر إلى نسبة مئوية فإننا نقوم أولاً بتحويل ذلك الكسر إلى رقمٍ عشري عن طريق قسمة البسط على المقام ثم نضربه بمئة.

مثال :

$\frac{1}{2}$ =1÷ 2 = 0.5

0.5 × 100 = 50%

$\frac{1}{4}$ =1÷ 4 = 0.25

0.25 × 100 = 25%

$\frac{3}{4}$ =3 ÷ 4 = 0.75

0.75 × 100 = 75%

إذاً للتحويل من كسر إلى نسبة مئوية نقسم البسط على المقام و نضرب ناتج القسمة بمئة.

$\frac{1}{2}$ **=1 ÷ 2 = 0. 5**

0. 5 × 100 = 50%

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر فإننا نكتب النسبة المئوية و لتكن مثلاً 50% على شكل كسر $\frac{50}{100}$ ثم نقوم باختزاله إلى أقصى درجةٍ ممكنة و ذلك عن طريق قسمة كلٍ من البسط و المقام على عددٍ واحد يقبل القسمة التامة عليهما و هو هنا الرقم عشرة :

50 ÷10 =5

100 ÷10 =10

لنحصل على الكسر $\frac{5}{10}$ و من الممكن أن نقوم باختزال هذا الكسر أكثر من ذلك و ذلك بقسمة كلا حديه على 5 :

5 ÷ 5=1

10 ÷5=2

لنحصل على الكسر $\frac{1}{2}$ ، علماً أنه بإمكاننا أن نقسم كلا حدي الكسر $\frac{50}{100}$ على 50 لنحصل على النسبة ذاتها :

50 ÷ 50 =1

100 ÷ 50 =2

لنحصل على الكسر $\frac{1}{2}$

الآن لتحويل كسرٍ إلى رقمٍ عشري فإننا نقسم البسط على المقام :

1 ÷ 2 =0.5

الآن نضع رمز النسبة المئوية % بجوار النتيجة التي حصلنا عليها 0.5% .

كم يساوي الكسر واحد بالعشرة $\frac{1}{10}$ كنسبةٍ مئوية؟

نقسم البسط 1 على المقام 10 :

1 ÷ 10 = 0.1

نضرب الناتج بمئة :

0.1 × 100 =1

نضع بجوار الناتج رمز النسبة المئوية 1%.

كم يساوي الكسر ربع $\frac{1}{4}$ كنسبةٍ مئوية ؟

1 ÷ 4 = 0.25

0.25 × 100 =25%

أتأكد من صحة العملية

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

قمت باختزال حدي الكسر السابق بقسمتهما على الرقم 25 :

25 ÷ 25 =1

100 ÷25= 4

الرقم العشري 0.1 واحد بالعشرة $\frac{1}{10}$ يساوي :

0.1 ×100=1%

0.25

0.25 × 100 = 25%

0.333

0.333 × 100 =33.3

$33.3\% = \frac{33}{100} = \frac{1}{3}$

ثلث لأن

33.3 × 3 ≈100

0.666 تساوي ثلثين $\frac{2}{3}$ لأن :

0.666 +0.333=0.999≈1

0.999+0.001=1

0.75 =0.75 × 100=75%

النسبة إلى مقدارٍ أو حجم

مر معنا سابقاً كيف يرتبط الكسر بحجمٍ معين ذلك أن هنالك علاقة ما بين النسبة المئوية و المقادير المختلفة .

حساب النسبة المئوية بالنسبة إلى مقدار:

حيٌّ عشوائي يتألف من 50 ألف نسمة 70% منهم فقراء ، ما هو عدد الفقراء في ذلك الحي العشوائي؟

لحل هذه المسألة نقوم بتحويل النسبة المئوية إلى رقمٍ عشري ثم نضرب الناتج بالحجم الكلي .

70% تساوي 70 تقسيم 100 تساوي سبعة بالعشرة 0.7 نضرب هذه النسبة بالمقدار الكلي 50 ألف :

نقوم بتحويل النسبة المئوية إلى كسر مقامه 100 بالطبع ثم نقسم البسط على المقام و بذلك فإننا نحول النسبة المئوية إلى رقمٍ عُشري.

$$70\ \% = \frac{70}{100} = 0.7$$

نضرب الرقم العشري بالمقدار الكلي :

$$0.7 \times 50000 = 35000$$

إذاً فإن عدد الفقراء في ذلك الحي العشوائي يبلغ 35000 نسمة.

نقوم بتحويل النسبة المئوية إلى رقمٍ عشري عن طريق تحويل النسبة المئوية إلى كسر و قسمة البسط على المقام في ذلك الكسر و بعد ذلك فإننا نضرب نتيجة القسمة بكامل الكمية فنحصل على النسبة المئوية من ذلك المقدار.

يمكننا حساب النسبة المئوية و ذلك عن طريق تحويل النسبة المئوية إلى كسر بدلاً من تحويلها إلى رقمٍ عشري:

$$70\% = \frac{70}{100} = \frac{7}{10}$$

قمت باختزال هذا الكسر عن طريق قسمة كلٍ من البسط و المقام على عشرة لأن كلاً منهما يقبلان القسمة التامة على عشرة :

70 ÷ 10 =7

100 ÷ 10 =10

ما ذا نفعل الآن بالكسر $\frac{7}{10}$ ؟

نقوم بضربه بالمقدار الذي نريد حساب نسبته المئوية و ذلك بعد تحويل ذلك المقدار أي 50000 إلى كسر و ذلك بأن نجعل منه كسراً غير متناسب (أكبر من العدد أي بسطه أكبر من مقامه) و ذلك بأن نجعل من هذا الرقم بسطاً للمقام واحد 1 :

$$\frac{50000}{1} = 5000$$

الآن نجري عملية ضرب بين كسرين :

$$\frac{7}{10} \times \frac{50000}{1} = \frac{350000}{10}$$

نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام :

7 ×50000 = 350000

10 × 1 =10

$$\frac{350000}{10} = 35000$$

ثم نختزل هذا الكسر إلى أقصى درجة ممكنة و ذلك بقسمته على أكبر عددٍ يقبل القسمة على كلٍ من البسط و المقام و هو الرقم عشرة 10 بالتأكيد :

350000 ÷ 10 =35000

10 ÷ 10 = 1

$$\frac{350000}{10} = \frac{350000}{1} = 35000$$

و هو المقدار ذاته الذي حصلنا عليه سابقاً كما مر معنا سابقاً.

إذاً فقد قمت بتحويل النسبة المئوية إلى كسرٍ مئوي أي كسرٌ مقامه مئة ثم قمت باختزال الكسر إلى أقصى درجةٍ ممكنة عن طريق قسمته على أكبر عددٍ يقبل القسمة على كلا حديه و ذلك حتى أحافظ على تناسبه.

أضرب الكسر بعد اختزاله بالمقادير التي أريد حساب نسبتها المئوية و ذلك بعد تحويله إلى كسرٍ مقامه العدد واحد حيث نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

أختزل النتيجة عن طريق قسمتها على أكبر عددٍ يقبل القسمة التامة على كلٍ من البسط و المقام و بذلك فإنني أحصل على المقدار أو العدد أو الكمية التي تمثل تلك النسبة المئوية.

تذكر دائماً بأننا نستطيع تحويل أي رقمٍ مهما كان كبيراً إلى كسر عن طريق جعله بسطاً للمقام واحد دون أن تتغير قيمة ذلك الرقم أبداً و بذلك نستطيع ضربه أو قسمته على أي كسرٍ آخر.

سيارة عائلية صغيرة الحجم كانت تباع بسعر $ 1800 دولار ، أدى الإقبال الشديد عليها إلى ارتفاع ثمنها بنسبة 25% ، فما هو سعرها الجديد؟

السعر القديم $ 1800 دولار.

السعر الجديد %25+ $ 1800 دولار

نقوم بتجزئة النسبة %25 إلى أجزاء فتصبح :

10% + 10% +5%

نقم الآن بحساب كم تبلغ فعلياً كل نسبة من المبلغ الكلي :

%10 من $ 1800 دولار تساوي :

1800 ÷ 10 = 180 $

1800 ÷ 10 = 180 $

و بما أن نسبة % 10 تساوي 180 دولار فإن نسبة %5 المتبقية تساوي :

180 ÷ 2 =90 $

90 دولار .

أي أن %25 تساوي :

180+180+90=450 $

180 × 2 +90 =450 $

أي أن الزيادة التي مقدارها %25 على 1800 دولار تساوي 450 دولار ، أي أن ثمن السيارة الجديد قد ازداد بمقدار :

1800 + 450 =2250 $

أي أن الثمن الجديد للسيارة قد أصبح $ 2250 دولار.

رأينا في المثال السابق كيف أنني قمت بتجزئة النسبة المئوية إلى عدة أقسامٍ لتسهيل حسابها ثم قمت بجمع القيم مغ بعضها البعض لأحصل على المقدار الذي يمثل النسبة المطلوب حسابها.

طريقة المضاعفة و الانتصاف Doubling and Halving

هنالك طريقة أخرى لتسهيل حساب النسبة المئوية ذهنياً تدعى بطريقة المضاعفة و الانتصاف حيث تتضمن هذه الطريقة إما مضاعفة النسبة و قسمة المقدار الكلي إلى النصف أو قسمة النسبة إلى النصف و مضاعفة المقدار الكلي.

مثال :

لحساب نسبة 40% من 80 إما أن نقسم النسبة إلى النصف و نضاعف المقدار فنقول 20% من 160 و هي تساوي 32 ، أو أن نضاعف النسبة و نقسم المقدار إلى النصف فأقول 80% من 40 و هي كذلك تساوي 32 .

لأن 80% من عشرة تساوي 0.8 أي ثمانية بالعشرة ، و لدينا في الرقم 40 أربع 0.8 ثمانية بالعشرة أي :

4 × 0.8 =32

0.8 × 4 =32

حساب النسبة المئوية باستخدام الآلة الحاسبة

ندخل النسبة المئوية و لتكن مثلاً 20

نضغط زر حساب النسبة المئوية %

ندخل المقدار الذي نريد حساب النسبة المئوية منه و ليكن مثلاً 150

20 % 150 =15

أي أن 15 يمثل 10% من 150 .

التغيير النسبي percentage change

دراسة التغير النسبي هو دراسة و متابعة التغيرات النسبية percentage changes و ذلك **عن طريق دراسة تغير المقادير زيادةً أو نقصاناً .**

و لحساب معدل التغير النسبي فإننا نستخدم المعادلة التالية :

التغير النسبي = مقدار الزيادة أو النقص مقسوماً على المقدار الأصلي ضرب مئة .

Percentage change =increase or decrease / original amount ×100

التغير النسبي = مقدار الزيادة أو النقص ÷المقدار الأصلي × مئة .

تطبيق على معدل التغير النسبي:

كان عدد البيوت التي تحوي حدائق و فسحات في العام 1995 مليون منزل و في العام 2026 أصبح عددها 50 ألف بيت فما هو معدل التغيير النسبي؟

لحساب معدل التغير النسبي نطبق المعادلة :

التغير النسبي = مقدار الزيادة أو النقص ÷المقدار الأصلي × مئة .

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

التغير النسبي = مقدار الزيادة أو النقص 950 ألف تقسيم المقدار الأصلي (مليون بيت) 1000 000 ضرب 100 :

مقدار الزيادة أو النقص يساوي :

1000 000 – 50000 =950 000

950 000 ÷ 1000 000 =0.95

0.95 × 100 =95 %

أي أن معدل اختفاء المنازل ذات الحدائق يبلغ 95% .

$$\frac{95}{100} = \frac{0.95}{10} = \frac{9.5}{10}$$

95 بالمئة = 0.95 بالعشرة = 9.5 بالعشرة = 0.95 من عشرة

0.95 تعني 95 بالمئة.



كتبت الكسرين $\frac{9.5}{10}$ و $\frac{0.95}{10}$ بهذا الشكل الخاطئ لغاية تعليمية إياك أن تكتب أي كسر بهذا الشكل على ورقة الامتحان أي إياك أن تكتب رقماً عشرياً في بسط الكسر أو مقامه.

تاجر يشتري سيارة بسعر 1800 $ دولار و يبيعها بسعر 2000 $ دولار ، فما هي نسبة ربح هذا التاجر؟

لحل هذه المسألة نستخدم معادلة حساب معدل التغيير النسبي .

معدل التغيير = مقدار الزيادة أو النقصان تقسيم المقدار الأصلي ضرب مئة.

معدل التغيير = مقدار الزيادة أو النقصان ÷ المقدار الأصلي × 100

مقدار الزيادة أو النقصان تساوي :

2000 – 1800 = 200 $

نقسم مقدار الزيادة أو النقصان على المقدار الأصلي (الذي كان قبل الزيادة أو النقصان) و هو يبلغ 1800$:

$200 \div 1800 = 0.111$

نضرب ناتج القسمة بمئة :

$0.111 \times 100 = 11.1\%$

أي أن معدل ربح هذا التاجر هو 11.1% .

في هذه المعادلة لا نذكر المقدار الجديد أي 2000 $ دولار و إنما نكتفي بذكر المقدار القديم و الفرق ما بين المقدار القديم و المقدار الجديد.

تأتي عبوات الزيت بسعة 750 ميليمتر و خلال شهر رمضان و مواسم الأعياد تتم إضافة مقدارٍ (مجاني) يبلغ 30% فكم يبلغ مقدار هذه الزيادة من الزيت بالميليمتر؟

نحسب كم تبلغ نسبة 35% من 750 mm من الزيت ، و لحساب هذا المقدار فإننا نكتب النسبة 35% على شكل كسر أي $\frac{30}{100}$ ثم نضرب هذا الكسر بالمقدار الإجمالي أي 750 mm

$\frac{30}{100} \times 750\ mm$

و كما نعلم فإن الكسر ليس إلا عملية قسمة و لذلك فإننا نقوم بتنفيذ عملية القسمة المعلقة تلك :

$\frac{30}{100} =$

$30 \div 100 = 0.3$

نضرب ناتج القسمة أي 0.3 بكمية الزيت :

$0.3 \times 750 = 225\ mm$

إذاً فإن مقدار الزيادة (المجانية) في موسم رمضان و الأعياد يبلغ 225 mm ميليمتر.

ماذا لو أجريت عملية الضرب السابقة و كأنها عملية ضرب كسرين و ذلك بأن أجعل المقدار750 بسطاً لمقامٍ مقداره واحد 1 ؟

$$\frac{30}{100} \times \frac{750}{1}$$

30 × 750 =22500

100 × 1 =100

$$\frac{30}{100} \times \frac{750}{1} = \frac{22500}{100} = 225$$

بما أن الكسر ليس إلا عملية قسمة معلقة فإنني أقوم بتنفيذ عملية القسمة تلك :

22500 ÷ 100 = 225

كما ترون فقد حصلت على النتيجة ذاتها.

النسبة المئوية للنقص

لحساب معدلات الانخفاض و النقصان المئوية فإننا نستخدم المعادلة السابقة ذاتها و لكننا نجري عملية طرح بدلاً من عملية الجمع.

في نهاية موسم الشتاء تجري محلات الملابس تخفيضاً على الأسعار بمقدار 40% على البنطلونات الشتوية فإذا كان سعر البنطلون الواحد قبل الحسم 11$ دولار ، فكم يبلغ ثمنه بعد الحسم؟

لحل هذه المسألة فإننا نستخدم المعادلة السابقة ذاتها :

معدل التغيير أو النسبة المئوية للتغيير تساوي معدل الزيادة أو النقص تقسيم القيمة الأصلية ضرب مئة.

نكتب معدل أو نسبة الحسم أي 60% على شكل كسرٍ من مئة أي $\frac{60}{100}$ ثم نضربه بسعر البنطلون :

$$\frac{60}{100} \times 11 =$$

كما علمتم فإننا لضرب كسرٍ برقم صحيح فإننا إما أن نقوم بتحويل ذلك الكسر إلى رقمٍ عشري عن طريق قسمة بسطه على مقامه و إما أن نقوم بتحويل ذلك الرقم الصحيح إلى كسر و ذلك بأن نجعل من ذلك الرقم بسطاً لمقامٍ مقداره 1 .

$$\frac{60}{100} \times 11 =$$

حتى نتمكن من ضرب الكسر بالرقم 11 فإننا نحوله إلى رقمٍ عشري عن طريق قسمة بسطه على مقامه :

$$60 \div 100 = 0.6$$

و الآن نضرب الرقم العشري الذي حصلنا عليه أي 0.6 بالرقم 11 :

$$11 \times 0.6 = 6.6$$

إذاً فإن مقدار التخفيض في السعر يبلغ $ 6.6 دولار .

الآن لحساب السعر الجديد فإننا نطرح مقدار التخفيض أي 6.6 دولار من السعر القديم أي 11 دولار :

$$11 - 6.6 = 4.4 \$$$

إذاً فإن السعر الجديد يبلغ $ 4.4 دولار.

نتأكد من النتيجة السابقة باستخدام الآلة الحاسبة :

$60\% \times 11 = 6.6$

نتأكد عن طريق تحويل عملية الضرب إلى عملية ضرب كسرين عن طريق جعل العدد 11 بسطاً للمقام واحد:

$$\frac{60}{100} \times \frac{11}{1} = \frac{660}{100} = 660 \div 100 = 6.6$$

لضرب كسرين ببعضهما البعض فإننا نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

$$60 \times 11 = 660$$

$$100 \times 1 = 100$$

نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام :

$$\frac{60}{100} \times \frac{11}{1}$$

$$60 \times 11 = 660$$

$100 \times 1 = 100$

نقسم الناتج على مئة :

$660 \div 100 = 6.6$

حصلنا على النتيجة السابقة ذاتها إذاً فإن العملية صحيحة.

يمكننا القول بأن زيادةً مقدارها 20% مثلاً على المبلغ الأصلي تساوي :

100 % + 20% =120%

و إذا قمنا بتحويل هذه النسبة المئوية إلى رقمٍ عشري فإننا نحصل على 1.25 و هي النسبة التي نضرب بها ذلك المبلغ أو المقدار لنحسب مقدار الزيادة أو النقص.

فإذا كان المبلغ الأصلي $ 1800 دولار :

1800 × 1.25 =2250 $

أما إذا كنا نريد أن نحسب معدل الحسم أو مبلغ الحسم فإننا نجري عملية طرح بدلاً من عملية الجمع :

100 % - 60 % = 40 %

نضرب 40% بسعر البنطلون أي $ 11 دولار :

40 % × 11 =4.4

و هو سعر البنطلون الجديد بعد الحسم و التخفيضات.

النسبة المئوية العكسية Reverse percentage (زيادة النسبة)

إذا كان اليوم سعر المنزل مع الحديقة الملحقة به يساوي $ 300.000 دولار و إذا كانت أسعار العقارات قد ارتفعت بمقدار 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، فكم كان يبلغ سعر هذا المنزل منذ ثلاثة سنوات؟


حتى نتمكن من تصور و حل هذه المسألة فإننا نرسم مخططاً يتضمن البيانات التالية:

السعر الأساسي القديم .

السعر بعد ثلاث سنوات و قد ارتفع بمعدل 15% .

أي أن السعر الجديد أكبر بنسبة 15% من السعر القديم.

و السعر الجديد يبلغ $ 30 0000 ، و هذا يعني بأن $ 300 000 دولار تبلغ % 115 من الثمن الأصلي المجهول.



الرقم الصحيح في الصورة يجب أن يكون 300000

كم تبلغ النسبة 1% واحد بالمئة من السعر الجديد أي 30 0000 دولار ؟

لمعرفة ذلك فإننا نقسم المبلغ الإجمالي أي 30 000 على النسبة المئوية 115 أي 115%

:

$$30\ 0000 \div 115 = 2608.7$$

2608.7 تُمثل واحد بالمئة 1% من مبلغ 300000$ دولار.

2608.7×115=300000

بالضبط 300000.5

لمعرفة كم كان السعر الأصلي أي المئة بالمئة قبل أن يصبح 115 فإننا نضرب ما يساوي واحد بالمئة أي 2608.7 دولار بمئة :

2608.7 × 100 = 260870 $

إذاً فقد كان سعر المنزل منذ ثلاثة سنوات $ 260870 دولار.

2608 تساوي واحد بالمئة 1% أي أنها الوحدة البنائية الأساسية التي مكنتنا من حساب السعر القديم أي المئة بالمئة قبل أن يصبح % 115 .

إيجاد الوحدة البنائية الأساسية أمر شديد الأهمية في حل مثل هذا النوع من المسائل.

حساب مقدار الزيادة

المقدار القديم أي سعر المنزل القديم (مجهول).

معدل الزيادة (معلوم) و هو 15%

القيمة الجديدة أي السعر الجديد (معلوم) $ 30 000 دولار.

فإذا كانت القيمة الجديدة 30 000$ دولار و هي القيمة التي تساوي النسبة % 115 فإن القيمة الأصلية هي ببساطة شديدة 100% أما نسبة 15% فهي تمثل مقدار الزيادة.

أي أنه يتوجب علينا لمعرفة السعر القديم حتى نستطيع أن نحسب كم تمثل نسبة واحد بالمئة 1% لأن ذلك سوف يمكننا من معرفة كم تمثل النسبة 100% و كم تمثل النسبة 15% .

إن نسبة 1% تساوي القيمة الجديدة و هي هنا   300 000 تقسيم النسبة التي تمثلها أي 115 (و ليس 115%) أي أننا نريد أن نعرف كم يبلغ جزءٌ واحد من 300 000 جزء :

300 000 ÷ 115 =2608.7

بمعنى أننا إذا قسمنا المقدار الجديد أو السعر الجديد أي 300 000 إلى 115 جزء فإن كل جزءٍ منه يساوي $ 2608 دولار.

2608	2608		2608	2608	2608	2608	2608	2608	2608
2608		2608	2608		2608		2608		
	2608			2608			2608		
	2608			2608			2608		2608
2608		2608			2608		2608		
	2608		2608		2608		2608		2608
	2608		2608		2608		2608		2608
	2608		2608			2608			
	2608		2608		2608		2608		2608
	2608			2608			2608		
2608			2608		2608		2608		2608
					2608	2608	2608	2608	2608

و بعد أن عرفنا قيمة الوحدة الأساسية أي قيمة واحد أي قيمة جزء من 115 جزء هو 2608 أصبح بإمكاننا أن نحسب كم تبلغ الزيادة 15% عن طريق ضرب العدد 15 (و ليس النسبة 15%) بهذه الوحدة :

15 × 2608 = 39130 $

أي مقدار الزيادة في السعر ، كما أصبح بإمكاننا أن نعرف مقدار المبلغ الأساسي ، أي المئة بالمئة 100% قبل الزيادة منذ ثلاثة أعوام و ذلك عن طريق ضرب هذه الوحدة بالرقم مئة :

2608 × 100 =260869 $

260869 $ دولار هو ثمن المنزل منذ ثلاثة أعوام و هو المبلغ الذي يمثل النسبة مئة بالمئة 100% قبل أن تصبح النسبة 15% .

إذاً إذا قسمنا السعر الجديد أو المقدار الجديد على النسبة الجديدة الموازية له فإننا نحصل على قيمة واحد بالمئة 1% .



حساب معدل الانخفاض المئوي percentage decrease

انخفضت نسبة المبيعات ليبلغ 60% ما كان عليه منذ خمسة أعوام نتيجة أزمة اقتصادية و بقيت بهذه الحالة ، فإذا كان حجم المبيعات هذا العام يبلغ 40000$ دولار فكم كان حجم المبيعات منذ خمسة أعوام؟


حجم الانخفاض منذ 5 أعوام بلغ 60%

حجم المبيعات اليوم 40000$ دولار.

نرسم شكلين حيث يمثل الشكل الأول حجم المبيعات منذ خمسة أعوام أي المقدار الذي كان يمثل النسبة 100% قبل الانخفاض و لكنه مبلغٌ مجهول .

الشكل الثاني يمثل حجم المبيعات اليوم أي $ 40000 دولار و التي تمثل نسبة 60% مما كانت عليه المبيعات منذ خمسة أعوام.

أي أن مبلغ $ 40000 دولار تمثل نسبة 60% من حجم المبيعات كما كانت عليه منذ خمسة أعوام أي نسبة المئة بالمئة.



حجم المبيعات منذ خمسة أعوام

حجم المبيعات اليوم

و كما فعلنا في المثال السابق فإننا **لحساب ما كان عليه حجم المبيعات منذ خمسة أعوام فإن علينا أن نحسب كم يساوي واحد بالمئة 1%، و لذلك فإننا نقسم المبلغ الجديد أي 40000 $ على 60 و ليس على 60% و ليس على مئة لأن هذا المبلغ يمثل 60% من المبلغ القديم .**

أي أن مبلغ $ 40000 دولار يمثل 60% من المبلغ القيم :

40000 ÷ 60 =666

أي أن الوحدة الرئيسية أي الوحدة الواحدة من تلك النسبة المئوية تبلغ $ 666 دولار :

666		666		666		666		666	
	666		666		666		666		666

666		666		666		666		666	
	666		666		666		666		666
666		666		666		666		666	
666		666			666		666		666

و بعد أن عرفنا كم يبلغ مقدار الوحدة الأساسية الواحدة من تلك الستين جزءاً أصبح بإمكاننا أن نحسب ما كان عليه حجم المبيعات منذ خمسة أعوام أي نسبة المئة بالمئة 100% عن طريق ضرب المقدار الذي يمثل واحد بالمئة أي 666 بمئة :

100 × 666 = 66 666$

أي أن حجم المبيعات منذ خمسة أعوام كان يبلغ 66666$ دولار.

666				666					666
666					666				666
666					666				666

أتأكد من صحة العملية التي قمت بها باستخدام الآلة الحاسبة.

60 % × 66666 = 39999.6

39999.6≈40000 $

نعتبر دائماً بأن الحجم أو القيمة الأساسية ، أي القيمة قبل الزيادة و النقصان تساوي مئة بالمئة 100% .

نقوم بحساب كم يبلغ واحد بالمئة 1% و ذلك عن طريق قسمة القيمة المعلومة على النسبة الموازية لها.


المضاعف النسبي المئوي percentage multiplier

في حال كان تنامي و تزايد أو تلاشي و تناقص مقدارٍ ما يتم وفق نمطٍ و نسبة منتظمة يمكننا استخدام ما يدعى بالمضاعف النسبي المئوي percentage multiplier حتى نتمكن من التنبؤ بالنتيجة.

التنامي و التزايد :

موقعٌ الكتروني ما أو قناة على اليوتيوب مثلاً بدأت في عامها الأول بعشرين ألف مشاهدة 20000 و بعد ذلك أخذت أعداد المشاهدين أو الزوار تزداد بمعدلٍ ثابت يبلغ 25% سنوياً ، أي أن الخط البياني الذي يمثل هذه الزيادة عبارة عن منحنى بياني curve يتجه نحو الأعلى (كونه يشير إلى الزيادة و يدعى هذا المنحنى البياني بمنحنى النمو الأسي exponential growth curve).

يمكننا تمثيل الحالة السابقة على شكلٍ إحداثي يتألف من سهمٍ عمودي يبين عدد الزوار و سهم أفقي يبين السنوات و أشكالٌ مستقيمة تزيد كلٌ منها عن سابقتها بنسبة 25% و ذلك في إشارةٍ إلى معدل الزيادة في عدد المشاهدين بادئةً بمستطيل يمثل عدد الزوار في السنة الأولى و هو 20 الف زائر.



الأن لو أردنا معرفة عدد زوار الموقع بعد خمس سنوات من بدء انطلاقه فإننا إما أن نرسم مخططاً يمثل الحالة السابقة أو أن نستخدم المعادلة التالية :

المقدار النهائي N يساوي المقدار الابتدائي N_0 ضرب المضاعف النسبي مرفوعاً للقوة n :

$$N = N_0 \times (\text{multiplier})^n$$

حيث n يمثل عدد التكرار .

Final quantity(N) =Initial quantity (N_0) x (multiplier)

المقدار النهائي N =المقدار الابتدائي (N_0) x المُضاعف مرفوعاً لقوة تمثل عدد تكرار الحالة (هي هنا 5 مرات)

بما أن معدل زيادة عدد زائري الموقع سنوياً يبلغ 25% فذلك يعني بأن المقدار النهائي يساوي 125% من المقدار الابتدائي الذي يساوي بالطبع 100% مئة بالمئة لأن الزيادة تساوي 100% + 25% و النسبة 125% بالمئة تساوي الرقم العشري 1.25 واحد و 25 بالمئة لأن

:

1.25 × 100 =125

انتبه جيداً :

المضاعف multiplier يساوي هنا النسبة 125% بعد تحويلها إلى رقمٍ عشري

أي بعد قسمة الرقم 25 على مئة $\frac{125}{100}$ أي :

125÷100=1.25

أما القوة التي رفعت إليها المضاعف النسبي 1.25 فهي القوة الخامسة لأن هذه الزيادة قد تكررت على مدى خمس سنوات.

فإذا كان عدد الزوار في السنة الاولى 20 ألف زائر و كانت الزيادة 25% كل عام فذلك يعني أن الزيادة تبلغ 125% و هي تساوي الرقم العشري 1.25 .

نطبق المعادلة السابقة :

القيمة النهائية N اي عدد زوار الموقع بعد مدة n (خمس سنوات) (و هي مجهول المعادلة) تساوي = القيمة الابتدائية N_0 (و هي هنا 20 ألف زائر) ضرب المضاعف النسبي multiplier و هو النسبة المئوية للزيادة و هي هنا 1.25 و هي توازي النسبة 25% زائد 100% .

1.25 = 125%


100% +25% =125%

مرفوعاً لقوة تساوي معدل تكرار الحالة و هو هنا خمس سنوات 5 .

أي أن عدد زوار الموقع بعد خمس سنوات (و هو مجهول المعادلة) يساوي 20ألف أي

20 000 ضرب 1.25 مرفوعةً للقوة الخامسة :

$$N = 20\,000 \times 1.25^{5} = 61035$$



لا تضرب بالمضاعف النسبي مثلاً 25% و إنما اضرب بالنسبة الكاملة أي 125% أي اضرب بالمضاعف النسبي (معدل الزيادة الدورية) + 100% تمثل المقدار الأصلي.

هل الضرب بالنسبة المئوية 125% أي $\frac{125}{100}$ يساوي الضرب بالرقم العشري 1.25 ؟

$$20000 \times \frac{125}{100} = \frac{20000}{1} \times \frac{125}{100} = 20000 \times 1.25 = 25000$$

$$\frac{125}{100} = 125 \div 100 = 1.25$$

حتى أتمكن من أضرب الرقم 20000 بالكسر المئوي $\frac{125}{100}$ فقد قمت بتحويله إلى كسر و ذلك بأن جعلت منه بسطاً لكسرٍ مقامه العدد واحد $\frac{20000}{1}$.

قمت بضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

الآن لنجرب ضرب القيمة الابتدائية أي عدد الزوار في العام الأول و هو 20 000 زائر بالنسبة : 1.25

$$20\,000 \times 1.25 = 25000$$

إذاً فإن النتيجتين متماثلتين.

ماذا يحدث لو أنني في المعادلة السابقة و بدلاً من أن أضرب بمعدل الزيادة زائد 100% أي 125% قمت بالضرب بالنسبة المئوية للزيادة فقط أي 25% أي 0.25 ؟

إنني سوف أحصل على نتيجة خاطئة إذ سوف أحصل على نتيجة أقل من القيمة الأصلية قبل الزيادة أي 20000 زائر، أي أن عدد الزوار بعد الزيادة التي مقدارها 125% خلال خمس سنوات سوف يصبح أقل مما كان عليه قبل الزيادة و هو أمرٌ غير منطقي.

$$20000 \times 0.25^5 = 20$$

كما ترون فقد كان الناتج 20 زائر و هو أقل من الرقم الأصلي 20000 زائر بألف مرة.

و سبب ذلك أنني عندما أضرب بنسبة الزيادة المئوية فقط (التي هي هنا 5% أي 0.25) دون مئة فكأنني أقسم على ربع.

$$20000\times \frac{25}{100} = \frac{20000}{1} \times \frac{25}{100} = \frac{50000}{100} = 5000$$

حتى أتمكن من أضرب الرقم 20000 بالكسر المئوي $\frac{25}{100}$ فقد قمت بتحويله إلى كسر و ذلك بأن جعلت منه بسطاً لكسرٍ مقامه العدد واحد $\frac{20000}{1}$.

قمت بضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

$$\frac{25}{100} = 25 \div 100 = 0.25$$

و هو كما ترون عددٌ أقل من عدد الزوار الأصلي قبل الزيادة و هي بالطبع إجابة خاطئة.

إن القوة التي نرفع إليها النتيجة في المعادلة السابقة تدلنا على عدد المرات التي تكررت فيها تلك الزيادة النسبية ، و في مثالنا السابق قمت باستخدام القوة الخامسة لأن الزيادة تكررت خمس مرات (خمس سنوات) و ذلك لأنني قمت بحسابها على أساسٍ سنوي.

إذاً لو أننا استخدمنا فقط نسبة الزيادة أي 25% بدلاً من استخدام النسبة بأكملها أي 125% فإننا في تلك الحالة سوف نحسب فقط مقدار الزيادات أي 25% بدون القيمة الأصلية أي دون حساب عدد الزوار الأصلي ، بينما نحن نريد أن نحسب كلاً من القيمة الأصلية الذي تمثله النسبة 100% مضافاً إليها نسبة الزيادة السنوية و هي 25% و لذلك فقد قمت باعتماد نسبة 25% على اعتبار أن نسبة الزيادة المئوية تبلغ كل عام 25% .



حساب التزايد و التناقص

يمكننا استخدام المضاعف النسبي المئوي percentage multiplier وذلك لحساب التناقص المتواتر.

مثال على التناقص المتواتر :

تباع سيارة عائلية مصغرة بسعر 2000 $ دولار ، فإذا كان سعرها ينخفض سنوياً بمقدار 15% فكم سوف يصبح سعرها بعد ثلاث سنوات؟


نرسم مخططاً بيانياً يمثل المسألة و يتألف من مستقيم عمودي يمثل سعر السيارة و مستقيمٍ أفقي يمثل السنوات حيث يتقاطع هذين المستقيمان المتعامدان عند نقطة تمثل صفر دولار .

نرسم مستطيلاتٍ عمودية ترتكز على المستقيم الأفقي تمثل السنوات .

بيانات المسألة :

السعر الأصلي (القيمة الأصلية) $ 2000 دولار.

مقدار الانخفاض في السعر : 15% .



الخط البياني في هذه المسألة هو خطٌ مستقيم هابط يتجه نحو الأسفل (ذو اتجاهٍ سلبي) .

نقوم بتحويل معدل التغير النسبي المئوي أي 15% إلى مضاعف multiplier ، و بالنسبة لمعدل انخفاضٍ سنوي يبلغ 15% فإننا نستخدم مضاعفاً مكملاً و ذلك لأن النسبة المئوية هنا تدل على انخفاضٍ و نقص و ليس على ارتفاعٍ و زيادة.

نستخدم مضاعفاً مكملاً و ذلك لأن النسبة المئوية هنا تدل على انخفاضٍ و نقص و ليس على ارتفاعٍ و زيادة

فإذا كانت نسبة الانخفاض تبلغ 15% و هي نسبةٌ تساوي الرقم العشري خمسة عشر بالمئة 0.15 فإن قيمة هذا الرقم المكملة، أي الرقم العشري المكمل تبلغ 0.85 خمسة و ثمانين بالمئة و ذلك لأننا نبحث هنا عن مكمل الرقم العشري إلى واحدٍ صحيح :

$0.15 + 0.85 = 1$

نطبق المعادلة السابقة :

القيمة النهائية N تساوي = القيمة الابتدائية N_0 ضرب المضاعف (هنا المكمل) مرفوعاً إلى قوةٍ تماثل عدد التواتر.

$\text{Final value} = N_0 \times (\text{multiplier})^3$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

القيمة النهائية (السعر النهائي للسيارة بعد ثلاث سنوات) قيمة مجهولة ؟ = القيمة الابتدائية 2000 $ دولار ضرب المضاعف المكمل و هو هنا خمسة و ثمانين بالمئة 0.85 (مكمل الرقم 0.15 الذي مثل نسبة الانخفاض المئوية 15% إلى عددٍ صحيح) مرفوعاً للقوة الثالثة 0.5^3 .

لماذا رفعناه للقوة الثالثة؟

لأننا نريد أن نعرف كم سوف يصبح ثمن هذه السيارة بعد ثلاث سنوات.

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة:

بما أننا نتحدث هما عن انخفاضٍ و نقص و ليس عن ارتفاعٍ و زيادة فإننا نبحث عن مكمل النسبة 15% و التي توازي الرقم العشري 0.15 خمسة عشر بالمئة ، و بالطبع فإن مكمل هذا الرقم العشري إلى واحد صحيح هو الرقم 0.85 :

$0.85 + 0.15 = 1$

الأن نطبق المعادلة السابقة :

نرفع المكمل 0.85 إلى القوة الثالثة لأننا نريد معرفة سعر السيارة بعد ثلاث سنوات.

$(0.85)^3 = 0.614125$

الآن نضرب القيمة الأصلية أي $ 2000 دولار بالمضاعف المكمل السابق أي

$(0.85)^3 = 0.614125$ فنقول :

$$2000 \times 0.614125 = 1228\$$$

أي أن سعر هذه السيارة بعد ثلاث سنوات سوف يصبح $ 1228 دولار.

طريقة للتأكد من صحة الحل :

15 % من السعر الأساسي أي $ 2000 دولار تساوي $ 300 دولار ، أي أن سعر السيارة سوف يصبح في العام الأول :

2000 – 300 = 1700 $

سعر السيارة في العام التالي:

15% من 1700 تساوي 225

1700 -255 =1445

1445 هو سعر السيارة في العام الثاني .

15% من 1445 تساوي 216

1445 – 216 =1229 $

قمت بإهمال الكسور العشرية اي أن الإجابة التي حصلت عليها سابقاً إجابة صحيحة.

الفائدة المركبة Compound interest – الربا المضاعفة

تعني الفائدة المركبة أن الأرباح الربوية التي يجنيها المال الربوي في البنوك تضاف إلى رأس المال الأساسي مما يؤدي إلى أن تزداد الأرباح الربوية التي يجنيها المال مما يؤدي إلى زيادة المبلغ ثانيةً و ارتفاع فوائده بالنتيجة و هكذا دواليك .

لحساب الفائدة المركبة فإننا نستخدم المعادلة ذاتها التي مرت معنا سابقاً :

إجمالي المبلغ الأساسي N_0 ضرب المضاعف الربوي مرفوعاً لقوةٍ تماثل عدد سنين الإيداع كون الفائدة المركبة تجنى على أساسٍ سنوي.

القيمة النهائية N (الرصيد المصرفي النهائي) يُساوي = القيمة الابتدائية N_0 (الوديعة) ضرب المضاعف (هنا المضاعف الربوي) مرفوعاً إلى قوةٍ تماثل عدد التواتر.

$$\text{Final value} = N_0 \times (\text{multiplier})^n$$

كيف نحسب المضاعف الربوي في هذه المعادلة؟

نقوم بحساب المضاعف الربوي في هذه المعادلة بالطريقة ذاتها التي نحسب فيها معدلات الزيادة المئوية كما مرت معنا سابقاً ، أي أننا نضيف الفائدة الربوية إلى المبلغ الأساسي أو القرض الأساسي على أن نعتبر بأن المبلغ الأساسي يمثل مئةً بالمئة 100% .

فإذا كان معدل الفائدة الربوية المركبة 10% عشرة بالمئة فإننا لا نحسب المضاعف الربوي على أنه 10% و إنما فإننا نعتبره أولاً بأنه عشرة بالمئة 10% + 100% مئة بالمئة (عشرة بالمئة زائد مئة بالمئة) ، ذلك أن نسبة العشرة بالمئة 10% تمثل الفائدة الربوية بينما نسبة المئة بالمئة 100% تمثل الرصيد المصرفي أي أن النسبة الصحيح لحساب الفائدة الربوية المركبة سوف تكون :

$$10\% + 100\% = 110\%$$

و كما مر معنا سابقاً فإننا نقوم بتحويل هذه النسبة أي 110% إلى رقمٍ عشريٍ مكافئ لهذه النسبة نحصل عليه عن طريق تحويل النسبة المئوية إلى كسر ثم تنفيذ عملية القسمة المعلقة في ذلك الكسر أي تنفيذ قسمة البسط على المقام :

$$110\% = \frac{110}{100} = 110 \div 100 = 1.1$$

فإذا كان معدل الفائدة الربوية 18% مثلاً فإننا سوف نحسب المضاعف المئوي الربوي بالطريقة التالية :

$$18\% + 100\% = 118\%$$

$$118\,\% = \frac{118}{100} = 118 \div 100 = 1.18$$

▪

بعد أن علمنا كيفية حساب المضاعف الربوي يُصبح تطبيق معادلة حساب الفائدة الربوية المركبة أمراً سهلاً جداً بالنسبة لنا .

اقترض شخصٌ ما من البنك قرضاً بفائدة مركبة لشراء سيارة يبلغ سعرها $ 2000 دولار بفائدة ربوية مركبة مقدارها 20% على أن يتم سداد المبلغ خلال أربعة أعوام .

فإن لم يقم هذا الشخص بسداد أي جزءٍ من القرض فكم سوف يُصبح هذا الدين عندما يصبح موجب الدفع بعد أربع سنوات؟

بيانات المسألة :

قيمة الدين الأساسي $ 2000 دولار.

مقدار الفائدة الربوية المركبة 20% من قيمة الدين.

مدة القرض 4 سنوات .

لحساب مقدار الدين بعد 4 سنوات فإننا نطبق معادلة الفائدة المركبة.

الخطوة الأولى التي يتوجب القيام بها يتمثل في حساب المضاعف المئوي الربوي و ذلك بإضافة الفائدة المركبة 20% إلى النسبة المئوية التي تمثل المبلغ الأصلي أي 100% :

$$100\ \% + 20\ \% = 120\ \%$$

و من ثم فإننا نقوم بتحويل هذه النسبة المئوية أي 120 % إلى كسرٍ $\frac{120}{100}$ ثم نقوم بتنفيذ عملية القسمة المعلقة في الكسر :

$$120 \div 100 = 1.2$$

ثم نرفع المضاعف الربوي لقوة تماثل عدد سنوات القرض أي 4 سنوات فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

المبلغ الإجمالي مع فوائده الربوية المركبة (الدين المستحق الدفع أو الواجب السداد) يساوي = قيمة الدين الأساسي أي $ 2000 دولار ضرب المضاعف الربوي أي 1.2 كما حسبناه مرفوعاً للقوة الرابعة و هي مدة القرض أي السنوات الأربعة :

$$N=2000 \times (1.2)^4$$

$$1.2^4 = 2.0736$$

$$2000 \times 2.0736 = 4147\ \$$$

إذاً فإن قيمة القرض بعد أربع سنوات بفائدة مركبة مقدارها 20% تبلغ 4147 $ دولار .

لنتأكد بطريقة أخرى من صحة العملية التي قمنا بها :

في السنة الأولى ستكون هنالك فائدة ربوية مقدارها 400 $ دولار:

$$20\ \% \times 2000 = 400\ \$$$

$$\frac{20}{100} \times \frac{2000}{1} = \frac{20 \times 2000}{100 \times 1} = \frac{40000}{100} = 400$$

حتى أتمكن من ضرب النسبة 20% بالرقم 2000 للحصول على نسبة 20$ من الرقم 2000قمت بتحويل النسبة 20% إلى كسر عن طريق جعل الرقم 20 بسطاً للمقام 100 ، كما حولت الرقم 2000 إلى كسر و ذلك بأن جعلت منه بسطاً لمقامٍ مقداره واحد .

في السنة الثانية سوف يكون المبلغ $ 2400 دولار و سوف تكون فائدته المركبة :

20 % x 2400 $ = 480 $

$$\frac{20}{100} \times \frac{2400}{1} = \frac{20 \times 2400}{100 \times 1} = \frac{48000}{100} = 480$$

أي أن المبلغ سوف يكون في نهاية العام التالي :

2400 + 480 =2880 $

و في العام الثالث سوف يكون الربح الربوي للمبلغ :

20 % × 2880 $ =576

$$\frac{20}{100} \times \frac{2880}{1} = \frac{20 \times 2880}{100 \times 1} = \frac{57600}{100} = 576$$

و في العام العام الرابع سوف يصبح المبلغ

2880 + 576 = 3456 $

و سوف يكون ربحه الربوي السنوي :

20 % × 2880 $ =576


$$\frac{20}{100} \times \frac{3456}{1} = \frac{20 \times 3456}{100 \times 1} = \frac{69120}{100} = 691$$

دائماً حتى أتمكن من ضرب النسبة 20% بالرصيد للحصول على نسبة 20$ منه قمت بتحويل النسبة 20% إلى كسر عن طريق جعل الرقم 20 بسطاً للمقام 100 ، كما حولت الرصيد إلى كسر و ذلك بأن جعلت منه بسطاً لمقامٍ مقداره واحد .

الآن نضيف هذا الربح الربوي الأخير :

3456 +69 = 4147

$ 4147 مع إهمال الكسور ، أي أن العملية التي قمت بها سابقاً كانت صحيحة.



تذكر دائماً بأنه عند حساب الزيادة النسبية المئوية أن يتألف المضاعف من كلٍ من نسبة الزيادة المئوية + النسبة التي تمثل المقدار الأساسي أي 100% .

أما عند حساب نقصٍ و انخفاض نسبي مئوي فإننا نعتمد مكمل النسبة المئوية إلى واحد صحيح كمضاعف.

الفائدة الربوية المركبة هي الربح الذي نحسبه على كلٍ من القرض الأساسي في العام الأول ، ثم على المبلغ الأساسي و الفائدة التي أضيفت له في العام الثاني و هكذا.



قلب العلاقات الرياضية و الفيزيائية و إعادة ترتيبها

$$A=\frac{B}{C}$$

عندما تكون لدي العلاقة الرياضية أو الفيزيائية التالية $A=\frac{B}{C}$ و أضطر إلى قلبها و إعادة ترتيب العمليات الرياضية فيها حتى أتمكن من حلها و حتى أتمكن من جعل مجهولها ناتجها و هدفها أي حتى أتمكن من استبعاده من العمليات الرياضية الجارية ، فإن لدي 3 خيارات لقلب العلاقة السابقة ، و سوف تتذكر كيفية قلب العلاقة الرياضية السابقة دائماً و لن تنساها أبداً عندما تذكر الصيغة الرقمية المكافئة لها لأن عناصرها مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً منطقياً:

$$A=\frac{B}{C}$$

$$C=\frac{B}{A}$$

$$B=C x A$$

$$B = A x C$$

$$50 = \frac{100}{2}$$

$$2 = \frac{100}{50}$$

$$100 = 2 x 50$$

$$100 = 50x2$$

مثال تطبيقي :

لنفترض بأن :

A =50, B=100, C=2

$$A=\frac{B}{C}$$

$$50=\frac{100}{2}$$

$$A=50,\ B=100,\ C=2$$

$$C=\frac{B}{A}$$

$$2=\frac{100}{50}$$

$$A=50,\ B=100,\ C=2$$

$$100=\frac{50}{2}$$

$$B=A\times C$$

$$100=50\times 2$$

$$A=50, B=100, C=2$$

$$B=C\times A$$

$$100=2\times 50$$



إذاً كلما قابلتك علاقة رياضية أو فيزيائية على الشكل $A=\frac{B}{C}$ فاعلم بأن بإمكانك معرفة نتيجتها المجهولة عن طريق قلبها و إعادة ترتيبها و تحويلها إلى عدة عمليات ضربٍ و قسمة حتى تتمكن من معرفة مجهولها .



كيف اقلب العلاقات المماثلة ؟

لتكن لدي معادلة السرعة التي تقول بأن السرعة = المسافة \ الزمن

السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

Speed = Distance / Time

Speed = $\frac{Distance}{Time}$

فإذا رمزت للسرعة **بالرمز S و المسافة بالرمز D و الزمن بالرمز T** فإنني سوف اعتبرها علاقةً شبيهة بالعلاقة السابقة التي مرت معنا:

A= $\frac{B}{C}$

S= $\frac{D}{T}$

و بالطريقة ذاتها فإننا اعتبر بأن العنصر العلوي D هو ناتج ضرب العنصرين السفليين ببعضهما البعض :

$$S=\frac{D}{T}$$

$$D=S\times T$$

المسافة =السرعة×الزمن

$$B=A\times C$$

$$100=50\times 2$$

$$D=T\times S$$

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$B=C\times A$$

$$100=2\times 50$$

كما أن بإمكاننا بالطريقة ذاتها التي مرت معنا سابقاً إعادة ترتيب العلاقة السابقة :

$$S=\frac{D}{T}$$

$$T=\frac{D}{S}$$

$$\text{الزمن}=\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

إذا لا تتوقف أبداً عند الصيغة الأصلية للمعادلة و لكن قبل قيامك بإعادة ترتيب العناصر ضمن المعادلة و ذلك لجعل مجهول المعادلة هو ناتجها أي القيام بتخريج المجهول من العمليات الرياضية و إبداله بعنصرٍ معلوم عن طريق جعله ناتجاً للمعادلة ،و قبل قيامك بتغيير نوعية العملية الجارية في تلك المعادلة من قسمة إلى ضرب مثلاً قم بتجربة القيام بذلك على أعداد بسيطة بحيث تكون العلاقة فيما بينها صحيحة وفق الصيغة الأساسية للمعادلة فإذا كان ذلك منطقياً و ممكناً قم بتطبيقه على بيانات المعادلة.

مثال آخر على كيفية القيام بإعادة ترتيب العناصر في المعادلات و عكس العمليات الرياضية الجارية فيها أي تحويلها مثلاً من علاقة قسمة إلى علاقة معاكسة (علاقة ضرب) و بالعكس.

الضغط = القوة \ المساحة

Pressure = Force / Area

P الضغط

$$\text{الضغط} = \frac{\text{القوة}}{\text{المساحة}}$$

$$\text{Pressure} = \frac{Force}{Area}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

القوة = الضغط × المساحة

Force =Pressure × Area

$$F = P \times A$$

×

$$\text{المساحة} = \frac{\text{القوة}}{\text{الضغط}}$$

$$A = \frac{F}{P}$$

بكل بساطة

كيف لا تنسى أبداً كيف تعيد ترتيب العناصر و العمليات في العلاقات المشابهة فقط تذكر هذه العلاقة بكل بساطة و تذكر بأن العلاقة الأولى إذا كانت صحيحة فإن جميع العلاقات الأخرى ستكون صحيحة كذلك.

$$5 = \frac{10}{2}$$

$$2=\frac{10}{5}$$

$$5=\frac{10}{2}$$

$$10 = 2 \times 5$$

$$10 = 5 \times 2$$



الضغط

الضغط هو القوة المطبقة على مساحة معينة أو على سطحٍ معين، حيث تقاس القوة بوحدة النيوتن Newtons ، بينما يُقاس الضغط بوحدة النيوتن على المتر المربع (القوة على المساحة) .

Pressure = N/m^2

و هي تقاس بوحدة الباسكال Pascals (Pa)

الكثافة Density :

تعني الكثافة مقدار ثقل شيءٍ ما بالنسبة لحجمٍ معين ، و الكثافة تساوي الكتلة مقسومةً على الحجم.

Density = Mass/Volume

$$\text{Density} = \frac{Mass}{Volume}$$

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$

$$\frac{10}{2} = 5$$

ألا تذكرنا هذه العلاقة بشيء ؟

إنها تذكرنا بالعلاقة التي تكلمت عنها سابقاً اي العلاقة التي يتم تعرفون جميع تفريعاتها :

$$D=\frac{M}{V}$$

$$\text{الحجم} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الكثافة}}$$

$$5=\frac{10}{2}$$

$$Volume = \frac{Mass}{Density}$$

$$\text{الحجم} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الكثافة}}$$

$$2 = \frac{10}{5}$$

الكتلة M تساوي = الكثافة D ضرب الحجم V

.

$$M = D \times V$$

$$10 = 2 \times 5$$


نذهب إلى العلاقة الأولى و نفترض بأن :




الكثافة D تساوي 5

الكتلة M تساوي 10

الحجم V يُساوي 2

و كل ما تسمح به العلاقة الرياضية بين الأعداد 2 و 5 و 10 يصح على ما يماثلها من العلاقات الرياضية و الفيزيائية.



To find density:	To find mass:	To find volume:
		
$D = \frac{M}{V}$	$M = D \times V$	$V = \frac{M}{D}$



تبلغ المسافة بين موقعين 6000 KM كيلو متر و تتطلب الطائرة 8 ساعات حتى تقطع هذه المسافة .

احسب متوسط سرعة هذه الطائرة.

لحل هذه المسألة نستخدم المعادلة التي مرت معنا سابقاً :

السرعة = المسافة \ الزمن

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة لدينا :

السرعة = 6000 كيلو متر \ 8 ساعات

6000/8 =750 MPH

هو متوسط سرعة الطائرة.

و باستخدام الطريقة السابقة يمكننا أن نحسب كل أطراف المعادلة شريطة أن يكون لدينا طرفين معلومين.

لدينا حلية ذهبية يبلغ وزنها 15 g غرام ، فإذا كانت كثافة الذهب تبلغ $20\ g/cm^3$

20 غرام في السنتي متر المكعب فما هو حجم هذه الحلية الذهبية بالسنتيمتر المكعب؟

لحساب حجم هذه الحلية فإننا نستخدم معادلة حساب الكثافة التي مرت معنا سابقاً :

الكثافة = الكتلة\الحجم

D =M/V

و كما مر معنا سابقاً فإننا نقوم بترتيب هذه المعادلة بالشكل الهرمي الذي مر معنا سابقاً :

و بما أن مجهول المعادلة هو الحجم V و ليس الكثافة D ، فإننا نقسم الكتلة M على الكثافة D لإيجاد الحجم كما مر معنا :

V=M/D

$$Volume = \frac{Mass}{Density}$$


$$\text{الحجم} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الكثافة}}$$




$$2 = \frac{10}{5}$$

$V = 15 / 20 g/cm^3$

$15/20 g/cm^3 = 0.75\ cm^3$

إذاً فإن حجم هذه الحلية يبلغ $0.75\ cm^3$ سنتمتر مكعب.



To find density:	To find mass:	To find volume:
		
$D = \frac{M}{V}$	$M = D \times V$	$V = \frac{M}{D}$

حتى لا تنسى تذكر هذه العلاقة .

تخيل بأن الحرف M (م) الذي يرمز للكتلة هو أول حرف في كلمة (مئة) و لذلك ضع مئة مكانه أو ضعه مكان المئة.

لا تفعل ذلك ابداً على ورقة الامتحان.

نستخدم هذه الطريقة فقط حتى نتعلم كيف يمكن لنا ان نعيد ترتيب المعادلات المماثلة.

$$50=\frac{100}{2}$$

$$2=\frac{100}{50}$$

$100 = 50 \times 2$

قطعة قرميد تبلغ مساحة سطح قاعدتها $0.2\ m^2$ (اثنين بالعشرة من المتر المربع) و تضغط على الأرض بشدةٍ مقدارها $9700\ N/m^2$ نيوتن على المتر المربع.

احسب القوة التي تطبقها قطعة القرميد هذه على الأرض بوحدة النيوتن.

لحل هذه المسألة فإننا نستخدم معادلة حساب الضغط :

الضغط = القوة \ المساحة

P=F/A

$$\text{الضغط} = \frac{\text{القوة}}{\text{المساحة}}$$

$$\mathrm{P} = \frac{F}{A}$$

و كما مر معنا سابقاً فإننا نعيد ترتيب عناصر المعادلة بحيث نخرج مجهولها من العمليات و نجعله ناتجاً.

كما ترون فإن المطلوب إيجاده هو القوة F و ليس الضغط (الناتج الطبيعي للمعادلة) و لذلك فإننا سوف نستخدم طريق إعادة ترتيب عناصر المعادلة و تبديل طبيعة العمليات الجارية فيها.

$$\text{الضغط} = \frac{\text{القوة}}{\text{المساحة}}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

يمكننا القول بأن القوة = الضغط × المساحة

F =P × A

الرقم 10 هنا يوازي القوة F و الرقم 5 يوازي من حيث موضعه الضغط P و العدد 2 يماثل المساحة .


$$5=\frac{10}{2}$$


$$10 = 5 \times 2$$

قم بضبط العلاقة أو القانون الفيزيائي أو الرياضي مع الأعداد 10 و 5 و 2 مثلاً ، ثم قم بقلبها وفق ما يناسب غايتك و ذلك وفق ما تسمح به العلاقة الرياضية بين هذه الأعداد،أي أن العلاقة الرياضية بين هذه الأعداد الثلاثة تمثل الميزان المنطقي للعلاقة بين عناصر القانون الثلاثة ، و بينما لا نستطيع أن نحكم على منطقية العلاقة بين العناصر الثلاثة المكونة لأي قانون فيزيائي أو هندسي عندما نقوم بتبديل مواضع العناصر المكونة له

أو تحويل علاقة القسمة مثلاً إلى علاقة ضرب فإنه يُصبح بإمكاننا ببساطة أن نحكم على صحة و منطقية العلاقة أو القانون عندما نقوم بقلبه و ذلك عندما نقوم بربطه بأعداد بينها علاقة رياضية منطقية بسيطة .

قم بربط الأعداد 2 و 5 و 10 مثلاً مع عناصر أول صيغة من صيغ القانون الفيزيائي حتى تتمكن من قلب ذلك القانون وفق ما تسمح به العلاقة بين هذه الأعداد.





$$50=\frac{100}{2}$$

$$2=\frac{100}{50}$$

$$100 = 50 \times 2$$

القوة = الضغط × المساحة

F =P × A

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$F=9700 \times 0.2$

$9700 \times 0.2 = 1940\ N$

1940 نيوتن

إذاً كما مر معنا سابقاً فإن لكل معادلة رياضية أو فيزيائية مطلوبٌ أو ناتجٌ مجهول و عوامل تمكننا من إيجاد ذلك المجهول ، و لكن يحدث كثيراً أن المطلوب منا إيجاده لا يكون المطلوب و الناتج الافتراضي لتلك المعادلة و إنما فإن ذلك المطلوب المجهول يكون أحد عواملها الأخرى و هنا تبرز أهمية الطريقة السابقة في إعادة ترتيب المعادلة و عكس العميات الجارية فيها لإخراج المطلوب المجهول من العمليات الجارية و جعله ناتجاً و إدخال عنصرٌ معلوم مكانه.



المحيط و المساحة

يُمكن توصيف كل شكلٍ مغلق ثنائي الأبعاد سواءً أكانت أضلاعه منحنيةً أو مستقيمة من خلال كلٍ من محيطه و مساحته ، و المحيط هو المسافة التي تحيط بالشكل من الخارج بينما المساحة هي مقدار الفراغ المحصور ضمن حدود الشكل الخارجي.

يمكن حساب محيط شكلٍ ما من خلال جمع أطوال أضلاعه ذلك أن محيط شكلٍ ما هو مجموع أطوال أضلاعه أما مساحة الشكل فهي الفراغ المحصور ضمن محيطه.

تقاس المساحة بالمتر المربع .


Perimeter (محيط) نلفظ الحرف t فيه على الشكل d (بريميدار)

تساوي مساحة المستطيل ناتج ضرب طوله بعرضه


Area of rectangle = l × w


أما مساحة متوازي الأضلاع parallelogram فهي تساوي طول قاعدته b ضرب ارتفاعه h :


b×h



تساوي مساحة المثلث نصف $\frac{1}{2}$ × القاعدة b ضرب الارتفاع h .








لماذا ضربت المساحة بالنسبة نصف $\frac{1}{2}$ ؟

إن الضرب بالنسبة نصف يعادل القسمة على 2 ، و لو لم أضرب المساحة بهذه النسبة فإنني سوف أحصل على مساحة مستطيل لأن القاعدة تساوي ضلع و الارتفاع يساوي كذلك ضلع.

تذكر دائماً بأن الضرب بنصف يساوي عملية القسمة على نصف.

شبه المنحرف trapezoid




مساحة شبه المنحرف تساوي النسبة نصف $\frac{1}{2}$ ضرب مجموع الضلعين المتوازيين ضرب الارتفاع.


كما يُمكن حساب مساحة شبه المنحرف من خلال المعادلة :

$\frac{1}{2} = (a + b) \times h$

و يمكن حساب مساحة شبه المنحرف من خلال قسمته إلى مثلثين و مستطيل ثم القيام بحساب مساحة كلٍ منهما على حدة و من ثم القيام بجمع النتائج مع بعضها.


عند قسمة متوازي الأضلاع إلى مستطيل و مثلثين فإن ارتفاع متوازي الأضلاع يساوي ارتفاع المثلث .






و إذا قمت بقص أحد المثلثين من إحدى الجهتين و لصقته بالجهة الأخرى فإن متوازي الأضلاع يتحول عندها إلى مستطيل :

لاحظ كيف انتزعت المثلث الزائد من الجهة اليسرى ثم قمت بلصقه في الجهة اليمنى مكان النقص (في موضع المثلث الناقص).




و في هذه الحالة فإن متوازي الأضلاع سوف يتحول إلى شكلٍ مستطيل .

إن طول المستطيل الناتج يساوي طول قاعدة متوازي الأضلاع أما عرضه فيساوي ارتفاع متوازي الأضلاع و لذلك فإن مساحة هذا المستطيل تساوي قاعدة متوازي الأضلاع × الارتفاع و كذلك فإن مساحة متوازي الأضلاع تساوي طول قاعدته ضرب ارتفاعه.




طول المستطيل هو ذاته طول قاعدة متوازي الأضلاع




طول المستطيل هو ذاته طول قاعدة متوازي الأضلاع


المسافة التي ازدادت في الجهة اليمنى قمت باقتطاعها من الجهة اليسرى أي انه لم تحدث أية زيادة في الطول.



يمكن تقسيم شبه المنحرف إلى متوازي أضلاع و مثلث متساوي الساقين غير أن الأمر يصبح عندها أكثر صعوبة.



يتألف متوازي الأضلاع من مستطيل و مثلثين.



يمكن تحويل متوازي الأضلاع إلى مستطيل له الحجم ذاته.

محيط الدائرة circumference


محيط الدائرة هو المسافة حول حدها الخارجي ، أما مساحة الدائرة فهي مقدار الفراغ الموجود ضمن محيطها .


يتم حساب محيط الدائرة باستخدام (ثابت) أي رقمٍ خاص يدعى (باي) π pi و هذا الرقم أو هذا الثابت يمثل نسبةً كونية ثابتة في جميع الدوائر ما بين محيط الدائرة و قطرها diameter بمعنى أن محيط أي دائرة يجب أن يُعادل 4.13 مرة قطرها ، اي أن محيط أي دائرة يجب أن يكون أكبر من قطرها بثلاث مرات و 14 بالمئة 3.14 .

يمثل الرقم العشري 14 بالمئة الموجود في الثابت باي 3.14 مثالاً عن الأرقام العشرية الدورية المستمرة التي تتكرر و تستمر إلى ما لا نهاية :

3.14159265358979323846264338327950


و لذلك فإننا نستخدم الآلة الحاسبة في التعامل مع هذا الثابت فبمجرد ضغط الزر باي π تعلم الآلة الحاسبة بأنك قد أدخلت الرقم باي و تريد إجراء العمليات الرياضية عليه و لا نحتاج بذلك لإدخال ذلك الرقم الطويل بشكلٍ يدوي.






3.14 15 92 65 35
89 79 32 38 46
26 43 38 32 79
50 28 84 19 71
69 39 93 75 10
58 20 97 49 44
59 23 07 81 64
06 28 62 08 99
86 28 03 48 25
34 21 17 06 79...


موقع الثابت باي π على مستقيم الأعداد :




القطر و المحيط

قطر الدائرة diameter هو المستقيم الذي يصل بين نقطتين على محيط الدائرة مروراً بمركزها ..





نصف قطر الدائرة radius هو المستقيم الذي يمتد ما بين نقطةٍ ما على محيط الدائرة و بين مركز الدائرة.



معادلة حساب محيط الدائرة Circumference

محيط الدائرة C يساوي الثابت باي π ضرب قطر الدائرة

Circumference = π ×d

$$C = \pi \times d$$

محيط الدائرة = باي π × قطر الدائرة d .

لماذا هذه العلاقة ؟

كما ذكرت سابقاً فإن هنالك علاقة و نسبة ثابتة ما بين محيط أي دائرة و قطرها و هي النسبة التي يُمثلها الثابت باي π.

إن معادلة حساب محيط الدائرة عن طريق ضرب طول قطرها بالثابت باي π تعني تنفيذ تلك العلاقة ما بين قطر الدائرة و مُحيطها.

و بما أن طول نصف قطر الدائرة r يساوي ضعف طول نصف قطرها فإن محيط الدائرة يساوي
:

Circumference = 2 π × r

محيط الدائرة = 2 × باي π × نصف القطر r

فإذا كان لدينا دائرة يبلغ طول نصف قطرها 14 سنتمتر فإن مُحيطها يُساوي:

C=2x π x14=87.9646 cm



مساحة الدائرة تساوي الثابت باي π ضرب نصف قطر الدائرة r مرفوعاً للقوة الثانية .

Area of a circle = πr^2

مساحة الدائرة A= الثابت باي π × r^2


التمييز ما بين علاقة حساب محيط الدائرة و علاقة حساب مساحتها:

علاقة حساب محيط الدائرة تتضمن قطر أو نصف قطر غير مرفوعين للقوة الثانية.

علاقة حساب محيط الدائرة تتضمن نصف قطر(و ليس قطر) مرفوع للقوة الثانية.

دائماً في الرياضيات و الفيزياء عندما تجد رمزين أو رمز و عدد بجوار بعضهما البعض كما في πr^2 فذلك يعني بأن هنالك علاقة ضرب بينهما :

$$\pi r^2 = \pi \times r^2$$



طول القوس arc يساوي قياس الزاوية المحصورة بين ضلعي القطاع تقسيم 360 ضرب محيط الدائرة :

Arc length = Angle between radii / 360° × circumference

هنالك علاقاتٌ ثابتة ما بين الزاوية المحصورة بين نصفي القطرين و بين محيط الدائرة و عندما نقسم الزاوية المحصورة بين نصفي قطرين و التي هي بالتأكيد أقل من 360° درجة على درجات الدورة الكاملة أي 360° فإننا سوف نحصل على رقمٍ عشري يُمثل النسبة ما بين الزاوية المحصورة ما بين نصفي القطرين و بين الدورة الكاملة 360° درجة ، و عندما نضرب ذلك الرقم العشري الذي يمثل تلك النسبة بمحيط الدائرة فإننا نحصل على النسبة ما بين طول القوس الذي هو جزءٌ من محيط الدائرة و بين محيط الدائرة على شكل رقمٍ يُمثل طول تلك القوس.

نصفي القطرين radii هما الضلعين الذين يحصران بينهما قطاعاً مثل ضلعي قالب الجبنة.


مساحة القطاع الدائري sector = قياس الزاوية المحصورة بين الشعاعين تقسيم 360° درجة ضرب مساحة الدائرة.

$$\text{Area of a sector} = \frac{angle\ between\ radii}{360} \times area\ of\ circle$$

هنالك علاقاتٌ ثابتة ما بين الزاوية المحصورة بين نصفي القطرين و بين مساحة الدائرة و عندما نقسم الزاوية المحصورة بين نصفي قطرين و التي هي بالتأكيد أقل من 360° درجة على درجات الدورة الكاملة أي 360° فإننا سوف نحصل على رقمٍ عشري يُمثل النسبة ما بين الزاوية المحصورة ما بين نصفي القطرين و بين الدورة الكاملة 360° درجة ، و عندما نضرب ذلك الرقم العشري الذي يمثل تلك النسبة بمساحة الدائرة فإننا نحصل على النسبة ما بين مساحة القطاع الدائري الذي هو جزءٌ من مساحة الدائرة و بين مساحة الدائرة على شكل رقمٍ يُمثل مساحة ذلك القطاع الدائري.


القطاع الدائري يشبه قالب الجبنة المثلثي الشكل.

تقوم المعادلة السابقة في عملها على الاعتماد على قياس الزاوية المحصورة بين ضلعي القطاع الدائري بالنسبة للدورة الكاملة التي تبلغ 360° درجة و مساحة الدائرة الكلية لحساب مساحة القطاع المثلثي في الدائرة.



علبة جبنة دائرية يبلغ طول محيطها 34.5 cm و تبلغ الزاوية بين شعاعي (ضلعي) قالب الجبنة (القطاع الدائري) فيها 45° درجة .

كم يبلغ طول قوس قال الجبنة المثلثي .



كيف نحسب قياس زاوية القطاع الدائري المثلثي كما هي حال قوالب الجبنة ؟

ببساطة شديدة فإن قياس الدائرة يبلغ حتماً °360 درجة ، و بما أن علبة الجبنة تتألف من ثمانية قوالب (قطاعات دائرية مثلثية) فذلك يعني بأن قياس زاوية كل قالب جبنة تساوي :

$360° \div 8 = 45°$

إذاً فإن قياس زاوية كل قالب جبنة تبلغ °45 درجة.

بما أن علبة الجبنة الدائرية الواحدة تتألف من ثمانية قوالب و بما أن محيطها يتألف من ثمانية أقواس تمثل الضلع المنحني من قالب الجبنة فذلك يعني بأن طول قوس قالب الجبنة يساوي طول محيط علبة الجبنة تقسيم 8 .

إذاً فإنه يتوجب علينا القيام بحساب طول محيط علبة الجبنة.


محيط الدائرة يساوي طول قطر الدائرة (قطر علبة الجبنة يبلغ 11 cm سنتمتر) ضرب الثابت باي π :

محيط الدائرة = باي π × قطر الدائرة d .

$\pi \times 11 = 34.5$ cm

محيط علبة الجبنة يبلغ 34.5 cm سنتمتر.


محيط الدائرة = باي π × قطر الدائرة d .



و **بما أن محيط علبة الجبنة يتألف من اجتماع ثمانية أقواس قوالب جبنة فإن طول قوس قالب جبنة يساوي محيط علبة الجبنة تقسيم 8 :**

34.5 ÷ 8= 4.3

إذاً فإن طول قوس كل قالب جبنة يبلغ 4.3 cm سنتمتر.



حساب مساحة قطاع دائري مثلثي

يتألف القطاع المثلثي الدائري من شعاعين (ضلعين أو نصفي قطرين مستقيمين بالطبع) و قوس منحنية .

لحساب مساحة قطاع دائري مثلثي فإن علينا أن نعرف مساحة الدائرة و قياس الزاوية المحصورة بين شعاعي أو ضلعي القطاع الدائري وفق المعادلة التي مرت معنا سابقاً :

في البداية يتوجب علينا ان نحسب مساحة السطح الدائري لعلبة الجبنة :

كما مر معنا سابقاً فإن **مساحة الدائرة تساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر** و على اعتبار أن **قطر علبة الجبنة يبلغ 11 سنتمتر فإن نصف القطر يساوي** :


$11 \div 2 = 5.5$ cm

5.5 سنتمتر نصف قطر الدائرة.

إذاً فإن مساحة السطح الدائري لعلبة الجبنة تساوي :

$$\pi \times 5.5^2 = 95 \text{ cm}^2$$

95 سنتمتر مربع هي مساحة السطح الدائري لعلبة الجبنة .



حساب مساحة القطاع الدائري (مساحة سطح قالب جبنة) :

لحل هذه المسألة فإننا نطبق معادلة حساب طول قوس القطاع المثلثي الدائري :

مساحة القطاع الدائري sector = قياس الزاوية المحصورة بين الشعاعين تقسيم °360 درجة ضرب مساحة الدائرة.

$$\text{Area of a sector} = \frac{angle\ between\ radii}{360} \times area\ of\ circle$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة لدينا

مساحة القطاع الدائري sector = قياس الزاوية المحصورة بين الشعاعين أي °45 درجة تقسيم °360 درجة ضرب مساحة الدائرة أي $95\ cm^2$.

$$\text{Area of a sector} = \frac{45°}{360°} \times 95\ cm =$$

45 ÷ 360 = 0.125

$0.125 \times 95 = 11.857\ cm^2$

$11.857\ cm^2$ سنتمتر مربع هي مساحة سطح قالب الجبنة.

➡




كيف نتأكد من صحة هذه النتيجة التي توصلنا إليها؟

إن علبة الجبنة تتألف من ثمانية قطاعات دائرية أي ثمانية قوالب جبنة و تبلغ مساحتها 95 cm^2 ، اي أن إجابتنا إن كانت صحيحة فيجب أن نحصل على هذا الرقم إذا ضربنا مساحة سطح قالب الجبنة بالعدد 8 :

$8 \times 11.857 = 95\ cm^2$

إذاً فإن العملية التي قمت بها صحيحة .



➡



الأشكال المركبة الثنائية الأبعاد Compound 2D Shapes

الأشكال المركبة هي الأشكال التي تتألف من شكلين بسيطين أو أكثر .

لحساب مساحة شكلٍ مركب يتوجب تحليله إلى مكوناته البسيطة و من ثم القيام بحساب مساحة كل شكلٍ من أشكاله على حدة.


انتبه إلى أن مسائل حساب مساحة شكلٍ مركب تتضمن كذلك إسقاط و حذف مساحة التجاويف و الفتحات الموجودة في الشكل بعد حساب مساحاتها.

تذكر دائماً بأن مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض ، و مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع ، و مساحة المثلث = الارتفاع ضرب نصف $\frac{1}{2}$ قاعدة المثلث ، أما **مساحة الدائرة فهي تساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر :**

Area of circle = πr^2

مساحة حلقة أو قرص أجوف annulus

ما هي مساحة قرصٍ أجوف إذا كانت المسافة ما بين مركزه و حافته 10 cm سنتمتر ، و إذا كانت المسافة ما بين مركزه و نهاية الحلقة الجوفاء 4 cm سنتمتر ؟



مساحة الدائرة تساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر

Area of circle = πr^2

بدايةً نقوم بحساب مساحة الدائرة بأكملها أي مساحة كلٍ من الدائرة الخارجية و مساحة القرص الأجوف الموجود في مركزها .

مساحة الدائرة الكبرى تساوي :

$$\pi \times 10^2 = 314\ cm^2$$

$$\pi \times 100 = 314\ cm^2$$

الآن نحسب مساحة الفجوة الدائرية الموجودة في مركز الدائرة الكبرى :

مساحة الدائرة تساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر :

Area of circle = πr^2

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

Area of circle = $\pi\ r^2$

Area of circle = $\pi\ 4^2 = \pi \times 4^2 = \pi \times 16 = 50cm^2$

الأن لحساب مساحة الدائرة العظمى نقوم بطرح مساحة الفراغ أو التجويف الدائري الموجود في مركزها من مساحتها :


$314 - 50 = 264cm^2$

أي

$$100\pi - 16\pi = 84\pi$$

$$84\pi = 84 \times \pi = 263.8$$


سبب التباين الطفيف في النتائج أنني أهملت الكسور العشرية .






الأشكال الثلاثية الأبعاد – المجسمات المتعددة السطوح polyhedrons

الأشكال المجسمة او الشكال الثلاثية الأبعاد أو المجسمات المتعددة الأسطح هي أشكالٌ هندسية لها أسطح أو أوجهٌ متعددة و حواف edges حيث تتكون الحافة من التقاء سطحين أو وجهين مع بعضهما البعض ، كما تتألف الأشكال المجسمة كذلك من **زوايا مجسمة vertex و الزاوية المجسمة هي الزاوية التي تتشكل عند التقاء عدة حوافٍ مع بعضها البعض (و ليس حافتين فقط)** ، **فعند التقاء سطحين اثنين فقط تتشكل لدينا حافة اما عند التقاء عدة أسطح فتتشكل لدينا زاوية مجسمة .**



الأشكال الهرمية Pyramid

الشكل الهرمي هو شكلٌ متعدد السطوح polyhedron يتألف من عدة مثلثات تلتقي في **زاويةٍ مجسمة حادة (رأس) apex واحدة** ، **كما تلتقي تلك المثلثات في زوايا مجسمة vertex .**




الجسم الكروي Sphere

الجسم الكروي هو جسمٌ دائريٌ مجسم له سطحٌ واحدٌ فقط جميع النقاط الموجودة على سطحه يكون بعدها واحداً عن مركزه.


الشكل المخروطي cone

المخروط شكلٌ منحني (غير مضلع) شبيهٌ بالهرم غير أن قاعدته دائرية الشكل و قمته عبارة عن زاوية حادة دائرية.



الأسطوانة

شكلٌ له وجهين دائريين علوي و سفلي يصل بينهما أنبوب دائري المقطع .



المقاطع العرضية في المجسمات 3D Cross-section

المقطع العرضي في شكلٌ ثلاثي الأبعاد هو دائماً شكلٌ ثنائي الأبعاد 2D و يعتمد شكل المقطع العرضي الشكل في مجسمٍ على زاوية القطع angle of the slice .


إذا قمنا بقطع شكل متوازي مستطيلات بزاوية قائمة فإنها تُعطي شكلاً مستطيلاً أما إذا قمنا بقطع متوازي مستطيلات بزاويةٍ مائلة فمن الممكن ان يعطي متوازي اضلاع أو مثلث أو شبه منحرف وذلك وفقاً لعدد الاضلاع التي يشملها القطع.

الهرم ذو القاعدة المربعة Right –rectangular pyramid


إن إجراء مقطعٍ عرضي في شكلٍ هرمي ذو قاعدة مستطيلة يُعطي العديد من الأشكال وفقاً لزاوية و موضع القطع بينما يعطينا القطع الأفقي horizontal slice الشكل ذاته و لكن بقياساتٍ متباينة، أما القطع العمودي vertical slice فإنه يعطي أشكالاً مثلثية إذا شمل القطع **قمة الهرم (زاويته المجسمة الحادة) apex .**

أما القطع العمودي بزوايا مختلفة فإنه يُعطي أشكالاً شبه منحرفة.

إن **تمثيل الأشكال الثلاثية الأبعاد بأشكال ثنائية الأبعاد** يدعى بالمخططات و الواجهات plans and elevation حيث يتم تصوير تلك الأشكال الثلاثية الأبعاد من مساقط علوية و جانبية و أمامية.



حجم شكلٍ ثلاثي الأبعاد هو مقدار الفراغ المحصور بين أسطحه (أوجهه) المختلفة و و يقاس حجم المجسمات الثلاثية الأبعاد بوحدة السنتي متر المكعب و سواها من وحدات القياس التكعيبية ، و يمكننا قياس حجم متوازي مستطيلات من خلال عدد المكعبات أو الوحدات التكعيبية التي تشكل هذا المجسم أو من خلال العلاقة :



حجم متوازي مستطيلات مجسم يساوي الطول × العرض×الارتفاع.

Volume of rectangular prism=length×width×height

المكعب cube شكلٌ مجسم ذو ستة أسطح مربعة الشكل و يتم حساب حجم المكعب عن طريق إجراء عملية التكعيب cubing اي عن طريق رفع طول ضلع أو حافة المكعب للقوة الثالثة ، أي عن طريق ضرب أحد أضلاع (حواف) المكعب بنفسه مرتين (و ليس ثلاث مرات لأن هنالك شارتي ضرب فقط في عملية التكعيب أو الرفع للقوة الثالثة).

جميع أضلاع أو حواف المكعب تكون متساويةً في الطول.

فإذا كان طول ضلع أو طول حافة مكعبٍ ما 5cm سنتمتر مثلاً فإن مساحة هذا المكعب تساوي 5^3 أي $5×5×5=125\ cm^3$ سنتمتر مكعب.


5^3 أو 5×5×5 تعني 5 مضروبة ببعضها مرتين فقط و ليس ثلاث مرات :

أول عملية ضرب تتمثل في ضرب أول 5 بثاني 5 .

5×5

ثاني عملية ضرب هي ضرب ناتج عملية الضرب الأولى 5×5 أي 25 بالخمسة الثالثة .

العبرة ليست في عدد العناصر أو الأعداد المضروبة ببعضها البعض و إنما في عدد شارات الضرب ففي العلاقة 5×5×5 لدينا شارتي ضرب اثنتين فقط .




حجم متوازي المستطيلات (شكلٌ أسطحه مستطيلة و ليست مربعة) يساوي الطول × العرض × الارتفاع.

إن مساحة سطحٍ مكعب أو متوازي مستطيلات هو مجموع مساحات أسطحه كافة.

إن كلاً من المكعب و متوازي المستطيلات لهما ستة أسطح أو ستة اوجه.


Length (l) Height (h) width (w)

مساحة سطح المكعب تساوي الضلع ضرب الضلع ، و بما أن للمكعب ستة أسطح فإن مساحة المكعب تساوي ستة أضعاف مساحة أحد أسطحه أي أن المساحة السطحية للمكعب تساوي مساحة أحد أسطحه ضرب ستة .



Cube net شبكة المكعب

تمثل شبكة المكعب الأسطح الخارجية للمكعب بعد نشرها على سطحٍ واحد مستوي ثنائي الأبعاد كما يحدث عندما نقوم بتفكيك صندوقٍ كرتوني ، فبعد أن يكون شكلاً ثلاثي الأبعاد يُصبح شكلاً مسطحاً ثنائي الأبعاد.



و بما ان جميع حواف المكعب متساوية في الطول و بما أن للمكعب ستة أسطح مربعة الشكل و بما أن مساحة المكعب تساوي الضلع × الضلع فإن جميع أسطح أو أوجه المكعب الستة تكون ذات مساحة متساوية.

أما الشكل متوازي المستطيلات (الشكل السفلي) فإنه يتألف من ستة أسطح كل اثنين متقابلين منها يكونان متساويين في المساحة أي أن كل وجهين من الأوجه الستة لمتوازي المستطيلات تكون لها حسبة مختلفة ، و هذا يعني بأن المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات تساوي 2 ضرب مجموع مساحات أسطحه الثلاثة .


لماذا؟

لأن متوازي المستطيلات يتألف من ستة أسطح :

$2 \times 3 = 6$

ذلك أن كل سطحين من أسطحه يجب أن يكونا متساويين و إلا فإنه لا يكون متوازي مستطيلات


.



لدي في متوازي المستطيلات سطح سفلي و سطحٌ علوي يتم قياس مساحتيهما السطحية بضرب الطول l ضرب العرض w $(l\times w)$ (lw) ، كما يكون لدي وجهين نحسب مساحتيهما بضرب الطول l في الارتفاع h أي (lh) أي $l\times h$ ، كما يكون هنالك وجهين يمكن حساب مساحتيهما السطحية عن طريق ضرب العرض w في الارتفاع h أي wh

$w\times h$

جميع الأضلاع العمودية القائمة في متوازي المستطيلات تدعى بالارتفاع h:



و لذلك فإن لدينا في متوازي المستطيلات سطحين اثنين أو وجهين اثنين ليس فيهما ارتفاع و هما (القعر) أي الأرضية و الغطاء العلوي ، بينما لدي أربعة أوجهٍ لها ارتفاع و هي الأوجه الأربعة الجانبية .

الأوجه الأربعة الجانبية التي تحتوي على ارتفاع h هي الأوجه المحيطية أما الوجهين الذين لا يحتويان على ارتفاع فهما الأرضية (القعر) و الغطاء.

معادلة حساب المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات هي 2 × الطول l × العرضw + العرضw × الارتفاع +الطول× الارتفاع)

Surface area= 2(lw+wh+lh)

Surface area= 2(l×w+w×h+l×h)


لماذا 2 مضروبة بهذه النسب ؟


لأن لدي من كل نوعٍ من الأوجه المتماثلة في متوازي المستطيلات اثنين.

lw الطول × العرض

wh العرض × الارتفاع

lh الطول×الارتفاع





إذاً فإن لدي في متوازي المستطيلات 4 طول و 4 ارتفاع و 4 عرض.

4+4+4=12

12 ضلع أو 12 حافة .

و كما تلاحظون فإن لدي في معادلة حساب المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات 12 حد أي 12 ضلع أو حافة :

lw الطول × العرض


wh العرض × الارتفاع

lh الطول×الارتفاع

6× 2 =12

حيث أن جميع عناصر العلاقة السابقة مضروبة بالعدد 2 :

2(lw+wh+lh)



هل يمكن أن تنسى هذا الأمر بعد اليوم؟

إياك أن تخلط ما بين المساحة السطحية(المساحة) و بين (الحجم) .


جميع الأضلاع العمودية القائمة تدعى بالارتفاع height (h) ، و لذلك فإن لدينا وجهين اثنين أو سطحين اثنين ليس فيهما ارتفاع و هما القعر (الأرضية) و الغطاء العلوي، بينما لدي 4 أربعة اسطح فيها ارتفاع و هي الأوجه الأربعة الجانبية .


الأوجه الأربعة التي تحتوي ارتفاع h هي الأوجه المحيطية ، أما الوجهين الذين لا يحتويان ارتفاعاً فهما القعر (الأرضية) و الغطاء.

لكلٍ من المكعب cube و متوازي المستطيلات 6 ستة أوجه .

معادلة حساب المساحة السطحية (مساحة) سطح متوازي مستطيلات هي :

2 × (الطول ×العرض)+(العرض×الارتفاع)+(الطول×الارتفاع).





عدد الزوايا المجسمة في المكعب و متوازي المستطيلات يبلغ 8 زوايا.



معادلة حساب المساحة السطحية للمكعب

معادلة حساب المساحة السطحية للمكعب

مساحة المكعب تساوي 6 ضرب طول الحافة او الضلع المرفوع للقوة الثانية


$$\text{Surface area}=6a^2$$

$$\text{Surface area}=6\times a^2$$


لماذا؟


لأن مساحة سطح المربع(انتبه المربع و ليس المكعب) تساوي الضلع × الضلع ، أي الضلع مرفوعاً للقوة الثانية، و بما أن هنالك ستة أسطح للمكعب فإن المساحة السطحية للمكعب تساوي 6 ضرب مساحة كل وجهٍ من أوجه المربع .

أي أن مساحة المكعب تساوي مساحة ستة مربعات .



مساحة كل مربع من المربعات التي تشكل أسطح المكعب تساوي طول الضلع مرفوعاً للقوة الثانية (الضلع × الضلع)






حجم و مساحة الموشور السطحية prism

الموشور شكلٌ ثلاثي الأبعاد يتألف من ثلاثة مستطيلات و مثلثين.

مثلثي الموشور يكونان متطابقين (متساويين في كل شيء) و كذلك فإن مستطيلاته الثلاثة متطابقة .

حجم الموشور يساوي



حساب حجم الموشور

لحساب حجم الموشور فإن علينا اولاً ان نحسب مساحة سطحه المثلثي triangular face ، و بعد ذلك نضرب مساحة سطحه المثلثي بطوله .

كما مر معنا فإن **مساحة المثلث تساوي** $\frac{1}{2}\times$ طول **القاعدة b ضرب الارتفاع** :


$$\frac{1}{2}\times b\times h$$

و بعد ذلك فإننا لحساب حجم الموشور فإننا نضرب مساحة المثلث بطول الموشور :

Volume of a prism=area of cross-section × length

حجم الموشور = مساحة مقطعه العرضي × طول الموشور.


و بالطبع فإن المقطع العرضي للموشور المثلثي هو مثلثٌ متساوي الساقين كما ذكرت من قبل فإن الموشور يتألف من مثلثين و ثلاثة مستطيلات.



دوماً عند حساب المساحة السطحية لشكلٍ ما فإننا نضرب جميع البيانات الثنائية الأبعاد ببعضها البعض ، اما عند حساب الحجم فإننا نضرب جميع البيانات الثلاثية الأبعاد ببعضها البعض.

حساب المساحة السطحية لموشور :


لحساب المساحة السطحية لموشور فإننا نجمع مساحات جميع سطوحه مع بعضها البعض.



يتألف الموشور من مثلثين اثنين و ثلاثة مستطيلات و بالتالي فإن المساحة السطحية للموشور المثلثي تساوي مجموع مساحات أسطحه.

حجم الموشور = مساحة مقطعه العرضي (المثلث) × طوله

Volume=area of cross-section× length.



حجم و مساحة سطح الأسطوانة

تشبه الأسطوانة الموشور غير أن الاختلاف بينهما يتمثل في ان الموشور جسمٌ مضلع بينما الأسطوانة عبارة عن مجسمٍ منحني .

تتألف الأسطوانة من وجهين دائريين يتوضعان بشكلٍ متوازي (أرضية و غطاء) يصل بينهما سطحٌ منحني (أنبوب) .

يتم حساب المساحة السطحية للأسطوانة و حجمها بطريقةٍ مشابهة للطريقة التي نحسب بها المساحة السطحية للموشور و حجمه.

حجم الأسطوانة يساوي مساحة مقطعها الدائري circular cross-section ضرب ارتفاعها .

يتم حساب مساحة المقطع الدائري للأسطوانة باستخدام طريقة حساب مساحة الدائرة .

لماذا نحسب حجم الأسطوانة بضرب مقطعها الدائري بارتفاعها؟

إن قياس الحجم هو عملية ملئٍ لفراغ الشكل بمساحة مقطعه العرضي أي أنها عملية تمرير مساحة المقطع العرضي لذلك الشكل على امتداد طول ذاك الشكل ، فعندما أضرب مساحة السطح الدائري للأسطوانة بارتفاعها فذلك يعني بأني أحول ذلك الشكل الدائري إلى أسطوانة بارتفاعٍ معين و كذلك الأمر حين أحسب حجم الموشور حيث أضرب مساحة سطحه المثلثي بارتفاعه .

$$Volume=area\ of\ cross\text{-}\ section\times height=\pi r^2h$$

حجم الأسطوانة =مساحة مقطعها الدائري × الارتفاع.

نصف القطر radius هو البعد ما بين مركز الدائرة و حافتها الخارجية.

ارتفاع الأسطوانة هو البعد ما بين سطحيها الدائريين و لذلك فإننا نحصل على الحجم عندما نمرر المساحة المقطعية على امتداد الارتفاع أي عندما نملأ ارتفاع الأسطوانة أو الموشور بمساحة سطحه المقطعية.

إن الأمر يشبه في الموشور وضع شرائح مثلثية بمساحةٍ معينة فوق بعضها البعض إلى أن نحصل على مجسم موشور ،و في الأسطوانة فإن الأمر يشبه وضع أقراص دائرية بمساحة معينة فوق بعضها البعض و بارتفاعٍ معين حتى نحصل على مجسمٍ أسطواني الشكل.

إذاً فإن **حجم الأسطوانة يساوي مساحة مقطعها الدائري العرضي × ارتفاع الأسطوانة.**

و كما ذكرت سابقاً فإن **عملية حساب الحجم هي عملية ملئ الأسطوانة على امتداد ارتفاعها بمساحة تساوي مساحة مقطعها العرضي.**


تشير كلمة (الشبكة) net إلى الشكل الثنائي الأبعاد الذي تصير إليه الأشكال الثلاثية الأبعاد عند تفكيكها و تحويلها إلى أجزاء ثنائية الأبعاد.


يتألف الشكل الأسطواني من سطحٍ منحني و هو على شكلٍ مستطيل rectangle ، كما يتألف المجسم الأسطواني كذلك من مقطَعين عرضيين دائريين هما أرضية الأسطوانة و غطائها، و لذلك فإن مساحة الأسطوانة تساوي مساحة المستطيل المكون للأسطوانة + مساحتي المقطعين الدائريين أي الدائرتين التي تمثلان أرضية الأسطوانة و غطائها.

تتألف الأسطوانة من دائرتين و مستطيل .


طول المستطيل = محيط الدائرة

محيط الدائرة = طول المستطيل






إذا أردنا أن نصنع شكلاً أسطوانياً (برميل مثلاً) فإننا نحتاج إلى مستطيل و دائرتين و يجب أن يكون طول المستطيل مساوياً لمحيط الدائرة التي سوف نقوم بلفه عليها.



نحسب مساحة المستطيل المكون للأسطوانة بضرب طوله في عرضه بينما نحسب مساحة دائرة الأسطوانة (مقطعها العرضي الدائري) بضرب مربع نصف قطرها في محيطها.

l=2 πr طول المستطيل في الأسطوانة l = محيط الدائرة 2 πr




انتبه إلى أن طول المستطيل الذي يكون جسم الأسطوانة يجب أن يكون مساوياً لمحيط دائرة الأسطوانة.

إذاً بعد اليوم إذا علمت قياس المستطيل الذي يكون جسم الأسطوانة و لم تعطى قياس محيطها أصبح بإمكانك معرفة محيط الدائرة .

و إذا علمنا قياس محيط الدائرة و لم نعلم قياس المستطيل بشكلٍ كامل فإن بإمكاننا معرفة طول أحد ضلعيه أي ضلع المستطيل المتصل بالسطحين الدائريين يكون مساوياً لقياس محيط الدائرة.

l=2 πr طول l المستطيل المكون لجسم الأسطوانة يساوي محيط مقطعها العرضي الدائري 2 πr.



$$l=2\,\pi r=2\times\pi\times r$$

طول المستطيل المكون لجسم الأسطوانة = 2 ضرب الثابت باي π ضرب نصف القطر r

$$\text{Circumference (C)}=2\,\pi r=2\times\pi\times r$$

محيط الدائرة = 2 ضرب الثابت باي π ضرب نصف القطر r

$2\pi r$

تذكر دائماً بأن للأسطوانة سطحين دائريين هما الأرضية و الغطاء و لذلك فإننا عند حساب مساحة أسطوانة فإننا نقوم بمضاعفة مساحة مقطعها العرضي الدائري.

$$2\pi rh+2\pi r^2$$

$$2\times \pi\times r\times h+2\times\pi\times r^2$$

$2\pi rh$ مساحة المستطيل المكون لجسم الأسطوانة حيث $2\pi r$ تساوي محيط المقطع العرضي للأسطوانة و هي في الوقت ذاته تساوي طول المستطيل المكون لجسم الأسطوانة ، بينما h هو ارتفاع المستطيل المكون لجسم الأسطوانة.

أي أن $2\pi rh$ تعني $2\pi rxh$ أي طول المستطيل المكون للأسطوانة في ارتفاعه = مساحة المستطيل.

$2\pi r^2$ =مساحة مقطعين عرضيين دائريين اثنين و هي بالطبع 2 ضرب علاقة حساب مساحة الدائرة اعتماداً على نصف قطرها r أي أن هذه العلاقة تُمثل مساحة مقطعين عرضيين دائريين اثنين.

في الأسطوانة طول المستطيل المكون لجسم الأسطوانة =محيط مقطعها الدائري

انتبه جيداً :

$2\pi r^2$ تساوي مساحة مقطعين عرضيين دائريين اثنين و ليس مقطعٌ عرضي دائري واحد لأن للأسطوانة مقطعين دائريين عرضيين اثنين (عُلوي و سُفلي) و ليس مقطعٌ دائريٌ عرضيٌ واحد.

حيث أن مساحة دائرة واحدة أي مساحة مقطع عرضي دائري واحد تُساوي πr^2.

تستخدم العلاقة السابقة في حساب المساحة السطحية للأسطوانة حيث تتيح العلاقة السابقة حساب المساحات السطحية لجميع الأسطح المكونة للأسطوانة.

πr^2

مساحة سطحٍ دائريٍ واحد .

$r^2 = r \times r = r^2$

$2\pi rh$ هي مساحة أنبوب الأسطوانة أي مساحة المستطيل الذي يشكل جسم الأسطوانة و هي تساوي ناتج ضرب محيط قاعدة الأسطوانة الدائرية $2\pi r$ بارتفاع الأسطوانة h .

$2\pi r^2$ هي مساحة مقطعين دائريين عرضيين اثنين .

تذكر دائماً بأن للأسطوانة سطحين دائريين هما الأرضية و الغطاء .

محيط الدائرة أي باي π ضرب نصف القطر r يُساوي تماماً طول المستطيل الذي يكون جسم الأسطوانة.

إذاً فإننا إذا عرفنا طول نصف قطر دائرة الأسطوانة فإن بإمكاننا أن نحسب محيطها ، و محيطها يساوي طول المستطيل المكون لجسم الأسطوانة .

بإمكاننا بعد معرفة طول نصف قطر دائرة الأسطوانة و عرض المستطيل المكون لها أن نحسب مساحة سطح الأسطوانة و حجمها لأن :

محيط المقطع الدائري للأسطوانة = عرض المستطيل المكون لجسم الأسطوانة .

تُمكننا معرفة كم يساوي نصف قطر الدائرة من حساب مساحتها و محيطها الذي يساوي عرض المستطيل المكون لجسم الأسطوانة ، أما معرفة ارتفاع المستطيل فإنه يمكننا من حساب مساحة المستطيل المكون لجسم الأسطوانة عن طريق ضربه بارتفاعه .

لحساب حجم الأسطوانة فإننا نضرب مساحة الدائرة في ارتفاع الأسطوانة.

حتى لا يختلط الأمر عليك :

$2\pi r$ مُحيط الدائرة (الثابت باي π ضرب نصف القطر r)

محيط الدائرة = 2 ضرب الثابت باي π ضرب نصف القطر r

لا شيء في معادلة حساب محيط الدائرة مرفوعً للقوة الثانية.

πr^2 مساحة دائرة واحدة

يكون نصف القطر r^2 في معادلة حساب مساحة الدائرة مرفوعاً للقوة الثانية بينما لا يكون مرفوعاً لأية قوة في معادلة حساب محيط الدائرة.

لا يوجد العدد 2 في معادلة حساب مساحة دائرة واحدة .

$2\pi r^2$ مساحة سطحين دائريين اثنين.

يوجد العدد 2 أمام معادلة حساب مساحتي مقطعين أو سطحين دائريين اثنين.

انتبه جيداً :

محيط الدائرة C يساوي الثابت باي π ضرب قطر الدائرة

$Circumference = \pi \times d$

$C = \pi \times d$

محيط الدائرة = باي π × قطر الدائرة d .

و بما أن قطر الدائرة يساوي بالطبع نصفي قطرين :

نصف قُطر+نصف قُطر = قطر

قطر الدائرة = نصف قطر × 2

فإن :


مُحيط الدائرة يساوي 2 ضرب (الثابت باي π ضرب نصف القطر r)

محيط الدائرة = 2 ضرب الثابت باي π ضرب نصف القطر r




المقطع العرضي الدائري في أسطوانة عبارة عن جذع شجرة.

Pyramid حجم الهرم و مساحته السطحية



الهرم المربع القاعدة مجسمٌ قاعدته عبارة عن شكلٍ رباعي تتصل مع جوانبه التي هي عبارة عن مثلثات تلتقي زواياها **في زاوية مُجسمة مثلثية حادة apex** تقع في قمة الهرم.



عدد الأوجه أو الأسطح المثلثية للهرم تساوي عدد أضلاع قاعدته.

حجم الهرم:

حجم الهرم يساوي مساحة قاعدة الهرم × الارتفاع (البعد العمودي ما بين قمة الهرم و قاعدته)، ضرب ثلث $\frac{1}{3}$ ، و بالطبع فإن **الضرب بثلث يساوي القسمة على ثلاثة تقريباً.**

تصلح المعادلة السابقة لجميع أشكال الأهرامات.

$$\text{Volume of pyramid}=\frac{1}{3}\times\text{area of base}\times\text{vertical height}=\frac{1}{3}Bh$$


حساب المساحة السطحية للهرم

لحساب المساحة السطحية للهرم فإننا نجمع المساحات السطحية لجميع مكوناته اي أننا نجمع مساحة أرضيته أو قاعدته الرباعية +مساحات جوانبه المثلثية الشكل.


تنبيه : هنالك أشكالٌ هرمية قاعدتها مثلثية الشكل triangular-based pyramid .

يعني التحليل الشبكي للأشكال الهرمية pyramid net تفكيك الأشكال الهرمية و تحويلها من أشكال ثلاثية الأبعاد إلى أشكالٍ ثنائية الأبعاد تتألف من عدة أشكالٍ مسطحة.

التحليل الشبكي لهرمٍ ذو قاعدةٍ مربعة Square pyramid net:



التحليل الشبكي لهرمٍ خماسي Pentagonal pyramid :





مسألة :

هرم الجيزة الكبير The Great Pyramid of Giza أو هرم خوفو Pyramid of Khufu هرمٌ ذو قاعدةٍ رباعية square-based pyramid يبلغ ارتفاعه (h) 146.6 m متر و يبلغ طول قاعدته (b) 230.3 m متر .

احسب كلاً من حجم هرم الجيزة و مساحته السطحية.

حساب حجم هرم الجيزة (هرم خوفو) :

كما مر معنا فإن حجم هرمٍ ذو قاعدة رباعية يساوي $\frac{1}{3}$ ضرب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع.

حجم هرمٍ ذو قاعدة رباعية يساوي $\frac{1}{3}$ × مساحة القاعدة × الارتفاع.

$$\text{Volume(V)}=\frac{1}{3}\times\text{Base area}\times\text{Height}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة:

$$\text{Volume(V)}=\frac{1}{3}\times B^2\times 146.6$$

نقوم بحساب مساحة قاعدة الهرم المربعة و بالطبع فإن مساحة المربع تساوي الضلع ×الضلع:

$$\mathbf{320.3\times320.3=53038m}$$

فتصبح معادلتنا على الشكل التالي:

$$\text{Volume(V)}=\frac{1}{3}\times 53038\times 146.6$$

$$\mathbf{Volume(V)=\ 0.333\ \times53038\times146.6=2581182\ m^3}$$

$2591795m^3$ كانت النتيجة على آلات حاسبة مختلفة.

النسبة **0.333** هي النسبة المساوية للكسر $\frac{1}{3}$



حساب المساحة السطحية لهرم الجيزة (هرم خوفو) :

إن المساحة السطحية الكلية (TSA) للهرم تتضمن المساحات السطحية لكلٍ من قاعدة الهرم و جوانبه المثلثية الشكل.

المساحة السطحية الكلية للهرم= المساحة السطحية لقاعدة الهرم + المساحات السطحية لجوانبه المثلثية.

$$TSA=b^2+2bs$$

$$TSA=b\times b+2\times b\times s$$

حيث أن b هو الضلع الذي يشكل كلاً من قاعدة المثلث الذي يشكل جوانب الهرم و ضلع المربع الذي يشكل قاعدة الهرم) أما s فإنه يشكل الارتفاع المائل أي البعد ما بين حافة قاعدة الهرم و قمته و هو يبلغ 186.4 m متر.

المساحة السطحية لجوانب الهرم :

$$2\times 230.3\ m\times 186.4\ m=85854\ m^2$$

لماذا فعلت ذلك ؟

لماذا ضربت العدد 2 بقاعدة المثلث و ارتفاعه بدلاً من أن أضرب الكسر نصف $\frac{1}{2}$ بقاعدة المثلث و ارتفاعه؟


لأن مساحة المثلث تساوي نصف $\frac{1}{2}$ ضرب قاعدة المثلث × ارتفاعه و بما أن قاعدة هذا الهرم مربعة فذلك يعني بأن هذا الهرم يتألف من أربعة مثلثات تشكل جوانب الهرم أي أن الجوانب المثلثية لهذا الهرم تُشكل مربعين اثنين و بالتالي فإن المساحة السطحية لهذه المثلثات الأربعة التي تشكل جوانب الهرم الأربعة و التي تُشكل مربعين اثنين تساوي 2 ضرب قاعدة المثلث ضرب ارتفاعه .

مساحة مثلث واحد تساوي نصف $\frac{1}{2}$ ضرب قاعدة المثلث × ارتفاعه

مساحة مربعين اثنين تُساوي 2 ضرب قاعدة المثلث × ارتفاعه.

انتبه جيداً :

ارتفاع الهرم هو بعدٌ وهمي عمودي(شاقولي) ما بين ذروة الهرم و مركز قاعدته بينما ارتفاع المثلث هو المسافة ما بين ذروة المثلث و منتصف قاعدته و هو في الهرم بعدٌ مائل (يمثل درجة ميلان الهرم) .



في الشكل السابق فإن A,B (الارتفاع العمودي °90 درجة) هو ارتفاع الهرم بينما A,C (البعد المائل) هو ارتفاع المثلث.


و بعد أن قمنا بحساب المساحة السطحية لجوانب الهرم نتجه لحساب المساحة السطحية و بما أن قاعدة الهرم مربعة الشكل و بما أن مساحة المربع تساوي الضلع× الضلع فإن مساحة قاعدة هرم الجيزة تساوي :

$$230.3 \times 230.3 = 53038.09 \text{ m}^2$$

الآن تتبقى أمامنا الخطوة الأخيرة في حساب المساحة السطحية لهرم الجيزة و تتمثل في جمع المساحة السطحية لجوانبه المثلثية مع المساحة السطحية لقاعدته المربعة:


$$85854 + 53038.09 = 138892.09 \text{ m}^2$$

تقريباً هي المساحة السطحية لهرم الجيزة (هرم خوفو).


A
ارتفاع المثلث
ارتفاع مائل
ارتفاع الهرم
ارتفاع عمودي
90
درجة
B
C
a
a



المخروط cone



حجم المخروط و مساحته


المخروط مجسمٌ ذو قاعدة دائرية و سطحٌ منحني ملتف يصل ما بين قاعدة الهرم و قمته apex و التي هي عبارة عن زاوية مجسمة حادة دائرية.

حجم المخروط يساوي ثلث $\frac{1}{3}$ ضرب مساحة قاعدة المخروط الدائرية πr^2 ضرب الارتفاع العمودي ضرب الارتفاع العمودي .

Volume of a cone =$\frac{1}{3} \times \pi r^2 \times$ vertical height=

حجم المخروط = ثلث $\frac{1}{3}\times$ مساحة الدائرة πr^2 .

πr^2 مساحة الدائرة



و كما مر معنا في حالة الهرم فإن **ارتفاع المخروط هي المسافة العمودية ما بين قمة المخروط و مركز قاعدته الدائرية (اي مركز الدائرة) .**

لاحظ بأن المخروط شكل موازي للهرم غير أن الهرم شكلٌ مثلثي مضلع بينما المخروط شكلٌ منحني .


هنالك في الآلة الحاسبة زر حساب الثابت باي π بمجرد ضغطه يتم إدخال قيمة باي π بشكلٍ آلي لإجراء العمليات الرياضية عليها بدلاً من إدخال القيمة ....3.14 بشكلٍ يدوي لأن قيمة الثابت باي π قيمة دورية لا تساوي 3.14 تماماً.

مساحة المخروط

إذا قمنا بتفكيك المخروط و تحويله من شكل ثلاثي الأبعاد إلى شكل ثنائي الأبعاد فإننا سوف نحصل على دائرة هي قاعدة المخروط و قطاعٌ دائريٌ مثلثي sector (مثل قالب الجبنة) يمثل جسم المخروط و بالطبع فإن مساحة قاعدة المخروط الدائرية الشكل تساوي πr^2.

مساحة قاعدة المخروط الدائرية الشكل تساوي

πr^2 الثابت باي ضرب مربع نصف القطر.



مساحة القطاع الدائري المثلثي الذي يشكل جسم المخروط يساوي باي π ضرب نصف قطر الدائرة r ضرب الارتفاع المائل slant height (s) ، و هو البعد ما بين قمة المخروط أو زاوية القطاع الدائري المثلثي و بين حافة القاعدة الدائرية، أي الخط المستقيم الذي يمتد ما بين قمة المخروط أو زاوية القطاع الدائري و بين بداية الضلع المنحني في القطاع.


Surface area of a con = area of base+area of curved surface.


المساحة السطحية للمخروط = مساحة قاعدته الدائرية πr^2+مساحة السطح المنحني الذي يشكل جسم المخروط πrs .




$\pi r^2 + \pi rs =$


$\pi \times r^2 + \pi \times r \times s$


حيث s هو الخط المستقيم الذي يمتد ما بين قمة المخروط أو زاوية القطاع الدائري و بين بداية الضلع المنحني في القطاع.


الارتفــاع المائــل
الارتفــاع العمــودي
الارتفــاع المائــل
90
نصــف القطــر


L
h
r


h
r

a
h
r



360°r/ℓ
ℓ
πrℓ
2πr
πr2
r
h
r
ℓ=√(r2+h2)



$$l-\sqrt{h^2+r^2}$$

$$\varphi=\frac{2\pi r}{l}$$


المساحة السطحية للمخروط $= \pi r^2 + \pi rs$

πr^2 مساحة الدائرة(قاعدة المخروط الدائرية)= الثابت باي ضرب مربع نصف القطر.

πrs مساحة جسم المخروط = الثابت باي× نصف القطر× الخط المستقيم الذي يمتد ما بين قمة المخروط (زاوية القطاع الدائري) و بين بداية الضلع المنحني في القطاع الدائري.




المخروط الناقص Frustum



المخروط الناقص هو ببساطة شديدة مخروطٌ بلا قمة حادة ، إنه مخروطٌ ذو سطحٍ علوي مستوي ، أي ان لهذا المخروط سطحين دائريين (القاعدة و السطح) .

لإيجاد حجم المخروط الناقص فإننا نتخيل بأنه مخروطٌ كامل و نحسب حجمه على هذا الأساس ثم نحذف حجم قمته بعد ذلك .

أي أننا نحسب حجم المخروط الناقص مع حجم قمته الوهمية ثم نطرح حجم القمة من حجمه.



و لكن كيف نحسب مساحة أو حجم القمة المخروطية الافتراضية تلك؟

إن هذه القمة هي في نهاية الأمر مخروط اي أنها عبارةٌ عن شكلٍ مخروطي و بالتالي فإننا نقوم بحساب مساحتها أو حجمها كما نحسب مساحة أو حجم أي مخروط كما مر معنا سابقاً.



مساحة الكرة و حجمها

الكرة شكلٌ دائري مجسم ذو سطحٍ واحد منحني مغلق كل نقطةٍ على سطحه المنحني تبعد بالقدر ذاته عن مركزه.

حساب حجم الكرة

حجم الكرة يساوي مكعب نصف القطر r^3 ضرب

ثلاثة أرباع $\frac{3}{4}$ ضرب الثابت باي π

$$\frac{4}{3}\times\pi\times r^3$$

حجم الكرة هو مقدار الفراغ الموجود ضمن سطحها المنحني الأوحد، و بالطبع فإن الثابت باي π يمثل النسبة ما بين محيط الدائرة و قطرها diameter أما قطر الدائرة فهو المسافة ما بين نقطتين على محيط الدائرة مروراً بمركزها .

بخلاف بقية الشكال الهندسية المجسمة التي مرت معنا سابقاً فإنه لا يمكن تفكيك الشكل الكروي الثلاثي الأبعاد إلى شكلٍ مسطح ثنائي الأبعاد .

إن مساحة أي جسمٍ كروي تُساوي أربعة أضعاف مساحة دائرة بالقطر ذاته.

المساحة السطحية لأي جسمٍ كروي تساوي أربعة أضعاف المساحة السطحية لدائرة بالقطر ذاته.

و لذلك فإن المساحة السطحية للكُرة تساوي:

$$4 \pi r^2$$

$$4 \times \pi \times r^2$$

مساحة الدائرة تساوي πr^2 أي أن المساحة السطحية لأي كرة تساوي مساحة الدائرة التي لها المحيط و القطر ذاته ضرب أربعة 4 .

مساحة الكرة تساوي أربعة أضعاف مساحة دائرة مماثلة من حيث المحيط و القطر.

حجم الكرة:

$$\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$



مسألة

مجسم كرة أرضية يبلغ طول نصف قطره 20 cm سنتمتر .

كم تبلغ مساحتة السطحيه surface area؟

المساحة السطحية لكرة تساوي $4\ \pi r^2$ أي $4 \times \pi \times r^2$ (أربعة أضعاف المساحة السطحية لدائرة تماثلها من حيث القطر و المحيط) أي الدائرة التي تمتلك نصف القطر ذاته و المحيط ذاته.

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة:

$$4 \times \pi \times r^2 = 4 \times \pi \times 20^2 = 5026\ \ cm^2$$

هو مساحة سطح هذه الكرة.

هنالك زر للثابت باي π في الآلة الحاسبة بمجرد أن تضغطه فكأنك أدخلت قيمة هذا الثابت إلى العملية.



مسألة :

إذا كان نصف قطر كرة القدم الدولية يبلغ 11.5 cm سنتمتر أحسب كلاً من المساحة السطحية SA و حجم كرة القدم الدولية.

كما مر معنا سابقاً فإن **مساحة الكرة (أي كرة) تساوي أربعة أضعاف مساحة الدائرة الموازية لها ، أي الدائرة التي لها القطر ذاته ، أي أن معادلة حساب المساحة السطحية للكرة تساوي 4 ضرب المساحة السطحية للدائرة الموازية.**

$$4\,\pi r^2$$

$$4 \times \pi \times r^2$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$4 \times \pi \times r^2$$

$$4 \times \pi \times 11.5^2 \approx 1661.6\ cm^2$$

المساحة السطحية لكرة القدم الدولية .

حساب حجم كرة القدم الدولية :

معادلة حساب حجم شكلٍ كروي :

$$\frac{4}{3}\times\pi\times r^3$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$\frac{4}{3}\times\pi\times11.5^3\approx6370.6\ cm^3$$


$$\frac{4}{3}=4\div3=1.3333333333$$

$$1.3333333333\times\pi\times11.5^3\approx6370.6\ cm^3$$

سنتمتر مكعب هو حجم كرة القدم الدولية.

$\approx$ يساوي تقريباً





إذا كان نصف قطر الكرة الأرضية يبلغ KM **6371** كيلو متر تقريباً . احسب كلاً من مساحة الكرة الأرضية السطحية و حجمها.

كما مر معنا سابقاً فإن مساحة الكرة (أي كرة) تساوي أربعة أضعاف مساحة الدائرة الموازية لها ، أي الدائرة التي لها القطر ذاته ، أي أن معادلة حساب المساحة السطحية للكرة تساوي 4 ضرب المساحة السطحية للدائرة الموازية.

$$4\,\pi r^2$$

$$4 \times \pi \times r^2$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$4 \times \pi \times r^2$$

$$4 \times \pi \times 6371^2 \approx 510\ 064\ 472\ KM^2$$

كيلو متر مربع المساحة السطحية للكرة الأرضية .

احسب حجم الكرة الأرضية

معادلة حساب حجم شكلٍ كروي :

$$\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$


نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$\frac{4}{3} \times \pi \times 6371^3 \approx 1.831 \times 10^{12}\ KM^3$$

كيلومتر مكعب هو حجم الكرة الأرضية تقريبا و هو ما يساوي تقريباً 260 مليار ميل مكعب.

هل لفت نظركم شيئٌ ما في المسألتين السابقتين ؟

إن حجم كرة القدم الدولية بالسنتيمتر المكعب أي $6370.6\ cm^3$ يساوي تقريباً طول نصف قطر الكرة الأرضية بالكيلومتر 6371 KM .



مسألة فلكية 2

إذا كان نصف قطر القمر يبلغ 1737.5 KM كيلو متر.

احسب المساحة السطحية للقمر و حجمه .

كما مر معنا سابقاً فإن **مساحة الكرة (أي كرة) تساوي أربعة أضعاف مساحة الدائرة الموازية لها ، أي الدائرة التي لها القطر ذاته ، أي أن معادلة حساب المساحة السطحية للكرة تساوي 4 ضرب المساحة السطحية للدائرة الموازية.**

$$4 \pi r^2$$

$$4 \times \pi \times r^2$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$4 \times \pi \times r^2$$

$$4 \times \pi \times 1737.5^2 \approx 3.79 \times 10^7 \text{ KM}^2$$

كيلو متر مربع المساحة السطحية للقمر .

حساب حجم القمر :

معادلة حساب حجم شكلٍ كروي :

$$\frac{4}{3}\times\pi\times r^3$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$\frac{4}{3}\times\pi \times 1737.5^3 \approx 2.2\times10^{10}\ KM^3$$

كيلومتر مكعب هو حجم القمر تقريبا و هو ما يساوي تقريباً , واحد على 50 من حجم الكرة الأرضية.





الشكل الكروي مجسمٌ ثلاثي الأبعاد ذو سطحٍ واحد منحني و كل نقطةٍ على سطح الكرة تبعد بالمقدار ذاته عن مركز الكرة.

مساحة الكرة تساوي أربعة أضعاف المساحة السطحية للدائرة التي توازيها ، أي الدائرة التي يكون قطرها و محيطها مماثلين لقطر و محيط تلك الكرة (في بعدين فقط بالطبع).

المساحة السطحية للدائرة πr^2

المساحة السطحية للكرة $4\ \pi r^2$ أي $4 \times \pi r^2$

أي أربعة أضعاف المساحة السطحية للدائرة.


تحسب مساحة الكرة بالعلاقة :

$$\frac{4}{3} \times \pi\ r^3$$

$$\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

$\frac{4}{3}$ ضرب الثابت باي π ضرب مكعب نصف القطر r^3 .

الأشكال الثلاثية الأبعاد المركبة Compound 3D Shapes



الأشكال الثلاثية الأبعاد المركبة هي الأشكال التي تتألف أو تتكون من أكثر من شكلٍ واحدٍ مجسم .


المساحة السطحية لأي شكلٍ مركب تُساوي مجموع المساحات السطحية للأشكال المكونة له .

حجم اي شكلٍ مركب يساوي مجموع أحجام الأشكال المجسمة التي تكونه.

كثيرٌ من الأشكال المجسمة التي نصادفها في الحياة هي أشكالٌ مركبة فالمنازل الغربية التي نراها في الضواحي هي عبارة عن مكعبٍ أو متوازي مستطيلات مع هرمٍ أو موشور يمثل السقف مثلاً.



كيف نحسب المساحة السطحية و حجم شكلٍ نصف كروي half sphere ,hemisphere :



المساحة السطحية لنصف الكرة تساوي المساحة السطحية لكرة تقسيم 2

$$\frac{4\ \pi r\hat{}2}{2}$$

$$4\ \pi r^2 \div 2$$

$$4\ \pi r^2/2$$

$$4\times \pi\times r^2/2$$

^رمز القوة و هو البديل عن كتابة القوة بالشكل $4\ \pi r^2$

$$4 \pi r^2 = 4 \pi r^2$$

$$4 \times \pi \times r^2$$

انتبه جيداً :

المساحة السطحية لنصف الكرة تساوي مساحة الكرة تقسيم 2 هل تتضمن هذه المساحة مساحة السطح السفلي الدائري لنصف الكرة؟

لا إنها لا تتضمنها و لذلك يتوجب حساب مساحة المقطع الدائري للكرة أو نصف الكرة (مساحة دائرة مماثلة للكرة من حيث طول نصف قطرها و مُحيطها و إضافة مساحتها للمساحة السطحية لنصف الكرة.

و لذلك انتبه جيداً فإذا طُلب منك حساب المساحة السطحية لنصف كرة و نسيت إضافة مساحة سطحها السفلي أو مقطعها العرضي الدائري فإنك تكون بذلك قد أجبت نصف إجابة فقط.

عند حساب المساحة السطحية surface area لجسمٍ مركب فإن علينا الانتباه إلى مسألةٍ شديدة الخطورة و الأهمية و هي أن المساحة السطحية الكلية لمجسمٍ مركبٍ ثلاثي الأبعاد مؤلف من عدة أشكالٍ مجسمة لا تساوي مجموع المساحات السطحية للأشكال المجسمة التي يتألف منها ذلك المجسم عندما تكون تلك الأشكال منفردة و غير متصلة ببعضها البعض.

كيف ذلك؟

إذا كان لدي مثلاً شكلٌ مجسم يتألف من نصف كرة و أسطوانة و أردت أن أحسب المساحة السطحية لهذا الشكل فسوف يكون من الخطأ الفادح أن أحسب المساحة السطحية للمقطع العرضي الدائري لسطح الأسطوانة و أن أضيفها للمساحة السطحية لنصف الكرة .

لماذا؟

لأن الأسطوانة المنفردة تتألف من سطحين دائريين (سطح و قاع) يفصل بينهما شكلٌ أنبوبي ، و لكن عندما أضع فوق الأسطوانة نصف كرة (قبة مثلاً) فإن هنالك سطحين يختفيان وهما بالطبع السطح السفلي الدائري للقبة و السطح العلوي الدائري للأسطوانة ، و يصبح لدي عندها سطحٌ علوي واحد للأسطوانة و هو القبة النصف دائرية و يتبقى لدي سطحٌ سفليٌ دائريٌ واحد.


و لذلك و بدلاً من حساب مساحة السطح الدائري للأسطوانة فإنني أحسب المساحة السطحية للقبة و أضيفها للمساحة السطحية للأسطوانة بعد حذف مساحة السطح الدائري العلوي للأسطوانة.

و لذلك عند **حساب المساحة السطحية لأسطوانةٍ فوقها نصف كرة فإنني أقوم بحساب المساحة السطحية لسطحٍ دائريٍ واحد هو السطح الدائري السفلي و ليس سطحين دائريين اثنين كما جرت العادة ثم أُضيف مساحة الأنبوب .**

في مثل هذه الحالة لا تتبقى هنالك أي أهمية للأسطح الملتصقة ببعضها البعض و يصبح عندها **من الخطأ القيام بحساب مساحة السطحين الملتصقين مع بعضهما البعض و هذا ينطبق على جميع المجسمات المركبة.**

عند حساب المساحة السطحية للمجسمات المركبة فإننا لا نقوم إلا بحساب الأسطح الخارجية الظاهرة بالنسبة لنا كما تبدوا لنا من الخارج ما لم يُطلب منا غير ذلك ، كما هي حال المنازل التي تتألف من مكعبٍ أو متوازي مستطيلات يعلوه موشور (السقف) حيث أننا نحذف من عملية الحسبة تلك السطحين الملتصقين مع بعضهما البعض.

قبـة نصـف الكـرة حلـت محـل كـلٍ مـن السـطح السـفلي لنصـف الكـرة و السـطح العلـوي للأسـطوانة



فإذا كان لدينا شكلٌ يتألف من أسطوانة سطحها عبارة عن نصف كرة فإننا نحسب المساحة السطحية للكرة ثم نقسم النتيجة على 2 فنحصل على المساحة السطحية لنصف الكرة و نتجاهل مساحة السطح السفلي الدائري لنصف الكرة كما نحسب مساحة الأسطوانة و نحذف مساحة سطحها العلوي الدائري .

لماذا؟

لأنه سوف يلتصق مع السطح الدائري السفلي لنصف الكرة و لن يظهر أيٌ منهما للعين.

و من الممكن في الأشكال المركبة المجسمة أن تكون أساساً مُفرغةً من الداخل كما هي حال الأبنية .

المساحة السطحية لشكلٍ أسطواني تساوي

$$2\pi r h+\pi r^{2}$$

$$2\times\pi\times r\times h+\pi\times r^{2}$$

2 ضرب الثابت باي π ضرب نصف القطر r ضرب ارتفاع الأسطوانة h ، وهي تساوي محيط الأسطوانة و الذي يكون مساوياً كذلك لطول المستطيل المكون لجسم الأسطوانة.

علاقة حساب محيط الدائرة (محيط الأسطوانة)هنا المقصود منها حساب طول المستطيل الذي يُشكل جسم الأسطوانة و ليس أي شيءٍ آخر على اعتبار أن محيط الأسطوانة أو محيط المقطع الدائري للأسطوانة يُساوي طول المستطيل الذي يُشكل جسم الأسطوانة.

طول المستطيل المساوي لمحيط الأسطوانة (محيط الدائرة) هذا × ارتفاع المستطيل = مساحة المستطيل الذي يُشكل جسم الأسطوانة ، ذلك أن محيط الدائرة $2\pi r$ أو مُحيط الأسطوانة التي يكون مساوياً لطول المستطيل الملتصق مع الدائرة ، أما الارتفاع h فهو ارتفاع المستطيل الذي يمثل جسم الأسطوانة.

أما العلاقة πr^{2} (الثابت باي) π ضرب نصف القطر المرفوع للقوة الثانية فهي تُمثل مساحة المقطع الدائري السفلي للأسطوانة .

لاحظ كيف أننا حسبنا سطحاً دائرياً واحداً فقط في هذه الأسطوانة و هو السطح السفلي لأن السطح العلوي يكون ملتصقاً مع السطح السفلي لنصف الكرة أو لا يكون لهذين السطحين وجودٌ أصلاً إذا كان هذا المجسم أجوف و نحن لا يهمنا عند حساب مساحات المجسمات المختلطة إلا الأسطح الظاهرة للعيان.



محيط الدائرة :

$$2\pi r$$

$$2\times\pi\times r$$

مساحة الدائرة :

$$\pi r^{2}$$

$$\pi \times r^{2}$$

$$\pi \times r \times r$$

إذا قمنا بتفكيك مجسم مركب فإن إجمالي مساحات سطوح المجسمات المكونة له يصبح أكبر من المساحة السطحية لذلك المجسم المؤلف من تلك الأشكال المجسمة.

المساحة السطحية لمجسمٍ مركب تكون أقل من المساحات السطحية للأشكال المكونة له.

لماذا؟

لأننا نُسقط من حساباتنا السطوح الداخلية التي لا يُمكن رؤيتها من الخارج.

عند حساب المساحة السطحية لمجسم من الخارج فإننا لا نحسب أي سطحٍ لا يُمكن رؤيته من الخارج (ما لم يُطلب منا غير ذلك).

ففي حال المنزل المكون من متوازي مستطيلات أو مكعب مغطى بسقفٍ هرمي أو موشوري فإننا عند حساب المساحة السطحية لهذا المنزل نسقط من حساباتنا السطحين المتلاصقين و هما السطح العلوي للمكعب أو متوازي المستطيلات و السطح السفلي للموشور او الشكل الهرمي.

تدوير و جبر الأرقام   Rounding Numbers

نعني بتدوير الأرقام تقريبها لأقرب عشرة تسهيلاً للتعامل معها.

يمكن تقريب الأرقام للأعلى rounding up أو للأدنى rounding down .

متى نقوم بتدوير رقمٍ ما نحو الأعلى و متى نقوم بتدويره نحو الأدنى ؟

أي متى نجبر رقماً ما إلى رقمٍ أعلى و متى نجبره إلى رقمٍ أدنى؟

إننا **نعتبر بأن النقطة الوسطى midpoint هو العدد خمسة فإذا كان الرقم أدنى من 5 فإننا نجبر ذلك الرقم نحو الأدنى .**

مثال : **نجبر الرقم 71 نحو الأدنى فيصبح 70 و كذلك فإننا نجبر الرقم 72 نحو الأدنى فيصبح 70 و كذلك فإننا نجبر الرقم 73 نحو الأدنى فيصبح 70 و نجبر الرقم 74 نحو الأدنى فيصبح 70 .**

أما الرقم الذي يقع عند الحد الوسيط (أي العدد خمسة) و ما هو أعلى من ذلك فإننا نجبره نحو الأعلى حيث نجبر الرقم 75 مثلاً إلى 80 و نجبر الرقم 76 إلى 80 و نجبر 77 إلى 80 و نجبر 78 إلى 80 و بالطبع فإننا نجبر 79 إلى 80.



إذاً فإننا نقوم بتدوير الرقم أو تقريبه أو جبره نحو الأعلى (تقريباً صاعداً) إلى أقرب عشرة عندما يكون ذلك العدد خمسة 5 أو أعلى و نقوم بجبره نحو الأدنى (تقريباً هابطاً) إذا كان العدد 4 أربعة أو أدنى من ذلك.

جبر المنازل أو المرتبات العشرية decimal places

إذا قمنا بجبر رقمٍ عشريٍ ما فإن جبر ذلك الرقم يعتمد على عاملين اثنين هما :

عدد الأرقام التي يتوجب علينا أن نجبر الرقم العشري إليها، أي عدد الأرقام و الخانات التي يتوجب أن نُقرب الرقم العشري إليها، فإذا طلب مني أن أجبر رقماً عُشرياً ما إلى رقم عشري يتألف من ثلاثة أعداد أو ثلاث خانات فإنني أعد بعد النقطة العشرية ثلاث خانات أو ثلاث أعدادٍ فقط و أتوقف عندها.

مثال :

اجبر **الرقم العشري** 23.463255 إلى **رقمٍ عشري يتألف من ثلاثة أعدادٍ فقط**.

هو قال لي **(رقمٌ عشري) أي أنه يقصد الرقم الموجود وراء النقطة العشرية أي الرقم 463255**

و لذلك و كما طُلب مني فإنني أعد ثلاثة خانات بعد النقطة العشرية و أتوقف عندها تماماً.

أي أنني أتوقف عند الرقم 463 فأحصل على 23.463 .

23.463255

العامل الثاني أن أنظر إلى العدد التالي للعدد الذي طُلب مني أن أتوقف عنده ، و هو هنا العدد 2 و هو رابع عدد بعد النقطة العشرية .

23.463255

إن الرقم الذي يلي العدد الثالث (الحد الذي طُلب مني أن أتوقف عنده) هو العدد 2 ، و هذا العدد أدنى من العدد خمسة 5 و لذلك فإنني أجبر العدد النهائي أو عدد التوقف 3 نحو الأدنى ، أي أن العدد 3 يبقى كما هو و لا أجبره نحو الأعلى ليصبح 4 .

23.463

قم بجبر الرقم العشري 214.246837 إلى رقمٍ عشري خماسي.

أعد خمس خانات بعد النقطة العشرية حيث أتوقف عند العدد الخامس بعد النقطة فأجد بأنه العدد 3 فأتوقف عنده .

214.246837

أنظر إلى العدد التالي له و هو العدد 7 ، و بما أن العدد 7 أكبر من 5 فإنني أجبر العدد السابق له أي العدد 3 نحو الأعلى أي أنه يصبح 4 ثم أحذف ما بعده.

214.246837

لماذا؟

لأنه العدد الخامس و لأنه قد طلب مني أن أجبر الرقم العشري إلى خمسة أرقام.

214.24684

الأرقام ذات الشأن significant figures

تعتبر طريقة تحويل الأرقام ذات الشأن significant figures إحدى طرق جبر الأرقام و تدويرها و تقريبها و تعرف هذه الطريقة اختصاراً ب s.f .

لتحويل أي رقمٍ ذو شأن فإننا نبدأ من أول عددٍ غير صفري nonzero ابتداءً من الجهة اليسرى ثم نعد الأعداد التالية.

410013

هذا الرقم يتألف من ستة أعداد ذات شأن و العدد الأخير 3 هو أدنى من العدد 5 و لذلك فإننا نقوم بجبره إلى صفر ليصبح :

410013 ⟶ 410010

لاحظ كيف جبرنا العدد 3 نحو الأدنى حيث وضعنا صفراً مكانه.

3 ⟶ 0

و يمكن لنا أن نجبر هذا الرقم قدماً ، و بما أن العدد واحد 1 أدنى من العدد 5 فبإمكاننا أن نضع صفراً مكانه ليصبح الرقم 410010 على الصورة التالية :

410000

اجبر الرقم العشري التالي :

0.003842

نبدأ العد ابتداءً من أول عددٍ غير صفري من الجهة اليسرى أي العدد 3 :

0.003842

و كما ترون فإن الرقم السابق يحتوي أربعة أعداد ذات شأن (غير صفرية)

4 significant figures و هي الأعداد 3842 :

0.003842

نقوم بجبر الرقم وفقاً لما يُطلب منا فإذا طُلب منا أن نجبر الرقم إلى ثلاثة أرقام ذات شأن فإنه يُصبح :

0.00384

و إذا طُلب منا أن نجبره إلى رقمين ذوي شأن فإنه يُصبح:

0.0038

و إذا طُلب مني أن أجبره إلى ثلاثة منازل عُشرية 3 decimal places فإنه يُصبح:

0.004

قُمت بجبر العدد 3 نحو الأعلى ليصبح 4 لأن العدد التالي له كان العدد 8 .

ثلاثة خانات بعد النقطة العشرية.

.004

و إذا طُلب مني أن أجبره إلى أربعة منازل عُشرية 4 decimal places فإنه يُصبح:

0.0038

قُمت بجبر العدد 8 نحو الأسفل لأن العدد التالي له كان العدد 4 و لذلك فقد أبقيته كما هو .

أربع خانات بعد النقطة العشرية.

.0038

و إذا طُلب مني أن أجبره إلى خمسة منازل عُشرية 5 decimal places فإنه يُصبح:

0.00384

خمس خانات بعد النقطة العشرية.

.00384

قُمت بجبر العدد 4 نحو الأسفل لأن العدد التالي له كان العدد 2 و لذلك فقد أبقيته كما هو .



π

نستخدم الرموز في الجبر للإشارة إلى العناصر التي لا نعرف قيمتها او العناصر التي تحمل قيماً متغيرة .

إن وحدات البناء building block الأساسية في الجبر تدعى بالحدود terms .

يمكن للحد term في الجبر أن يكون رقماً او مزيجاً من حرفٍ و رقم .

إن وجود عاملٍ عددي(عدد) قبل حرف يعني بأن هذا العدد مضروبٌ بالحرف أو أن هذا الحرف مضروبٌ بنفسه بعددٍ مرات يماثل ذلك العدد.

مثال:

$$3a = 3 \times a = a \times a \times a$$

$$4d = 4 \times d = d \times d \times d \times d$$

$$2x = 2 \times x = x \times x$$

$$5b = 5 \times b = b \times b \times b \times b \times b$$

و العدد الذي يتقدم ذلك المتغير (الحرف) يدعى بالعامل coefficient أي عامل ذلك المتغير أو ذلك الحرف.

فالعدد 5 مثلاً في 5b هو عامل أو معامل بي b أي coefficient of b .

تدعى في علم الجبر الأعداد بالثوابت constants لأنها عناصر ذات قيمةٍ ثابتة لا تتغير.

يأتي العامل (العدد) قبل المتغير (الرمز أو الحرف) حتماً.

في حال ما إذا ورد المتغير (الحرف) دون عاملٍ عددي فذلك يعني بشكلٍ افتراضي أنه يتقدمه العدد واحد 1 .

الحد أو المتغير المرفوع لقوةٍ معينة يعني بأن ذلك الحد مضروبٌ بنفسه :

$$a^2 = a \times a$$

$$\frac{2a}{b} = 2 \times a \div b$$

يمكن للحدود أن تكون سلبية أو موجبة .

في حال لم توجد شارة إلى ميسرة الحد أو المتغير أو العدد فذلك يعني بأن ذلك العنصر عنصرٌ موجب.

$$b = +b$$

$$a = +a$$

الحدود كما هي الأرقام تكون موجبةً بشكلٍ افتراضي ما لم يذكر غير ذلك.

$5 = +5$

$a = +a$

$b = +b$

$8 = +8$

إذا كان هنالك متغيرين (حرفين) بجوار بعضهما البعض مثل ab مثلاً فذلك يعني بأن هنالك علاقة ضربٍ بينهما:

$$dc=d\times c$$

dc تعتبر حداً term .

إذا رأينا عاملاً عددياً (عدداً) قبل متغير (حرف) فذلك يعني بأن العدد مضروبٌ بذلك الحرف :

$$2a = 2\times a = a \times a$$

$$3c = 3\times c = c\times c\times c$$

دائماً نضع العامل العددي (العدد) قبل المتغير (الحرف) .

كلاً من العامل العددي (العدد) و المتغير(الحرف) يشكلان حداً term واحداً.

يتم التعبير في الجبر عن علاقة القسمة على شكل كسر :

$$\frac{a}{b}=a \div b$$

يمكن في الجبر رفع المتغيرات (الأحرف) في الجبر للقوة X^2

يُمكن للحد Term أن يكون عدداً أو حرفاً a مثلاً ، أو مزيجاً من عددٍ و حرف ...3a ,4b

التعابير الجبرية expression

تمثل التعابير الجبرية أو العلاقات الجبرية expression عملية أو مجموعة عمليات رياضية بين عدة حدود، و على أقل تقدير فإنه يتوجب في التعابير الجبرية أن تتألف من حدين اثنين مع

رمز أو رموز عملياتية **operator symbols** مثل علامات الجمع و الطرح و الضرب و سواها، و هذه الرموز العملياتية (علامات العمليات الرياضية) تفصل ما بين الحدود المختلفة في العلاقة الرياضية.

يُمكن للحد أن يتألف من عدة عناصر مثلاً الحد 3bc و الحد 4ab و ما إلى ذلك.

تفصل بين الحدود علامات العلاقات الرياضية :

$$3bc - 4ab$$

ضم الحدود المتشابهة Combining like terms

تسهيلاً لإجراء العمليات الرياضية و حل المعادلات يمكننا ضم الحدود الجبرية المتشابهة إلى بعضها البعض شريطة أن تكون أحرفها متماثلة .

لا يمكن إجراء عمليتي الجمع و الطرح على الحدود الجبرية ما لم تكن متغيراتها اي أحرفها متماثلة ، مثال :

$$2a + a = 2a + 1a = 3a$$

إننا نعتبر دائماً بأن عدم وجود عاملٍ عددي (عدد) أمام الحرف يعني بأن عامله العددي هو العدد واحد 1 ، أي كأننا نقول :

$$2a+ a=2a+1a=3a$$

لتكن لدينا العلاقة التالية :

$$4a+5-a+3bc-3+d-4bc$$

في العلاقة 4a+5 – a لا يمكننا أن نقوم بتنفيذ عملية الجمع أو الطرح ما بين 4a و العدد 5 لأنها حدودٌ غير متشابهة (لا تمتلك المتغير a ذاته)

$$4a+5-a+3bc-3+d-4bc$$

و لكن بإمكاننا أن نتجاوز الحد 5 لنجري عملية الجمع ما بين الحد 4a و الحد a لأنهما حدين متشابهين ذلك أن المتغير أو الحرف فيهما أي a متماثل.

$$4a+5-a+3bc-3+d-4bc$$

إذاً يتوجب علينا أن نتجاوز العدد 5 و أن نعتبره مبدئياً غير موجود :

$$4a+5-a \rightarrow 4a+-a$$

إذاً فقد **تجاهلت العدد 5 في العلاقة 4a+5 – a و بالطبع في الجبر كل حرفٍ لا يوجد قبله عدد فإن ذلك يعني بأن أمامه العدد واحد 1 ، أي أن المتغير a يعني 1a** ، و بعد ذلك تصبح العلاقة على الشكل التالي:

$$4a+(-1a)=3a$$

$$4+(-1)=3$$

و بذلك فإن التعبير 4a+5 – a قد اصبح 3a مع قيامي بترحيل العدد 5 إلى عملية الجمع التالية حيث أن لعلاقة هي في النهاية عملية جمع :

أتذكر العلاقة الأصلية :

$$4a+5 -a+3bc-3+d -4bc$$

كما ترون فإن **لدينا حدين متشابهين أي أنهما عبارة عن عددين و هما 5 و 3 و العلاقة القائمة بينهما هي علاقة جمع .**

$$5 - a +3bc-3$$

لا يُمكن جمع رقم مع رقمٍ يتقدم حرفاً.

هنا **كما تجاهلت وجود الحدود التي لا تشبه الحد 4a في السابق، أي كما تجاهلت العدد 5 لأنه لا يمكن جمعه مع حدٍ يحوي حرفاً مثل a فإنني الآن أتجاهل الحدود التي تحتوي على الحرف a لأنه لا يمكن جمعها مع العدد 5 حيث أبقي فقط على الأعداد ، و لا أنسى أن أبقي على الشارات التي لم أستنفذها في العمليات الرياضية** لتصبح لدي العلاقة التالية :

$$4a+5-a+3bc-3$$

إلى الصورة التالية :

$$5 + (-3) =2$$

حيث **تتحول شارة الطرح إلى شارة عددٍ سلبي** و بذلك فإن العلاقة :

$$4a+5-a+3bc-3$$

أصبحت على الصورة التالية :

$$3a+2$$

العلاقة الأصلية :

$$4a+5–a+3bc-3+d-4bc$$

بقي لدي حدين متشابهين لأن متغيراتهما (أحرفها) متماثلة و هما الحدين :

$$-4bc\ ,\ 3bc$$

أتجاهل كل ما عداهما و أجري عليهما العمليات :

الحد 3bc حدٌ موجب بل إن شارة الموجب (شارة عملية الجمع) تسبقه كذلك ، بينما الحد

-4bc تسبقه شارة عملية طرح و في مثل هذه الحالة فإننا نعتبره حداً سلبياً .

إذاً فإن الحد 3bc هو حدٌ موجب بينما الحد -4bc هو حدٌ سالب حيث تسبقه شارة طرح .

أجري عملية الجمع المعلقة بين هذين الحدين :

$$3bc + (- 4bc) = (-1bc) = (-bc)$$

و لكننا في الجبر لا نضع العدد واحد قبل أي حرف .

$$3+(-4)=(-1)$$

تذكر دائماً :

يمكن لشارة الطرح أن تتحول إلى شارةٍ سلبية ، و يُمكن للشارة السلبية أن تتحول إلى شارة طرح و لذلك فإنني أضع شارة طرح قبل الحد bc.

الحد d فلا مثيل له و لذلك فقد بقي على حاله و بالتالي فإن العلاقة :

$$4a+5 – a +3bc - 3+d -4bc$$

تصبح على الشكل التالي بعد ضم عناصرها المتشابهة و إجراء العمليات الرياضية المعلقة:

$$3a+2-bc+d$$

لماذا أصبحت لدينا عملية طرح قبل bc ؟

لأنه حدٌ سلبي.

العلاقة الأساسية :

$$4a+5-a+3bc-3+d-4bc$$

الناتج :

$$3a+2-bc+d$$

كما ترون فقد كانت لدي في العلاقة الأصلية ثلاث عمليات جمع و ثلاث عمليات طرحٍ بقي منها عمليتي جمع و عملية طرحٍ واحدة ، و ذلك بعد أن قمت بدمج الحدود و تنفيذ العمليات الرياضية المعلقة القابلة للتنفيذ.

أين أضع ناتج العمليات القابلة للتنفيذ ؟

هل أضعها مكان أول حدٍ أو في مكان ثاني حد؟

مثال :

لتكن لدي العلاقة التالية :

$$4a+5-a$$

$$4a+(-a)=4a+(-1a)=3a$$

هل أكتب النتيجة بالشكل :

$$3a + 5$$

أي أضع الناتج في الحد الأول .

أم أضع الناتج في الحد الثاني فأكتبها على الشكل :

$$5 - 3a$$

بل أقوم دائماً بوضع الناتج في الحد الأول .

$$4a + 5 - a$$

$$4a + - a$$

$$4a + - 1a$$

$$3a + 5$$

لا يمكنني أن أجمع او ان أطرح إلا الحدود المتشابهة ، أي الحدود التي تكون متغيراتها (أحرفها) متماثلة .

لا تنطبق هذه القاعدة على عمليتي الضرب و القسمة حيث أن هذه القاعدة تقتصر على عمليتي الجمع و الطرح ذلك أنه بإمكاننا في عمليات الضرب و القسمة أن نضرب و نقسم ما نشاء بما نشاء.

$$3\times a=3a$$

$$\frac{3}{a}$$

بينما لا يُمكنني أن أجمع أو أن اطرح حرفاً او مُتغيراً مثل a مع عدد مثل 3 مثلاً .

$3+a$ **خطأ**

3-a خطأ

لا يمكنني ان اجمع أو أن أطرح متغيرين (حرفين) غير متماثلين مع بعضهما البعض:

b+a خطأ

b-a خطأ

لا تنطبق هذه القاعدة على عمليتي الضرب و القسمة حيث أن هذه القاعدة تقتصر على عمليتي الجمع و الطرح ذلك أنه بإمكاننا في عمليات الضرب و القسمة أن نضرب و نقسم ما نشاء بما نشاء.

$$a \times b = ab$$

$$\frac{a}{b}$$

يُمكنني أن أجمع او أن أطرح مُتغيراً (حرفاً) لا يسبقه عاملٌ عددي (عدد) مع مُتغيرٍ (حرف) يسبقه عاملُ عددي :

$$b+3b$$

$$4b-b$$

لماذا ؟

لأننا نفترض دائماً بأن المُتغير (الحرف) الذي لا يسبقه عاملُ عددي إنما يكون بشكل افتراضي له عاملٌ عددي هو العدد واحد 1 :

$$a=1a$$

$$b=1b$$

$$X=1X$$

لتكن لدي العلاقة :

$$5 + 3bc - 3$$

هل أضع النتيجة في الحد الأول فأكتب :

$$2 + 3bc$$

$$5+(-3)=2$$

أم أضع النتيجة في الحد الثالث :

$$3bc - 2$$

الحل الأول هو الحل الصحيح $2 + 3bc$

أي أنني أضع النتيجة 2 مكان في الخانة الأولى مكان العدد 5 .

$$3bc + d - 4bc$$

$$3+(-4)=(-1)$$

هل اضع ناتج عملية الجمع مكان الحد الأول 3bc فأكتب :

$$-bc+d$$

$$-1bc+d$$

أم أضعها في الحد التالي :

$$d - bc$$

بل أضعها مكان الحد الأول :

$$-bc+d$$

$$-1bc+d$$

إذاً فإنني عندما أجري عمليةً على حدين فإنني أضع الناتج دائماً مكان الحد الأول.

لا يمكنني أن اجمع أو أن أطرح حدوداً تحوي متغيرات (أحرف) غير متماثلة.

كما ترون فقد بدأت أولاً بجمع الحدين المتماثلين مع بعضهما البعض :

$$3a+(-a) =4a+ (-1\ a)=2a$$

$$3a+(-1a) =4a+ (-\ 1a)=2a$$

$$3+(-1)=2$$

ثم وضعت الناتج مكان الحد الأول المشابه 4a ، و بذلك فقد تمكنت من حذف الحد الثاني المشابه (a -) و وضعت الناتج مكان الحد الأول المشابه 3a في البداية .

لدي حدين متماثلين هما عبارة عن عددين :

$$+5 - (-3) = 2$$

وضعت الناتج أي 2 مكان الحد الأول 5 و حذفت الحد الثاني 3-

$$+5 - \cancel{(-3)} = 2$$

$$2$$

لدي عملية جمع حدين متماثلين :

$$3bc + (-)\ 4bc$$

$$3bc + \cancel{(-)\ 4bc}$$

$$3 + (-) 4 = (-1)$$

-bc

أضع الناتج bc- مكان الحد الأول 3bc و أحذف الحد الثاني و بذلك فإنني لا أتعرض للارتباك.

كلما أجريت عملية بين حدين متماثلين في سلسلة عملياتٍ طويلة فإنني أضع الناتج مكان الحد الأول و أحذف الحد الثاني مع الشارة العملياتية التي تسبقه.

عندما أجري عملية رياضية بين حدين متماثلين في سلسلة عملياتٍ طويلة فإنني أضع الناتج مكان الحد الأول و أحذف الحد الثاني مع الشارة العملياتية التي تسبقه.

الإبدال Substitution

يعني الإبدال وضع القيمة الرقمية الحقيقية مكان الرمز المتغير الذي يدل على تلك القيمة.

التقييم evaluation هو إيجاد القيمة الكلية للعلاقة الرياضية و ذلك بعد أن نتمكن من إبدال جميع المتغيرات (الرموز و الأحرف) بقيمٍ عددية ثابتة .

الرفع للقوة exponent : يعني رفع عددٌ ما لقوةٍ ما ضرب ذلك العدد بنفسه عدداً محدداً من المرات.

كما مر معنا في بحث ترتيب العمليات الرياضية فإنه عند وجود أقواس و قوى فإن الأولوية تكون دائماً للأقواس ، و لذلك عندما يصادفنا حدٌ ما مرفوعٌ لقوةٍ ما محصورٌ بين قوسين فيجب القيام بتفكيك القوة من خلال ضرب ذلك الحد بنفسه عدداً من المرات تماثل تلك القوة.

ليكن لدينا الحد التالي bc^3 .

كما مر معنا في بحث أولويات العمليات الرياضية فإننا نقوم أولاً بتنفيذ عملية الرفع للقوة C^3 قبل إجراء عملية الضرب ، أي أنني أقوم أولاً بتفكيك القوة :

$$C^3=C\times C\times C$$

ثم أجري بعد ذلك عملية الضرب BC أي B×C لأن عملية الضرب تقع ثانياً من حيث الأولوية:

$$bc^3= b\times c\times c\times c$$

ماذا يعني التعبير $(bc)^3$ ؟

$$(bc)^3$$

إن هذا التعبير ، أي **وجود قوة على القوس تعني ضرورة رفع كل العناصر المحصورة بين القوسين للقوة الثالثة مع ضربها ببعضها البعض ، و وفقاً لأولويات إجراء العمليات الرياضية فإننا نقوم أولاً برفع العناصر المحصورة بين قوسين للقوة الثالثة ثم نضربها ببعضها البعض لأن هنالك علاقة ضرب بين هذين العنصرين $bc=b\times c$**

.

$$(bc)^3= b\times b\times b\times c\times c\times c$$

عنما تحتوي العلاقة الرياضية على حدٍ مرفوعٍ للقوة الثانية فإنها تدعى بأنها تعبيرٌ تربيعي quadratic expression ، أي أن العلاقة التربيعية هي علاقةٌ تحوي مُتغيراً مرفوعاً للقوة الثانية (squared variable) اي متغيرٌ تربيعي مثل b^2 .

Expanding parentheses توسيع الأقواس ، تفكيك الأقواسي هو مصطلحٌ رياضي يعني إزالة الأقواس من التعبير الرياضي.

الخاصية التوزيعية Distributive property

تعني الخاصية التوزيعية ضرب كل قيمة محصورة بين قوسين بقيمة موجودة خارج تلك القوس، و ذلك لتفكيك الأقواس و توسعتها.

مثال :

$$3\,(a+b) = 3a + 3b = 3\times a + 3\times b$$

$$3\ (a+b) = 3\times (a+b)$$

تفكيك القوة التربيعية Expanding quadratic

عندما تظهر القيمة المجهولة ذاتها في كلا القوسين فإن تفكيك الأقواس يوجب مضاعفة تلك القيمة بعد ضربها ببعضها البعض :

$a \times a = a^2$

التعابير التي تحوي حداً مرفوعاً للقوة الثانية تدعى بالتعابير التربيعية quadratic expression

لضرب قوسين ببعضهما البعض فإننا نضرب كل حدٍ في القوس الأولى بكل حدٍ في القوس الثانية ثم نقوم بجمع الحدود المتماثلة:

$$(a+4)\ (a+1)$$

نضرب كل حدٍ في القوس الأولى أي 4, a بكل حدٍ في القوس الثانية أي a, 1 :

$$a\times a = a^2$$

$$a\times 1 = 1a = a$$

$$4\times a = 4a$$

$$4\times 1 = 4$$

لتصبح لدينا العلاقة التالية :

$$(a+4)\ (a+1) =$$

$$(a+4)\ (a+1) = a+4\times a+1=$$

$$a^2 \ +a \ +4a+4 =$$

$$a^2 +5a +4$$

كيف حصلنا على هذه النتيجة أي :

$$a+4a=5a$$

a تعني 1a و كل رمزٍ جبري لا يتقدمه عاملٌ عددي (عدد) فإنه يعني ضمناً بان هنالك العدد واحد 1 قبله .

لا يمكن جمع المتغير(الحرف) المرفوع لقوة مع متغيرٍ آخر غير مرفوع لقوة.

لا تضع في الامتحان العدد واحد قبل متغير أبداً و إنما فعلت ذلك لغاية توضيحية.

Expanding quadratics

عند ضرب عدة أقواسٍ ببعضها البعض ، و عندما نجد القيمة ذاتها في كلا القوسين فإن تفكيك الأقواس و التخلص منها يقتضي تربيع ذلك العناصر التي تتكرر في كلتا القوسين لتصبح قيماً تربيعية :

$$b^2 \ , a^2$$

إن تفكيك الأقواس يتطلب منا دائماً أن نضرب كل حدٍ موجود في القوس الأولى بجميع الحدود الموجودة في القوس الثانية و أن نقوم بعد ذلك بضم (جمع) الحدود المتشابهة أي الحدود التي يكون متغيرها (حرفها) متماثلاً .

مثال :

لتكن لدي العلاقة التالية التي يتوجب علينا تفكيك و توسعة أقواسها :

$$(a+4)\ (a+3)$$

نقوم بضرب كل عنصرٍ في القوس الأولى بالعناصر الموجودة في القوس الثانية:

$$a\times a=a^2$$

$$a\times 3=3a$$

و ليس a3 فهذا خطأٌ قاتل .

$$4\times a=4a$$

$$4\times 3=12$$

$$a^2+3a+4a+12$$

بعد أن قمنا بتنفيذ عملية تفكيك الأقواس عن طريق ضرب جميع محتوياتها ببعضها البعض فإننا ننتقل لتنفيذ العملية التالية من حيث الأولوية و هي عملية الجمع .

نقوم بتنفيذ عملية الجمع ، و بالطبع لا يمكن أن نجمع إلا الحدود المتشابهة ، أي الحدود التي تكون متغيراتها أو مجاهيلها (الأحرف) متماثلة ، و هذا الأمر ينطبق كذلك على عملية الطرح و لكنه لا ينطبق على عمليتي الضرب و القسمة.

a^2 إن المتغير المرفوع لقوة مختلفة يعتبر متغيراً فريداً و مغايراً للمتغيرات الأخرى المشابهة غير المرفوعة لقوة مماثلة و لذلك لا يمكن جمع متغيرٍ مرفوعٍ لقوة مع متغيرٍ مماثلٍ له و لكنه غير مرفوعٍ لقوة مماثلة، و لذلك فإننا نضع هذا المتغير في النتيجة منفرداً كما هو a^2 .

لا يمكن جمع المتغيرات (الأحرف) مع أعداد منفردة.

$$(a+4)\ (a+3) = (a+4)\times(a+3) = a^2 + 3a + 4a + 12 =$$

$$a^2 + 7a + 12$$

ذلك أن :

$$a\times a = a^2$$

$$4\times a = 4a$$

$$4\times 3 = 12$$

$$3a + 4a = 7a$$

هل يمكننا أن نجمع متغيراً ما و ليكن a مثلاً مع متغيرٍ مماثل يتقدمه عاملٌ عددي (عدد) ما و ليكن مثلاً :

$$3a + a$$

نعم يمكننا القيام بذلك و في مثل هذه الحالة فإننا نعتبر دائماً بأن العدد 1 يتقدم أي متغير أي أن :

$a=1a$

كما اننا نفترض بأن كل متغير (حرف) يكون مرفوعاً بشكل افتراضي للقوة الأولى :

$b = b^1$

$$a + 3a = 1a + 3a = 4a$$

و لكي نفهم بشكلٍ كلي التعابير التربيعية و كيف يمكننا تفكيك الأقواس المتعددة في مثل هذه التعابير و العلاقات فإننا نقوم بتصورها على شكل مساحة مستطيل كما مر معنا سابقاً .

سنقوم بتمثيل العلاقة السابقة $(a+3)(a+4)$ على شكل مساحة مستطيل حيث تمثل القوس الأولى $(a+4)$ طول المستطيل ، بينما تمثل القوس الثانية $(a+3)$ عرض المستطيل ، و بما أن مساحة المستطيل تساوي الطول× العرض فإن مساحة هذا المستطيل تساوي طوله أي $(a+4)$ ضرب عرضه أي $(a+3)$:

لماذا حددت عرض المستطيل بالعلاقة $a+3$ و حددت طوله بالعلاقة $a+4$ ؟

لأن طول المستطيل أكبر من عرضه و بالطبع فإن $a+4$ أكبر من $a+3$.

الطـول (a+4)

مســـاحة المســـتطيل

العـرض ضـرب الطـول

(a+3) العـرض

(a+4) (a+3)

$(a+4)\times(a+3)$

(a+3) العـرض

(a+4)

الطـول

إن العلاقة $(a+3)(a+4)$ تمثل المستطيل أو مساحة المستطيل.

الآن نقوم بتجزئة مساحة المستطيل السابق وفق مكوناته:

طول هذا المستطيل (a+4) أما عرضه فهو (a+3) أما مساحة هذا المستطيل فهي ناتج ضرب الطول في العرض أي أنها تساوي :

$$a^2 +3a +4a +12$$

الخاصية التوزيعية Distributive property

إذا تمكننا من تفكيك الأقواس عن طريق ضرب كل العناصر الموجودة في القوس الأولى بكل العناصر الموجودة في القوس الثانية و إذا ظهر العنصر المجهول ذاته في كلا القوسين فإننا نقوم برفعه للقوة الثانية أي أننا نقوم بتربيعه (كما هي حال العنصر a في المثال السابق)

تفكيك الأقواس (التوسعة) Expanding parentheses -

إن تفكيك الأقواس هي العملية المعاكسة لعملية التخصيم Factoring (التقويس) و التي تعني إقحام أقواس في التعبير الرياضي إذا كانت الحدود الموجودة في علاقةٍ أو تعبيرٍ خطي ، و **التعبير الخطي linear expression هو التعبير الذي يكون فيه كل متغير variable (حرف) مرفوعاً للقوة الأولى** و تشترك في عاملٍ أو قاسمٍ مشترك .

$$4a +4b$$

$$4(a+b)$$

$$4a +4b \rightarrow 4\times a +4\times b$$

$$=4(a+b) =4\times(a+b)$$

$$4(a+b) \rightarrow 4a+4b=4\times a+4\times b.$$

$4\times(a+b)$ لا تضع في الامتحان شارة ضرب قبل قوس و إنما قد فعلت ذلك لغاية تعليمية.

الكسور الجبرية Algebric fractions

الكسور الجبرية هي كسورٌ تحوي قيماً مجهولة .

يوصى دائماً بالقيام باختزال و تبسيط الكسور الجبرية.

إذا كان لدينا عامل (قاسم) مشترك common factor يقبل القسمة التامة على كلٍ من بسط الكسر و مقامه (عالي الكسر و أدناه) فإن بإمكاننا اختزال ذلك الكسر و تبسيطه و ذلك عن طريق حذف العوامل أو القواسم التي تتكرر في كلٍ من البسط و المقام حيث نقوم بحذف العناصر المتكررة من كليهما .

مثال :

ليكن لدينا الكسر الجبري Algebric fractions التالي :

$$\frac{12a^6b}{9a^3} =$$

نقوم بتفكيك القوى الموجودة في هذا الكسر الجبري أي a^6 و a^3 فنحصل على الكسر الجبري:

$$\frac{4 \times 3 \times a \times a \times a \times a \times a \times a \times b}{3 \times 3 \times a \times a \times a}$$

كما ترون فإن هنالك عاملاً مشتركاً أي قاسماً مشتركاً لكلٍ من البسط و المقام و هو $3a^3$.

الآن نقوم بحذف العوامل المتكررة ما بين البسط و المقام :

$$\frac{4 \times \cancel{3} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a \times a \times b}{\cancel{3} \times 3 \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}}$$

القاسم المشترك هو $3a^3$ و هو يساوي $3 \times a \times a \times a$ (المقام) .

بعد اختزال هذا الكسر الجبري عن طريق حذف العوامل التي تتكرر ما بين البسط و المقام فإننا نحصل على الكسر الجبري التالي :

$$\frac{4a^3b}{3}$$

وهذا الكسر الجبري يضم العناصر الغير متكررة التي لم نقم باختزالها و حذفها.

و هي الصيغة المختزلة للكسر الجبري $\frac{12a^{6}b}{9a^{3}}$

3×4 تمثل عملية ضرب عاملي (قاسمي) الرقم 12 .

3×3 هي عملية ضربٍ تجمع بين عاملي (قاسمي) العدد 9 في الكسر الجبري الأصلي.

أحياناً فإن إيجاد عاملٍ (قاسم) مشترك common factor في الكسر الجبري يتطلب منا تحليل الكسر الجبري.

ليكن لدينا الكسر الجبري التالي :

$$\frac{a^{2}+9a-18}{a^{2}-16}=$$

و الذي يمكننا تخصيمه (تقويسه factoring) ليصبح على الشكل التالي :

$$\frac{(a-3)\,(a+6)}{(a-4)\,(a+4)}$$

$$\frac{(a-3)\times(a+6)}{(a-4)\times(a+4)}$$

لا تضع شارة ضرب في الامتحان بين قوسين إنما قد فعلت ذلك لغاية تعليمية لأبين بأن العلاقة بين قوسين متجاورتين هي علاقة ضرب.

"كلمة "قَوْس
مؤنثة في الغالب، ولكن يجوز فيها التذكير أيضاً (مؤنثة، وقد تُذكَّر). هي كلمة "تُذكَّر وتؤنث"، والجمع: أَقْواسٌ، وأَقْوُسٌ، وقِسِيٌّ. مثال على التأنيث: "رمَوْا أَعْداءَهم عن قَوْسٍ واحِدَةٍ."

$$\frac{(a-3)\times(a+6)}{(a-4)\times(a+4)}$$

أتأكد من صحة عملية التخصيم (التقويس) عن طريق ضرب محتويات القوس الأولى بجميع محتويات القوس الثانية :

$$a\times a=a^2$$

$$a\times 6=6a$$

و ليس a6 لأنه لا يجوز في الجبر أن نضع المتغير(الحرف) قبل العامل العددي (العدد) .

$$-3\times a= -3a$$

بخلاف عمليتي الجمع و الطرح فإنه يجوز لنا أن نضرب اي شيء بأي شيء.

$$-3 \times 6=-18$$

سالب × موجب = سالب

عدو (-) صديقك (+) = عدوك (-)

$$6a+3a=9a$$

أقوم بجمع النتائج التي توصلت إليها :

$$a^2+9a-18$$

مقام الكسر الجبري السابق a^2-16 و الذي أصبح بعد التخصيم (التقويس)

$$(a-4)\times(a+4)$$

نتاكد من صحة عملية تخصيم (التقويس) المقام :

$$a\times a=a^2$$

$$a\times -4=-4a$$

و ليس a4- لأنه لا يجوز للمتغير الحرفي أن يتقدم العامل العددي.

موجب × سالب = سالب

صديق (+) عدوك (-) عدوك(-)

$$4\times a=4a$$

$$-4\times 4= -16$$

سالب ×موجب=سالب

عدو(-) صديقك(+) عدوك (-)

$$a^2+ -4a+4a-16$$

a^2 متغير حرفي مرفوعٌ للقوة الثانية لا مثيل له أي ما من متغيرٍ حرفي مماثل مرفوعٍ للقوة الثانية و لذلك نبقيه كما هو .

$$-4a +4a=0$$

حدين متماثلين متساويين متعاكسين في الشارة ناتج جمعهما يساوي صفر.

و بذلك يُصبح لدينا الكسر الجبري التالي :

$$\frac{a^2 + 9a - 18}{a^2 - 16}$$

و هو الكسر الجبري الذي بدأنا به .

جمع و طرح الكسور الجبرية Algebraic fractions

يمكن جمع و طرح الكسور الجبرية من بعضها البعض و لكن يتوجب أولاً توحيد مقامات تلك الكسور الجبرية.

إن القواعد التي تحكم جمع و طرح الكسور الجبرية لا تختلف عن القواعد التي تحكم جمع و طرح الكسور الرقمية numerical fractions .

إذا كان الكسرين الجبريين متماثلين من حيث المقام فيمكن جمعهما أو ضربهما مباشرة ، و لكن إذا كان مقاميهما غير متماثلين فيتوجب علينا أولاً القيام بتوحيد المقامات.

لتكن لدينا عملية الجمع التالية لكسرين جبريين :

$$\frac{3}{a}+\frac{4}{2a}$$

كما ترون فإن **هذين الكسرين الجبريين ذوي مقامين غير متماثلين و لذلك لا يمكننا القيام بجمعهما معاً إلا بعد القيام بتوحيد مقاميهما ، و على اعتبار أن المتغير a يتكرر في كلا هذين الكسرين فإن بإمكاننا أن نجد مقاماً مشتركاً common denominator لهذين الكسرين الجبريين و لذلك فإننا و بكل بساطة نضرب المقام a بالعدد 2 :**

$$2 \times a = 2a$$

دائماً نضع العامل العددي قبل المتغير الحرفي.

نضرب العدد 2 بالمقام a حتى نجعله مماثلاً للمقام الثاني 2a :

$2 \times a = 2a$

و **لكن لا ننسى أن نضرب العدد 2 كذلك ببسط الكسر و ذلك حتى نحافظ على تناسب الكسر الجبري :**

$2 \times 3 = 6$

$2 \times a = 2a$

و بذلك فإننا نحصل على الكسر الجبري التالي :

$$\frac{3}{a} \rightarrow \frac{6}{2a}$$

أي أن الكسر $\frac{3}{a}$ قد أصبح $\frac{6}{2a}$

فتصبح لدينا عملية الجمع التالية :

$$\frac{4}{2a}+\frac{6}{2a}$$

كما مر معنا سابقاً فإننا عند جمع كسرين جبريين نجمع البسطين مع بعضهما البعض بينما نترك المقامين كما هما دون تغيير :

عند جمع كسرين جبريين فإننا نجمع البسطين مع بعضهما البعض بينما نترك المقامين كما هما دون تغيير كما نفعل عند جمع كسرين رقميين اعتياديين.

4+6=10

فيكون ناتج عملية جمع الكسرين الجبريين $\frac{10}{2a}$

إن لم نتمكن من القيام بعملية توحيد مقامي كسرين جبريين بالطريقة السابقة للحصول على مقامٍ موحد فإن بإمكاننا القيام بتوحيد مقامي الكسرين الجبريين عن طريق القيام بضرب مقامي الكسرين الجبريين ببعضهما البعض:

بإمكاننا القيام بتوحيد مقامي الكسرين الجبريين عن طريق القيام بضرب مقامي الكسرين الجبريين ببعضهما البعض.

مثال :

لتكن لدينا عملية الطرح التالية بين كسرين جبريين :

$$\frac{3}{a} - \frac{6}{a+4}$$

كما ترون فإن مقامي هذين الكسرين الجبريين غير متماثلين و لذلك لا يمكننا القيام بعملية الطرح إلا بعد أن نقوم بتوحيد مقاميهما و للقيام بذلك فإننا نضرب مقام الكسر الجبري الأول a+4 بمقام الكسر الجبري الثاني a :

$$a(a+4)$$

$$a \times (a+4)$$

لا تضع في الامتحان أبداً شارة ضرب قبل قوس.

ثم نضرب مقام الكسر الجبري الثاني بمقام الكسر الجبري الأول :

$$(a+4)\ a$$

$$(a+4) \times a$$

فيصبح لدينا الكسرين الجبريين التاليين ذوي المقام المتماثل :

$$\frac{3}{(a+4)a} - \frac{6}{a(a+4)}$$

حتى نحافظ على تناسب هذين الكسرين الجبريين و كما هي العادة فإننا نضرب كذلك بسط كل كسر بمقام البسط الأخر أي أننا نضرب بسط كل كسر بالمقدار ذاته الذي ضربنا به المقام حتى نتمكن من توحيده و هذا المقدار التوحيدي هو بالطبع مقام الكسر الآخر:

$$\frac{3(a+4)}{a(a+4)} - \frac{6a}{a(a+4)}$$

$$\frac{6\times a}{a\times(a+4)} - \frac{3\times(a+4)}{(a+4)\times a} =$$

$$\frac{6a-3(a+4)}{a(a+4)}$$

$$\frac{6\times a-3\times(a+4)}{a\times(a+4)}$$

لا تضع في الامتحان شارة ضرب قبل قوس أو بين عددٍ و متغير حرفي .

$$\frac{6a-3(a+4)}{a(a+4)}$$

و بذلك نكون قد وحدنا مقامي هذين الكسرين الجبريين.

الآن نقوم بتفكيك الأقواس الموجودة في البسط عن طريق تنفيذ العمليات الرياضية المعلقة و هي في البسط تتمثل في ضرب العدد السلبي -3 بمحتويات القوس أي $(a+4)$:

$$-3\times a = -3a$$

سالب × موجب = سالب

$$\mathbf{-3 \times 4 = -12}$$

سالب × موجب = سالب

عدو (-) ×صديقك(+) = عدوك (-)

فنحصل على الكسر الجبري التالي :

$$\frac{6a - 3a - 12}{a(a+4)}$$

ننفذ العمليات الرياضية المعلقة بين الحدود المتشابهة .

كما ترون فإن لدي حدين متشابهين لأن متغيرهما متماثل a و هما الحدين 6a و 3a و بالتالي فإن بإمكاننا أن نطرحهما من بعض :

$$\mathbf{6a - 3a = 3a}$$

و بالتالي يصبح الكسر الجبري على الصورة التالية :

$$\boldsymbol{\frac{3a - 12}{a(a+4)}}$$

لا تنسى أن تضرب بسط كل كسرٍ جبري بالقيمة ذاتها التي ضربت بها المقام أي مقام الكسر الثاني حتى نحافظ على تناسب الكسر الجبري.

لا أمس مقام الكسر الجبري بعد توحيده

ضرب و قسمة الكسور الجبرية Algebraic Fraction

ضرب و قسمة الكسور الجبرية التي تحتوي على متغيرات حرفية .

لتكن لدينا عملية ضرب الكسور الجبرية التالية :

$$\frac{b}{6c} \times \frac{4b}{6}$$

لتنفيذ عملية الضرب فإننا نضرب البسطين ببعضهما البعض كما نضرب المقامين ببعضهما البعض :

$$\frac{4b \times b}{6 \times 6c}$$

الحد b يعني $1b$

$$b=1b$$

$$4b\times 1b=4b\times 1b=4b^2$$

لاحظ كيف أن ناتج ضرب المتغير الحرفي b بنفسه قد أدى إلى رفعه لقوة الثانية :

$$b\times b=b^2$$

$$6\times 6c=36c$$

فيصبح ناتج الضرب :

$$\frac{4b^2}{36c}$$

تذكر بأنه يمكن ضرب أي شيءٍ بأي شيء و ذلك بخلاف عمليتي الجمع و الطرح حيث لا يمكن جمع أو طرح إلا القيم التي يكون متغيرها الحرفي متماثلاً شريطة أن لا تكون متغيراتها (أحرفها) مرفوعةً لقوتين مختلفتين.

قسمة الكسور الجبرية

لقسمة كسرين جبريين فإن علينا أن نجد مقلوب reciprocal هذا الكسر و ذلك ببساطة عن طريق قلب الكسر رأساً على عقب .

نقلب المقسوم عليه (الكسر الثاني) ونضرب به الكسر الأول لأن القسمة على كسر تُكافئ الضرب في مقلوبه.

لتكن لدينا عملية ضرب الكسور التالية :

$$\frac{4b}{6} \times \frac{b}{6c}$$

نضرب البسطين ببعضهما البعض كما نضرب المقامين ببعضهما البعض :

$$\frac{4b \times b}{6 \times 6\,c}$$

الحد b يعني 1b

$$4b\times b=4b\times 1b=4b^2$$

$$6\times 6c=36\ c$$

فيصبح ناتج عملية الضرب $\frac{4b^2}{36\ c}$

تذكر بأن جميع الحدود يمكن ضربها ببعضها البعض و ذلك بخلاف عمليتي الجمع و الطرح حيث لا يمكن جمع أو طرح إلا الحدود المتشابهة و أي الحدود التي تكون متغيراتها الحرفية متماثلة.

قسمة الكسور الجبرية

لقسمة كسرٍين جبريين فإن علينا أن نجد مقلوب reciprocal ذلك الكسر عن طريق قلب الكسر رأساً على عقب.

$$\frac{4b}{6}\div\frac{b}{6c}$$

لإجراء عملية القسمة نقوم بقلب الكسر الثاني (المقسوم عليه) رأساً على عقب يصبح على الشكل التالي :

$$\frac{6c}{b}$$

ثم نجري عملية ضرب بدلاً من القسمة فتتحول عملية القسمة السابقة إلى الشكل التالي:

$$\frac{4b}{b} \times \frac{6c}{b}$$

$$\frac{4b \times 6c}{b \times b}$$

نقوم بضرب البسط مع البسط و المقام مع المقام :

$$4b\times 6c=24bc$$

$$4\times 6=24$$

$$b\times c=bc$$

ليصبح ناتج قسمة هذين الكسرين :

$$\frac{24bc}{b\text{^}2}$$

$$b\text{^}2=b^2$$

الخطوة الأخيرة هي محاولة اختزال الكسر الجبري إذا كان ذلك مُمكناً.

لضرب كسرين جبريين ببعضهما البعض فإننا نضرب البسطين ببعضهما البعض كما نضرب المقامين ببعض .

لقسمة كسرين جبريين على بعضهما فإننا نضرب الكسر الأول بمقلوب الكسر الثاني .

تذكر دائماً بأن عملية الضرب بكسر هي في الحقيقة عملية قسمة بينما عملية القسمة على كسر هي في الحقيقة عملية ضرب.

يوصى باختزال و تبسيط الكسور الجبرية المعقدة قبل القيام بضربها أو قسمتها على بعضها البعض.

الصيغ الرياضية Formulas

الصيغة عبارة عن علاقة رياضية ثابتة بين قيمتين أو أكثر و غالباً ما تستخدم الصيغ الرياضية لكشف قيمة مجهولة بالاعتماد على قيمة معلومة .

تستخدم الصيغة أو المعادلة التالية لإيجاد محيط الدائرة إذا علمنا نصف قطرها radius .

$$C=2\ \pi r$$

محيط الدائرة circumference اي C هو موضوع المعادلة .

محيط الدائرة C يساوي 2 ضرب الثابت باي π ضرب نصف القطر r .

انتبه إلى أن معادلة حساب محيط الدائرة لا تحوي عنصراً مرفوعاً للقوة الثانية بخلاف معادلة حساب مساحة الدائرة.

يمكننا أن نقلب المعادلات الرياضية و الفيزيائية بحيث نجعل أي عنصرٍ من عناصرها موضوعاً لتلك المعادلة و ذلك حتى نتمكن من معرفة قيمة ذلك العنصر طالما بقِيت تلك المعادلة متزنة (متوازنة) ، أي طالما حافظنا على التوازن و التساوي بين طرفيها.

يتم عزل موضوع (مجهول) المعادلة عن طريق إعادة ترتيب عناصر المعادلة بشكلٍ معاكس .

أي تعديلٍ أو إعادة ترتيب للعمليات و العناصر نجريه على احد طرفي المعادلة يجب أن نجريه كذلك على طرفها الآخر.

طريقة إزالة حدٍ ما من معادلة

تتمثل إحدى طرق حذف عنصرٍ ما من عناصر المعادلة في طرح ذلك العنصر من كلا طرفيها ، و هذه الطريقة تتيح لنا حذف العنصر الذي نريد التخلص منه من خلال طرحه من عنصرٍ مماثلٍ له في القيمة لتكون نتيجة طرح متماثلين هي الصفر و سوف نرى ذلك لاحقاً بالتفصيل.

لتكن لدينا **معادلة تحويل درجات الحرارة من فهرنهايت إلى سيليس يوس** :

$$F=1.8\ C+32$$

نريد أن نحذف الرقم 32 من الطرف الأيمن و أن ننقله إلى الطرف الأيسر للمعادلة دون أن يختل توازنها :

$$F=1.8C+32$$

فكيف نفعل ذلك؟

إننا سوف نطرح الرقم 32 من الرقم 32 الموجود في الجهة اليمنى كما سوف نطرح الرقم 32 من العنصر F :

$$F-32=1.8C+32-32$$

نجري عملية الطرح المعلقة في الجهة اليمنى :

$$32-32=0$$

$$F-32=1.8C+32-32$$

$$+32-32=0$$

قيمتين متماثلتين متعاكستين في الشارة مجموعهما صفر.

و بذلك نكون قد تخلصنا من الرقم 32 في الميمنة ، كما نكون باستخدام هذه الطريقة قد نقلنا الرقم 32 إلى الميسرة لتصبح المعادلة على الصورة التالية :

$$F-32=1.8C$$

و بذلك نكون قد نقلنا العنصر 32 من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى دون أن يختل التوازن بين طرفي المعادلة.





كيف فعلنا ذلك ؟

$$25-15+10$$

نقوم بنقل الرقم 10 من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر عن طريق طرحه من كلا طرفي المعادلة :

$$25-10=15+10-10$$

$$10-10=0$$

$$25-10=15+10-10$$

$$25-10=15$$

ما زالت المعادلة متوازنة كما ترون .

نعود لمعادلتنا السابقة :

$$F-1.8C+32$$

لتصبح معادلتنا السابقة على الشكل التالي :

$$F-32=1.8C$$

طبعاً ما زالت المعادلة متوازنة أي ما زال طرفيها متساويين متماثلين .

علينا أن نتذكر بأنه يتوجب علينا أن نجري العملية ذاتها على كلا طرفي المعادلة.

$$F-32=1.8C$$

نجري عملية معاكسة للعملية الجارية على كلا طرفي المعادلة ، ففي البداية كانت لدي عملية جمع في ميمنة المعادلة :

$$F=1.8\,C+32$$

و قد قمت بعكس عملية الجمع حيث قمت بإجراء عملية طرح على كلا طرفي المعادلة على العنصر ذاته الذي كان موضوع عملية الجمع أي 32 :

$$F-32=1.8C+32-32$$

و الآن نعود إلى معادلتنا السابقة $F-32=1.8C$

كما ترون فإن لدينا عملية ضرب في ميسرة المعادلة $1.8C$ أي $1.8\times C$ و

لحلحلة هذه المعادلة قدماً فإننا نجري عملية معاكسة لعملية الضرب و هي عملية القسمة حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على 1.8 لتصبح لدينا عملية القسمة التالية :

$$\frac{F-32}{1.8}=\frac{1.8C}{1.8}$$

تتيح لنا عملية القسمة في الكسر الثاني $\frac{1.8C}{1.8}$ التخلص من كلا العنصرين 1.8 :

$$\frac{F-32}{1.8}=\frac{\cancel{1.8}C}{\cancel{1.8}}$$

تصبح لدينا العلاقة التالية $\frac{F-32}{1.8}=C$

كيف فعلت ذلك ؟

لتكن لدينا العملية التالية :

$$\frac{44-4}{2}=\frac{2\times 20}{2}$$

نحذف العنصرين المتماثلين في الكسر :

$$\frac{44-4}{2}=\frac{2\times 20}{2}$$

$$\frac{44-4}{2}=20$$

$$44-4=40\div 2=20$$

و بالعودة إلى معادلتنا الأساسية فإنني أكون قد حصلت على المعادلة التالية :

$$C=\frac{F-32}{1.8}$$

يمكننا كتابة موضوع أو مجهول المعادلة المطلوب إيجاده في الجهة اليسرى بدلاً من الجهة اليمنى لتصبح المعادلة على الصورة التالية:

$$C=\frac{F-32}{1.8}$$

ماذا أفعل بهذه المعادلة ؟

إذا وضعنا بدلاً من رمز الفهرنهايت أي F أي درجة حرارة مقاسة بوحدة الفهرنهايت فسوف نحصل على المكافئ لها بالدرجة المئوية.

مثال :

كم تبلغ 40 درجة فهرنهايت على مقياسٍ مئوي ؟

لحل هذا المسالة استخدم المعادلة السابقة :

$$C=\frac{F-32}{1.8}$$

استبدل الرمز بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$C=\frac{40-32}{1.8}$$


40-32=8

$$8 \div 1.8 = 4.444....°C$$

نتأكد من الحل عن طريق محول الآلة الحاسبة (محول وحدات القياس) :

4.444....°C

الحل صحيح 100%



الدالات Functions

الدالة f عبارة عن تعبير رياضي يتخذ قيمة إدخال معينة كرقمٍ ما و بعد ذلك تتم معالجة تلك المدخلة وفقاً لقاعدةٍ ما لتعطيناً ناتجاً أو مخرجاً معيناً و غالباً ما يشار للدالة بالشكل f(x) .

مثال : في كل عملية رياضية يكون لدينا مدخلة معينة و لتكن مثلاً العدد 7 ، و بعد مرحلة الإدخال يصل العدد إلى المرحلة العملياتية function حيث يتم إجراء عملية أو سلسلة عمليات على تلك المدخلة مثل إضافة أو طرح قيمة ما مثلاً إلى تلك المدخلة ، و بعد المرحلة العملياتية function تكون هنالك مرحلة الإخراج حيث نحصل على نتيجةٍ ما و هي عبارة عن تعديلٍ ما يطرأ على تلك المدخلة في المرحلة العملياتية و بالتالي فإن الصيغة =f(x) تعني : (إن العمليات التي سوف تخضع لها المدخلة x هي عملية طرح مثلاً أو جمع أو ضرب او أي شيءٍ آخر.

أي ان x هي المدخلة او المادة الأولية التي سوف تقوم المرحلة العملياتية f بمعالجته و إخضاعه لسلسلة معينة من العمليات الرياضية .

إن الأمر يشبه تماماً مصنع يقوم بمعالجة المواد الأولية فالمادة الأولية هي المدخلة x بينما العمليات التي تجرى على تلك المادة الأولية فهي الدالة العملياتية f و بعد خضوع تلك المادة الأولية لسلسلة عملياتٍ رياضية فإننا نحصل على ناتج معين.

مثال :

$$f(x)=\frac{a+20}{7}$$

f(x) إن العمليات التي سوف تخضع لها المدخلة x هي ...

الدالة العملياتية f لها مدخل و مخرج.


الدالة العملياتية f هي عبارة عن آلة نقوم بمعالجة مدخلات معينة لتنتج مخرجاتٍ معينة.

الصيغة العامة للدالة العملياتية هي f(x) حيث x هي قيمة المدخلة أو قيمة المتغير :

$$f(x)=x+2=3$$


فإذا كان المتغير x يساوي مثلاً 8 فإن العلاقة العملياتية السابقة تصبح على الصورة التالية :


$$f(8)=8+2-3=7$$



الدالات المعاكسة Inverse functions

كما مر معنا فإن **للدالة العملياتية f مدخل و مخرج b فإذا علمنا قيمة مخرجة الدالة العملياتية أي نتيجتها و أردنا ان نحسب قيمة المدخلة x اعتماداً على قيمة المخرجة أو قيمة النتيجة فإننا نجري عمليةً معاكسةً تماماً للعملية الأصلية و هذه العملية المعاكسة تدعى بالدالة العملياتية المعاكسة inverse function .**





إذاً فإن الدالة العملياتية (f) تشير إلى عملية معالجة المدخلات وفق الاتجاه الطبيعي ، أما إذا جرت العملية أو العمليات بطريقةٍ معاكسة (دالة عملياتية عكسية) فإننا ندعوها عندها بالدالة العملياتية العكسية inverse function أي f مرفوعة لقوة السلبية الثانية f^{-2} .

إن استخدام الدالة العملياتية العكسية f^{-2} يكشف لنا المدخلة الأصلية التي تم إدخالها إلى العملية.


f^{-2} هي الدالة العملياتية المعاكسة للدالة الأصلية و هي تستخدم لكشف قيمة مدخل تلك العملية و ليس نتيجتها.

نستخدم الدالة العملياتية العكسية f^{-2} عندما تكون مدخلة العملية مجهولة و ليس ناتجها.


دُعيت الدالة العكسية بهذا الاسم لأننا لكشف قيمة المدخلة نُجري العمليات الرياضية بصورةٍ عكسية.

الدالات العملياتية المركبة Composite functions

نعني بالدالات العملياتية المركبة أن نجعل ناتج و مخرج الدالة العملياتية (f) الأولى مُدخلاً input لدالة عملياتية ثانية و هذا ما ندعوه بالدالة العملياتية المركبة.



مثال على الدلات العملياتية المركبة ما ندعوه بالتشفير المتعدد الطبقات حيث نقوم بتشفير مجموعة بيانات ثم ندخل تلك البيانات بعد تشفيرها في عملية تشفيرٍ ثانية (تشفير التشفير) و ذلك لزيادة قوة التشفير.



تشبه الدالة المركبة آلةً تقوم أولاً بتنفيذ العملية a ثم تقوم لاحقاً بتنفيذ العملية b .

إن الدالات العملياتية المركبة تضم عمليتين أو أكثر بحيث تكون نتيجة أو مخرج إحدى هاتين العمليتين مدخلاً input لعملية اخرى ، حيث يتم إنجاز العملية a قبل العملية b .

إن تسمية الدالة العملياتية المركبة تبين لنا أي العمليتين تتم معالجتها أولاً و لذلك فإن ترتيب رموز هذه العملية شديد الأهمية.

الرفع للقوة Power ,Exponents,Indices

عندما نضرب عدداً ما بنفسه فإننا نقول عندها بأنا قد قمنا برفع هذا العدد لقوةٍ معينة .

يدعى الرفع للقوة الثانية بالتربيع و هو يعني ضرب العدد بنفسه مرةً واحدة (و ليس مرتين) ، بينما يدعى الرفع للقوة الثالثة بالتكعيب و هو يعني ضرب العدد بنفسه مرتين اثنتين (و ليس ثلاث مرات) ، اما الأعداد المرفوعة لقوةٍ أعلى من القوة الثالثة فتدعى بالقوى العليا higher power ، أي أن القوى العليا تمثل الأعداد التي يتم رفعها لقوة أعلى من القوة الثالثة (التكعيب) ، أي الأعداد التي يتم ضربها بنفسها أكثر من مرتين اثنتين.

عند رفع الرقم عشرة 10 لقوةٍ معينة فإن تلك القوة التي نرفع إليها الرقم عشرة تشير إلى عدد الأصفار :

مثال الرقم مليون تمثله القوة 10^6 أي عشرة مرفوعة للقوة السادسة ، و القوة السادسة تلك تشير إلى عدد أصفار الرقم مليون (6 أصفار) 1000000 ، كما تدل القوة السادسة على أننا قد ضربنا الرقم عشرة بنفسه خمس مرات (و ليس ست مرات) .

$$10\times10\times10\times10\times10\times10$$

العبرة في عدد شارات الضرب و ليس في عدد العناصر المضروبة ببعضها.

$10\times10=100$

$100\times10=1000$

$1000\times10=10000$

$10000\times10=100000$

$100000\times10=1000000$

$$10^2$$

عشرة مرفوعة للقوة الثانية تعني عشرة مضروبة بنفسها مرة واحدة 10×10 أي مئة حيث تشير القوة الثانية إلى عدد أصفار المئة ، كما تشير إلى أن هنالك عشرتين مضروبتين ببعضهما البعض.

10^3

عشرة مرفوعة للقوة الثالثة تعني ألف 1000 حيث تشير القوة الثالثة إلى عدد أصفار الألف التي هي بالطبع ثلاثة اصفار، كما تشير القوة الثالثة إلى ان هنالك ثلاث عشرات مضروبة ببعضها البعض مرتين (و ليس ثلاث مرات) :

$$10\times10\times10=1000$$

العبرة دائماً في عدد شارات الضرب و ليس في عدد العناصر المضروبة ببعضها.

الجذور ROOTS و التجذير

التجذير هو العملية المعاكسة لعملية الرفع للقوة فالتجذير التربيعي هو العملية المعاكسة لعملية التربيع أي الرفع للقوة الثانية و التجذير التكعيبي هي العملية المعاكسة للتكعيب أي الرفع للقوة الثالثة و هكذا.

إن العملية المعاكسة للتربيع أي الرفع للقوة الثانية هي عملية التجذير التربيعي أي إيجاد الجذر التربيعي Square root و العملية المعاكسة لعملية التكعيب هي عملية التجذير التكعيبي cube root .

الجذر التربيعي لرقمٍ ما هو الرقم الذي عندما يتم تجذيره فإنه ينتج القاسم الأصلي لذلك الرقم ، أي العدد الذي ينتج عند تربيعه ذلك الرقم .

مثال :

الجذر التربيعي للرقم 16 هو العدد 4 و عند تربيع العدد 4 اي عند رفعه للقوة الثانية أي عند ضربه بنفسه مرة واحدة فإنه ينتج الرقم 16 .

$$4^2=4\times4=16$$

$$\sqrt{16}=4$$

الجذور التكعيبية cube roots

الجذر التكعيبي cube root لرقم ما هو العدد الذي إذا قمنا بتكعيبه أي إذا قمنا برفعه للقوة الثالثة أي إذا ضربناه بنفسه مرتين فإنه ينتج ذلك الرقم.

العدد 5 هو الجذر التكعيبي للرقم 125 :

$$\sqrt[3]{125}=5$$

$$5^3=5\times5\times5=125$$

العدد 5 هو الجذر التكعيبي للرقم 125 .

التكعيب او الرفع للقوة الثالثة هو ضرب العدد بنفسه مرتين (و ليس ثلاث مرات) .

معظم الجذور التربيعية و التكعيبية هي أرقام عشرية معقدة.

الجذر التربيعي للرقم 16 هو 4

$$\sqrt{16}=4$$

$$4\times4=16$$

$$16=4^{2}$$

الجذر التربيعي للرقم 216 هو 6

$$\sqrt{216}=6$$

لحساب الجذر التربيعي لرقمٍ ما على الآلة الحاسبة فإننا ندخل الرقم ثم نضغط زر حساب الجذر التربيعي

$^{2}\sqrt{}$ أو $\sqrt{}$

لحساب الجذر التكعيبي فإننا ندخل الرقم المراد حساب جذره التكعيبي ثم نضغط زر حساب الجذر التكعيبي

$$^{3}\sqrt{}$$

لحساب جذرٍ أعلى من من الجذر التكعيبي $^{3}\sqrt{}$

ندخل الرقم

نضغط زر حساب الجذر الغير محدد $\sqrt[Y]{}$

نضغط الزر الذي يمثل ذلك الجذر الذي نريد حسابه و ليكن مثلاً 5 لحساب الجذر الخماسي لرقمٍ ما.

$$\sqrt[Y]{}$$

القوة السلبية Negative Power

كما أن رفع رقمٍ لقوةٍ إيجابية positive power يدل على عملية ضرب مكررة لذلك الرقم فإن رفع العدد لقوةٍ سلبية تشير إلى عملية قسمة مكررة.

فهم القوة السلبية

$$8^{-2}=0.015625$$

$$8^{-2}=\frac{1}{8^2}=\frac{1}{64}$$

$$=0.015625$$

لدينا هنا العدد 8 المرفوع للقوة السلبية الثانية -2

يساوي هذا العدد ذاته مرفوعاً للقوة الإيجابية ذاتها إذا جعلناه مقاماً للبسط واحد.

نحسب قيمة الرقم المرفوع لقوةٍ سلبية عن طريق تفكيكه كما نحسب قيمة ذلك الرقم بأن نجعل منه مقاماً لبسطٍ قيمته واحد 1 بعد جعل قوته قوةٍ إيجابية.

بعد جعل الرقم المرفوع لقوةٍ سلبية مقاماً للبسط 1 لا تنسى أبداً تحويل قوته السلبية إلى قوة إيجابية.

$$5^{-5} = 0.00032$$

$$\frac{1}{5^{5}} = \frac{1}{3125} = 0.00032$$

$$4^{-2} = 0.0652$$

$$\frac{1}{4^{2}} = \frac{1}{16} = 0.0652$$

القوة صفر Zero power

ماذا يعني رفع أي عددٍ للقوة صفر ؟

إن رفع أي عددٍ للقوة صفر يعني قسمة ذلك العدد على نفسه ، و بالطبع فإن ناتج قسمة أي عددٍ على نفسه يعطي العدد 1 :

$$X^0 = \frac{X}{X} = 1$$

تنطبق هذه القاعدة على جميع الأعداد باستثناء الصفر

$$X^0 = X \div X = 1$$

إن رفع أي قيمة أو عدد للقوة صفر (باستثناء الصفر) فإن النتيجة تكون واحد لأن ذلك يعني قسمة تلك القيمة أو ذلك العدد على نفسه .

ماذا يعني رفع أي قيمة للقوة الأولى؟

إن ذلك يعني ضرب القيمة بنفسها ثم قسمتها على نفسها و بذلك تكون النتيجة تلك القيمة ذاتها.

لماذا نقسم النتيجة على نفسها؟

لأننا إذا رفعنا تلك القيمة للقوة الأولى فذلك يعني بأننا ضربنا تلك القيمة بنفسها مرةً واحدة :

$X^1 = X \times X$

و ماذا سوف تكون نتيجة ضرب تلك القيمة بذاتها؟

إنها ستكون حتماً تلك القيمة مرفوعةً للقوة الثانية X^2 و ليس للقوة الأولى.

إن أي رفعٍ للقوة يعني ضرب القيمة بذاتها عدداً معيناً من المرات و لذلك حتى لا تصبح تلك القيمة مرفوعةً للقوة الثانية فإننا نقسم نتيجة الضرب على نفسها :

$$X^{1}=X\times X\div X=X$$

$$X^{1}=\frac{X\times X}{X}=X$$

$$X^{1}=\frac{(X)(X)}{X}=X$$

$$2^{1}=2\times 2=4\div 2=2$$

أما رفع العدد للقوة الثانية فإنه لا يعني ضربه بنفسه مرتين اثنتين و إنما فإن ذلك يعني ضربه بنفسه مرةً واحدةً فقط :

$$X^{2}=X\times X$$

العبرة في عدد شارات الضرب و ليس في عدد العناصر التي نضربها ببعضها البعض لأننا إذا ضربنا قيمةً بنفسها مرتين اثنتين فإننا لا نكون بذلك قد رفعناها لقوة الثانية و إنما فإننا نكون بذلك قد رفعناها للقوة الثالثة :

$$X\times X\times X=X^{3}$$

تذكر دائماً بأن العبرة في عدد شارات الضرب و ليس في عدد العناصر المضروبة ببعضها البعض فالرفع للقوة الثالثة لا يعني ضرب القيمة بنفسها ثلاث مرات و إنما فإن ذلك يعني ضربها بنفسها مرتين.

و العبرة دائماًً بعدد شارات الضرب و ليس بعدد العناصر ، و كما ترون فإننا عند رفع قيمةٍ للقوة الثالثة يكون لدينا شارتي ضرب اثنتين فقط و ليس ثلاث شارات و هكذا دواليك بالنسبة لبقية القوى.

+

قسمة و ضرب القوى

قوانين الرفع للقوى - The exponent laws

The law of indices

ضرب القوى ببعضها البعض :

إن ضرب عنصرين متماثلين مرفوعين لقوتين ببعضهما البعض يساوي ذلك العنصر مرفوعاً لقوةٍ تساوي مجموع تلك القوى .

مثال :

$$3^4 \times 3^3 = 3^{4+3} = 3^7$$

$$3^7 = 2187$$

$$3^3 = 27$$

$$3^4 = 81$$

هل ناتج ضرب القوتين الثالثة و الرابعة يساوي 2187 ؟

نضرب ناتجي تفكيك هاتين القوتين ببعضهما البعض :

$$27 \times 81 = 2187$$

النتيجة ذاتها .

إذاً فإن ناتج جمع قوتين مع بعضهما البعض يساوي ناتج ضربهما ببعضهما البعض بعد تفكيك قوتيهما.

$$X^2 \times X^3 = X5$$

$$X^{2}\times X^{3}=X^{2+3}=X^{5}=$$

$$X\times X\times X\times X\times X=X^{5}$$

$$X^{2}\times X^{3}=X^{2+3}=X^{5}$$

ناتج ضرب القوى ببعضها البعض يساوي ناتج جمع تلك القوى مع بعضها البعض.

قسمة القوى

إن قسمة عدة عناصر متماثلة مرفوعةٌ لقوى تساوي نتيجة طرح تلك القوى من بعضها البعض .

$$4^{5} \div 4^{2} = 4^{(5-2)} = 4^{3}$$

$$4^{5} = 1024$$

$$4^{2} = 16$$

$$1024 - 16 = 1008$$

$$4^{5} \div 4^{2} = 4\times4\times4\times4\times4 - 4\times4 = 1008$$

$$(X)^{a} \div (X)^{b} = (X)^{a-b}$$

انتبه جيداً

في كلٍ من عمليتي ضرب و قسمة القوى بالطريقة السابقة يجب أن تكون العناصر المرفوعة لتلك القوى متماثلة تماماً سواءً أكانت رموزاً او أعداداً.

رفع القوة لقوة Rising a power to a power

مثال :

$$(5^4)^3 = 5^{4 \times 3}$$

لحساب قيمة قوة مرفوعة لقوةٍ أخرى فإننا ببساطة نضرب القوتين ببعضهما البعض .

يمكن حساب القوى السلبية بالطريقة ذاتها .

$$(5^4)^3 = 5^4 \times 5^4 \times 5^4$$

$$(5^4)^3 = 5^4 \times 5^4 \times 5^4$$

$$(5^4)^3 = 244\ 140\ 625$$

$$625 \times 625 \times 625 = 244\ 140\ 625$$

النتيجة واحدة


$$(5^4)^3 = 5^{4\times3} = 5^{12}$$

$$5^{12} = 244\ 140\ 625$$

$$(X^a)^b \quad (X^a)^b = X^{ab} = X^{a\times b}$$

ما هو ناتج قسمة :

$$(4\times4^{6}\times4^{-2})^{3}\div4^{2}$$



تمهل و اعط الأولوية

- **اعْطِ (بكسر الطاء دون ياء :**(فعل أمر للمفرد المذكر (أنتَ)، مبني على حذف حرف العلة.
- **أعْطي (بكسر الطاء والياء :**(فعل أمر للمفردة المؤنثة (أنتِ)، مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة.

كما مر معنا سابقاً في بحث أولويات إنجاز العمليات الرياضية فإننا نبدأ بتفكيك الأقواس ذلك أن تفكيك الأقواس و تنفيذ العمليات الرياضية المحصورة بين قوسين هو العملية ذات الأولوية العليا :

$$(4\times4^{6}\times4^{-2})^{3}\div4^{2}$$

نقوم بدايةً بحساب القيم المحصورة بين قوسين :

$$(4\times4^{6}\times4^{-2})$$

و كما مر معنا سابقاً فإن **ناتج ضرب عدة قوى متماثلة (مثل الأربعات هنا 444) يساوي ناتج جمع تلك القوى مع بعضها البعض :**

$$(4\times4^{6}\times4^{-2})=4^{1}+4^{6}+4^{-2}=4^{5}$$

$$(4^{1}\times4^{6}\times4^{-2})=4^{5}$$

$$1+6=7$$

$$7-2=5$$

و الآن ننتقل إلى تنفيذ العملية الثانية من حيث الأولوية و هي عملية الرفع للقوة ، و كما ترون فإن القوس مرفوعةٌ للقوة الثالثة ، أي أننا سوف نحصل على :

$$(4^{5})^{3}=4^{5}\times3=4^{15}$$

الآن ننتقل لإنجاز عملية القسمة :

$$4^{15}\div4^{5}$$

و كما مر معنا سابقاً فإن **عملية قسمة قوتين متماثلتين على بعضهما البعض تساوي ناتج طرح تلك القوتين من بعضهما البعض**:

$$4^{15}\div4^{5}=4^{15-5}=4^{10}$$

و الآن فإن **الخطوة الأخيرة التي يتوجب القيام بها تتمثل في تفكيك القوة** 4^{10}

$$4^{10}=1048576$$

القوى الكسرية

Fractional Powers

يمكن للقوى أن تكون كسوراً مثل $X^{1/2}$.



إن رفع عددٍ ما إلى قوةٍ مقامها العدد 2 مثل $5^{1/2}$ **فإن ذلك يماثل إيجاد الجذر التربيعي لذلك الرقم**

$$5^{1/2}=5^{0.5} = 2.23606\ldots$$

$$\sqrt{5} =2.23606$$



إياك في أي امتحان أن ترفع أي قيمة لقوة هي عبارة عن رقم عشري كما فعلت أنا و إنما قد فعلت ذلك لغاية تعليمية توضيحية لأبين لك كيف تحسب قيمة عددٍ مرفوعٍ لقوة كسرية على الحاسبة لأن قيمة الكسر نصف تساوي 1 تقسيم 2 تساوي 0.5 .

$$\mathbf{5^{0.5}}$$

إن رفع رقمٍ ما إلى قوة مقامها العدد 3 مثل $6^{1/3}$ فإن ذلك يماثل إيجاد الجذر التكعيبي لذلك الرقم :

$$6^{1/3} = 6^{0.333\ 333\ldots} = 18160356359$$

$$\sqrt[3]{6} = 18171$$

تقريباً فإن النتيجتين متساويتين .



لا تقم في الامتحان بوضع قوة على شكل رقم عشري مثل $5^{0.5}$ أو $6^{0.333\ 333}$

لأن ذلك لا يصح.

حصلت على تلك الأرقام العُشرية بقسمة بسط الكسر على مقامه لأنها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من التعامل مع الكسور في الآلات الحاسبة المتوفرة و قد فعلت ذلك لغاية تعليمية.

إذاً فإن **رفع قيمةٍ ما لقوةٍ كسرية مقامها 2 فإن ذلك يعادل الجذر التربيعي لذلك الرقم أما رفع قيمة ما لقوةٍ كسرية مقامها العدد 3 فإن ذلك يساوي الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$ لتلك القيمة** .

$$X^{1/2} = \sqrt[2]{X}$$

$$X^{1/3} = \sqrt[3]{X}$$

و كما مر معنا سابقاً فإن ناتج ضرب قوتين كسريتين متماثلتين يساوي ناتج جمع هاتين القوتين الكسريتين مع بعضهما البعض :

$$5^{1/2} \times 5^{1/2} = 5^{1/2+1/2} = 5^{1} = 5$$

إن ناتج ضرب هاتين القوتين الكسريتين ببعضهما البعض يساوي ناتج جمع هاتين القوتين مع بعضهما البعض :

نصف + نصف = واحد

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

و بالطبع فإن **العدد 5 مرفوعٌ لقوةٍ كسرية مقامها العدد 2 أي أن قيمة العدد 5 قد اصبحت مساويةًُ للجذر التربيعي للعدد 5 .**

$$5^{1/2} = 5^{0.5} =$$

$$2.2360679775$$

$$^{2}\sqrt{5} =$$

$$= 2.2360679775$$

$$\sqrt{}$$

النتيجة متماثلة.

عندما لا نجد شارة على علامة الجذر √ فذلك يعني بانه جذرٌ تربيعي $^{2}\sqrt{}$.

إن رفع أي قيمة إلى قوةٍ كسرية تساوي نصف تماثل إيجاد الجذر التربيعي لتلك القيمة أما رفع أي قيمة إلى قوة كسرية مقامها ثلث فإن ذلك يماثل إيجاد الجذر التكعيبي لتلك القيمة.

في جميع الحالات السابقة فإن بسط القوة الكسرية يجب أن يكون العدد واحد .

أي قيمة مرفوعة إلى قوة كسرية فإن تلكتلك القوة الكسرية **تساوي جذر تلك القيمة:**

أي قيمة مرفوعة إلى قوة كسرية **$X^{1/n}$ تساوي جذر تلك القيمة $^{n}\sqrt{x}$**

$$X^{1/n} = {}^{n}\sqrt{x}$$

حسب مقام القوة الكسرية n يكون الجذر n *فإذا كان المقام 2 كان الجذر جذراً تربيعياً و إذا كان المقام 3 كان الجذر جذراً تكعيبياً.*

القيمة المرفوعة لقوةٍ كسرية تساوي نصف $X^{1/2}$ فإنها تُماثل الجذر التربيعي لتلك القيمة :

$$X^{1/2}=\sqrt[2]{x}$$

القيمة الكسرية المرفوعة لكسر يساوي ثلث $X^{1/3}$ تماثل الجذر التكعيبي لتلك القيمة $\sqrt[3]{x}$

$$X^{1/3}=\sqrt[3]{x}$$

ناتج ضرب القوى المتماثلة ببعضها البعض يماثل ناتج جمع تلك القوى مع بعضها

$$6^{1/3}\times6^{1/3}\times6^{1/3}=6^{1/3+1/3+1/3}=6^{1}=6$$

كم تساوي 6 مرفوعة لقوة كسرية تعادل $\frac{1}{3}$ ثلث

$$\frac{1}{3} = 0.333$$

$$6^{1/3} = 6^{0.333} = 1817$$

الآن نحسب الجذر التكعيبي للعد 6

$$\sqrt[3]{6} = 1817$$

النتيجتين متماثلتين

حساب الجذر على الآلة الحاسبة

زر حساب الجذر التربيعي $\sqrt[2]{}$ هو الزر $\sqrt{}$.

إن لم تجد أي شيء على علامة الجذر فذلك يعني بأنه جذرٌ تربيعي.

زر حساب الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$

$\sqrt[3]{x}$

في حاسبات الأجهزة الذكية قد نحتاج لضغط زر التبديل للمستوى الثاني 2^{nd} حتى تظهر لنا مجموعة ثانية من الأزرار الافتراضية التي تتضمن زر حساب الجذر التكعيبي.

القوى المختلطة MIXED POWER

رفع عددٍ ما لقوةٍ كسرية *fractional power* بسطها أكبر من واحد .

إن رفع عددٍ ما لقوةٍ كسرية بسطها أكبر من واحد مثل القوة الكسرية ثلثين مثلاً $\frac{2}{3}$ فإنها تساوي الجذر التكعيبي لتلك القيمة ضرب بسط القوة الكسرية أي 2 ، أي أنها تساوي تلك القيمة مرفوعةً للقوة ثلث $\frac{1}{3}$ ضرب *2* .

لأنه و كما ذكرت سابقاً فإن رفع قيمة ما للقوة الكسرية ثلث $\frac{1}{3}$ يساوي الجذر التكعيبي لتلك القيمة ، أما الضرب بالعدد 2 فهو يعني تحويل الثلث إلى ثلثين .

بعد أن نستخرج جذر العدد وفقاً للمقام بالطريقة التي ذكرتها سابقاً فإننا نضرب النتيجة بالبسط لأنه ليس واحد.

مثال :

$$\frac{2}{3} = 2 \div 3 = 0.6666666667$$

$$9^{2/3}=4.367487112$$

$$9^{2/3}=9^{1/3\times 2}=9^{1/3+1/3}=9^{2/3}$$

إن ضرب قوتين كسريتين متماثلتين يساوي ناتج جمع هاتين القوتين مع بعضهما البعض.

$$9^{1/3}= {}^{3}\sqrt{9^{0.333333333}} = 1.2765180067$$

$$9^{2/3}=9^{1/3\times 2}=9^{1/3+1/3}=9^{2/3}$$

$$(\sqrt[3]{9^{0.333333333)}}\ )^2=$$

يعني بعد أن نستخرج جذر العدد وفقاً للمقام بالطريقة التي ذكرتها سابقاً فإننا نضرب النتيجة بالبسط لأنه ليس واحد.

نختار رقماً جذره التكعيبي بسيط و هو الرقم مليون

$$\sqrt[3]{1000000} = 100$$

الجذر التكعيبي للرقم مليون هو مئة 100 .

الآن :

نرفع الرقم مليون للقوة الكسرية الثالثة :

$$1000000^{1/3}=1000000^{0.333333}=99.99...\approx 100$$

أي أن الناتج يساوي مئة تقريباً .

أي أن قيمة رقمٍ مرفوعٍ لقوة كسرية تساوي الثلث $\frac{1}{3}$ تساوي الجذر التكعيبي لذلك الرقم.

نقوم بحساب الرقم مليون مرفوع لقوة كسرية تساوي ثلثين $\frac{2}{3}$

$$1000000^{2/3}=1000000^{1/3\times 2}=1000000^{1/3+1/3}=1000000^{2/3}$$

حصلت على الرقم العشري 0.333333 بقسمة البسط 1 على المقام 3 لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإجراء العمليات على الكسور باستخدام الآلة الحاسبة.

فعلت ذلك لغاية تعليمية و لكن إياك في الامتحان أن ترفع أي عددٍ لقوة عشرية .

القوة الكسرية السلبية Negative fractional power

يمكن للقوة الكسرية أن تكون قوةً كسرية سلبية ، و هذا يعني جعل تلك القيمة أو ذلك الرقم المرفوع لقوةٍ كسرية مقاماً لكسرٍ بسطه العدد واحد 1 .

مثال :

$$9^{2/3-} = \frac{1}{9^{1/3\times2}}$$

نقوم بتحويل القوة الكسرية السلبية إلى قوة كسرية إيجابية و ذلك بجعل تلك القوة الكسرية مقاماً لكسرٍ بسطه العدد واحد 1 .

لاحظ أنني عندما قمت بقلب القوة السلبية $9^{2/3-}$ و جعلتها مقاماً للبسط واحد 1 أنها أصبحت قوةً كسرية موجبة :

$$9^{1/3\times2}$$

$$9^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{3}\times2}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{9^{\frac{2}{3}}}$$

$$\frac{1}{9^{\frac{1}{3}}}=0.48074....$$

$0.48074\times2=0.9614997163$

إن رقماً ما مرفوعاً لقوةٍ كسرية سلبية يساوي ذلك الرقم مرفوعاً لتلك القوة (إيجابية و ليس سلبية) و هو مقامٌ لبسطٍ مقداره واحد .

$$9^{\frac{-2}{3}}=\frac{1}{9^{\frac{2}{3}}}$$

باختصار و بساطة شديدين فإننا :

نجعل من الرقم المرفوع لقوة كسرية سلبية هو و قوته الكسرية مقاماً لكسرٍ بسطه العدد واحد و لكن بعد تحويل الكسر السلبي إلى كسرٍ إيجابي أي بعد إزالة شارته السلبية.

$$9^{\frac{-2}{3}}=\frac{1}{9^{\frac{2}{3}}}$$

كما يُمكننا تجزئة القوة الكسرية السلبية $\frac{-2}{3}$ الواحدة إلى عدة قوى كسرية إيجابية

$$9^{\frac{1}{3}\times 2}$$

و الذي يعني بأننا نضرب القوة الكسرية (ثلث) $\frac{1}{3}$ بالعدد 2 و التي تعني جمع هذه القوة مع نفسها أي جمع بسطي هاتين القوتين مع بعضهما البعض $9^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}$.

و الذي ينتج عنه القوة الكسرية $9^{\frac{2}{3}}$ و التي تكون دائماً في النهاية مقاماً لكسرٍ بسطه العدد واحد 1 $\frac{1}{9^{\frac{2}{3}}}$ لأن أساس هذه القوة الكسرية أنها قوة كسرية سلبية .

$$9^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{3}\times 2}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{9^{\frac{2}{3}}}$$

رفع قوة إلى عدة قوى

كم تساوي القوة التالية

$$(20^{3}))^{5})^{0}$$

في حال الرفع لعدة قوى فإننا نقوم بضرب القوى المختلفة ببعضها البعض لنحسب محصلة تلك القوى .

$$(20^{3}))^{5})^{0}=20^{(3\times5\times0)}=20^{0}$$

20 مرفوعة للقوة صفر.

$$11^{4})^{2})^{3}=11^{(4\times2\times3)}=11^{24}$$

ما هي قيمة :

$$(2\frac{1}{3})^{4}+3(6^{2}\times6^{-3})-11\wedge\frac{1}{3}$$

^ شارة الرفع للقوة.

نبدأ بالحد الأول $(2\frac{1}{3})^4$ حيث نقوم بتطبيق القوة الرابعة على كلٍ من بسط الكسر و مقامه .

و لكن قبل ذلك يتوجب علينا تحويل الرقم المختلط $(2\frac{1}{3})^4$ إلى كسر غير متناسب أي كسرٌ بسطه أكبر من مقامه و قيمته الكلية أكبر من واحد ، و كما علمنا من قبل فإننا نقوم بذلك عن طريق ضرب العدد المرافق للكسر و هو هنا العدد 2 بالمقام 3 ثم القيام بجمع الناتج مع البسط:

$$2\times3=6+1=7$$

مع إبقاء المقام الأصلي دون تغيير.

$$2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$$

و الآن نقوم برفع كلٍ من بسط هذا الكسر و مقامه للقوة الرابعة :

$$(2\frac{1}{3})^4=(\frac{7}{3})\wedge4$$

$$\left(2\frac{1}{3}\right)^4 = \left(\frac{7}{3}\right)^{\wedge}4 =$$

نرفع بسط الكسر للقوة الرابعة

$$7^4 = 2401$$

نرفع مقام الكسر للقوة الرابعة

$$3^4 = 3\times3\times3\times3 = 81$$

ليصبح هذا الكسر بعد رفعه للقوة على الشكل التالي:

$$\frac{2401}{81}$$

إن عملية تحويل رقمٍ مختلط (عددٌ يرافق كسر) إلى كسر تعني معرفة من كم جزءاً يتألف هذا الصحيح المرافق للكسر و ذلك من خلال ضرب العدد الصحيح المرافق للكسر بالمقام (مفتاح

الكسر الذي يبين من كم جزءاً تتألف الوحدة الواحدة في هذا الكسر) و هذا يماثل قيامنا بتجزئة العدد الصحيح إلى عدة وحداتٍ مماثلة لوحدات كلٍ من البسط و المقام ، و بعد تجزئة العدد الصحيح يمكنننا جمع ذلك العدد الصحيح مع البسط الذي يتألف من عدة أجزاء.

عدد صحيح

1

7

7 أجزاء
أقل من واحد
الواحد هنا كما يشير المقام
يتألف من ٨ أجزاء

8

عد صحيح يتالف من عدة أجزاء
عدد صحيح يتألف من 8 أجزاء

15

15 جزء
أكبر من واحد
الواحد هنا كما يشير المقام
يتألف من ٨ أجزاء

8

عد صحيح يتالف من عدة أجزاء
عدد صحيح يتألف من 8 أجزاء

$$1\frac{7}{8} = \frac{15}{8}$$


$$1\times8+7=15$$

$$(2\frac{1}{3})^4+3(6^2\times6^{-3})-11^{\wedge\frac{1}{3}}$$

الآن نقوم بتفكيك الحد الثاني

$$3(6^2\times6^{-3})$$

كما ترون فإن لدي عمية ضرب محصورة بين قوسين .



تمهل و اعط الأولوية

$$3(6^{2}\times 6^{-3})$$

كما مر معنا سابقاً فإن الأولوية في إجراء العمليات الحسابية تكون دائماً للعمليات المحصورة بين قوسين و لذلك فإنني أقوم أولاً بإجراء عملية ضرب القوتين المحصورتين بين قوسين.

و كما مر معنا سابقاً فإن **ناتج ضرب قوتين متماثلتين (هنا 6 و 6)** **يساوي ناتج جمع هاتين القوتين مع بعضهما البعض**:

$$2+(-3)=(-1)$$

$$3(6^{2}\times 6^{-3})= 3\times 6^{(2+-3)}=3\times 6^{(-1)}$$

$$2+(-3)=(-1)$$

كان معي دولارين و انفقت ثلاثة دولارات اثنين منها كانا لي ، و واحدٌ استدنته و بذلك خسرت الدولارين و أصبح علي دينٌ مقداره دولارٌ واحد (-1)

إن ناتج ضرب قوتين مُتماثلتين $(6^{2}\times 6^{-3})$ **يساوي ناتج جمع هاتين القوتين مع بعضهما البعض** $3\times 6^{(2+-3)}$.

و هنالك لدينا كذلك علاقة ضربٍ أخرى $3\times 6^{(-1)}$.

بما أن القوة الناتجة 1- هي قوةٌ سلبية فإننا نقوم بتحويلها إلى قوةٍ إيجابية عن طريق جعل القوة السلبية $6^{(-1)}$ **مقاماً لبسطٍ مقداره واحد 1 بعد تحويلها لقوة إيجابية لتصبح**

$$\frac{1}{6}^{1}$$.

$$6^{(-1)}=0.1666666667$$

$$\frac{1}{6}^{1} = 1/6\text{^}1 = 0.1666666667$$

^شارة الرفع للقوة

و الآن نجري عملية الضرب:

$$3 \times 6^{-1} = 3 \times \frac{1}{6}^{1}$$

لإتمام عمية الضرب فإننا نقوم بتحويل العدد 3 إلى كسرٍ و ذلك بجعله بسطاً للمقام واحد لأنه لا يُمكن ضرب عدد بكسر مالم نحول ذلك العدد إلى كسرٍ كذلك ، و عندما نجعل من العدد بسطاً لمقام قيمته واحد فإننا نُحافظ على قيمة .

$$3 \times 6^{-1} = 3 \times \frac{1}{6}^{1} = \frac{3}{1} \times {}^{1}\frac{1}{6} = \frac{3}{6}$$

نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام :

$3 \times 1 = 3$

$1 \times 6 = 6$

و ماذا فعلنا بالمقام 6 الذي كان مرفوعاً للقوة الأولى ؟

لا تأثير للرفع للقوة الإيجابية الأولى لأن جميع الأعداد الموجبة تكون بشكلٍ افتراضي مرفوعة للقوة الموجبة الأولى.

إذاً فإن 3×6^{-1} **تساوي** $\frac{3}{6}$

عند ضرب كسرين ببعضهما البعض فإننا نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

$$\frac{3}{6}=3\div6=0.5$$

$$3\times6^{-1}=0.5$$

و الآن ننتقل للحد الأخير $11^{\frac{1}{3}}$.

$11^{\frac{1}{3}}$ يماثل الجذر التكعيبي للرقم 11

$11^{0.3333333333} = 2.2239800906$

أي 2.2239800906

$\sqrt[3]{11} = 2.2239800906$

لماذا ؟

لأن الرقم 11 مرفوعٌ لقوةٍ كسرية مقامها العدد 3 و بسطها العدد 1 و بالتالي فإن الرفع لقوة كسرية مقامها 3 يُماثل الجذر التكعيبي للرقم 11 .

إن رفع عدد ما للكسر نصف $X^{\frac{1}{2}}$ يماثل الجذر التربيعي $\sqrt{}$ لذلك العدد ، أما رفع عددٍ ما للكسر ثلث $X^{\frac{1}{3}}$ فإن ذلك يماثل الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$ للعدد ، و الرفع لكسر مقامه أربعة $X^{\frac{1}{4}}$ يماثل

الجذر الرباعي $\sqrt[4]{}$ للعدد و رفع العدد لكسرٍ مقامه خمسة $X^{\frac{1}{5}}$

يماثل الجذر الخماسي للعدد $\sqrt[5]{}$ و هكذا ....



$\frac{1}{4}$


إياك في الامتحان أن ترفع أي رقمٍ أو أي شيء لقوةٍ هي عبارة عن رقمٍ عشري و إنما فعلت ذلك لغاياتٍ تعليمية.

إن رقماً مرفوعاً للقوة الكسرية ربع $\frac{1}{4}$ يُساوي الجذر الرباعي (و ليس التربيعي) لذلك الرقم $\sqrt[4]{x}$

إن إن رقماً مرفوعاً للقوة الكسرية ثلث $\frac{1}{3}$ يُساوي الجذر التكعيبي لذلك الرقم $\sqrt[3]{x}$.

إن إن رقماً مرفوعاً للقوة الكسرية نصف $\frac{1}{2}$ يُساوي الجذر التربيعي لذلك الرقم $\sqrt[2]{x}$ أو $\sqrt{x}$

إن رقماً مرفوعاً للقوة الكسرية ثلث $\frac{1}{3}$ يُساوي الجذر التربيعي لذلك الرقم $^{2}\sqrt{x}$ أو $\sqrt{x}$



Irrational Square Roots and Irrational Numbers
الجذور التربيعية الغير نسبية و الأرقام الغير نسبية

في معظم الأحيان فإن الجذور التربيعية Square roots غالباً ما تكون أرقاماً عشرية غير منتهية .

قليلةٌ جداً هي الأرقام الصحيحة التي تكون جذورها التربيعية كذلك أرقامٌ صحيحة :

$^{2}\sqrt{4}=2$

$^{2}\sqrt{16}=4$

$^{2}\sqrt{9}=3$

$^{2}\sqrt{36}=6$

$^{2}\sqrt{49}=7$

ليس من الضروري وضع العدد ^{2} فوق شارة الجذر في الجذور التربيعية حصرياً و ليس فيما سواها من الجذور.

$\sqrt{2}=2$

$\sqrt{16}=4$

$\sqrt{9}=3$

$\sqrt{36}=6$

$\sqrt{49}=7$

إن الأرقام التي تكون جذورها التربيعية أعداداً صحيحة هي الأرقام التي تكون ناتج ضرب عددٍ ما بنفسه.

$$\sqrt{100}=10$$

$$10\times10=100$$

$$^{2}\sqrt{49}=7$$

$$7\times7=49$$

$$\sqrt{36}=6$$

$$6\times6=36$$

$$^{2}\sqrt{9}=3$$

$$3\times3=9$$

$^2\sqrt{16}=4$


$4\times4=16$

$^2\sqrt{4}=2$

$2\times2=4$

أما الجذور التربيعية لبقية الأرقام ، أي الجذور التربيعية للأرقام التي لا تكون ناتج ضرب عددٍ معين بنفسه فتكون أرقاماً غير نسبية Irrational numbers أي أنها تكون عبارةً عن أرقام عشرية أي لا يمكن كتابتها على شكل كسور كما أنها تكون أرقاماً دورية (مستمرة لانهائية) .

و نظراً لصعوبة كتابة الجذور التربيعية غير النسبية نظراً لطولها و استمراريتها اللانهائية فإننا غالباً ما نكتفي بكتابة مفتاحها ، فنحن مثلاً بدلاً من كتابة الجذر التربيعي للعدد 6 و هو 2.4494897428 فإننا نكتب √ 6 .



إذا كان لدينا مربع يبلغ طول ضلعه 6 √ ،و بما أن مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع فإن مساحة هذا المربع تساوي 6 √ × 6 √ أي 6 √ مرفوعاً للقوة الثانية أي $(\sqrt{6})^2$) .

$\sqrt{}$ 6^2=6

$(\sqrt{6})^2=6$

$6m^2$ متر مربع هي مساحة هذا المربع (إذا كانت وحدة القياس هي المتر)


طول ضلع المربع مرفوعاً لقوة الثانية = مساحة المربع.

طول ضلع المربع يساوي الجذر التربيعي لمساحة المربع.

فإذا طُلب مني أن أحسب طول ضلع مربعٍ تبلغ مساحته مثلاً $36cm^2$ فإنني أقوم بتجذير الرقم 36 تجذيراً تربيعياً .

$$\sqrt{36} = 6cm$$

و لكن انتبه إلى أن النتيجة عندها لن تكون بالسنتمتر المربع لأنها لن تكون وحدة قياس مساحة بل وحدة قياس طول :



a

بما أن مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع $A\times A$ أي طول الضلع A مرفوعاً للقوة الثانية A^2 و بما أن الرفع للقوة الثانية هو العملية المعاكسة لعملية التجذير التربيعي فإن طول ضلع المربع يساوي الجذر التربيعي لمساحة المربع

$\sqrt{A^2}$

$\sqrt{A\times A}$

و في كثيرٍ من الأحيان فإننا نضطر إلى كتابة الرقم عندما يكون طويلاً و مستمراً على شكل جذر فنكتب مثلاً $\sqrt{7}$ تسهيلاً لكتابة ذلك الرقم و التعامل معه حيث نقوم بإدخال ذلك الرقم المعقد إلى الآلة الحاسبة على شكل جذر.

تبسيط الجذر التربيعي



الجذر التربيعي لناتج ضرب عددين ببعضهما يساوي ناتج ضرب الجذرين التربيعيين لهذين العددين ببعضهما البعض.

$$\sqrt{AB} = \sqrt{A} \times \sqrt{B}$$

$$\sqrt{A \times B} = \sqrt{A} \times \sqrt{B}$$

$$\sqrt{36 \times 49} = \sqrt{36} \times \sqrt{49} = 6 \times 7 = 42$$

الجذر التربيعي لناتج ضرب عددين ببعضهما يساوي ناتج ضرب الجذرين التربيعيين لهذين العددين ببعضهما البعض.

$\sqrt{AB} = \sqrt{A} \times \sqrt{B}$

$\sqrt{A \times B} = \sqrt{A} \times \sqrt{B}$

$\sqrt{36 \times 49} = \sqrt{36} \times \sqrt{49} = 6 \times 7 = 42$

لا تضع في الامتحان شارة ضرب بين متغيرين و إنما فعلت ذلك لأبين بأن العلاقة بين متغيرين متجاورين أو عددٌ و متغير متجاورين هي دائماً علاقة ضرب.



عندما يتم تربيع جذرٍ تربيعي، أي عندما يتم رفع جذرٍ تربيعي للقوة الثانية فإننا نحصل على العدد ذاته الموجود تحت أو ضمن شارة الجذر التربيعي :

$$\sqrt{X} \times \sqrt{X} = X$$

$$\sqrt{16} \times \sqrt{16} = 4 \times 4 = 16$$

عندما يتم تربيع جذرٍ تربيعي، أي عندما يتم رفع جذرٍ تربيعي للقوة الثانية فإننا نحصل على العدد ذاته الموجود تحت أو ضمن شارة الجذر التربيعي :

$$\sqrt{\mathbf{X}} \times \sqrt{\mathbf{X}} = X$$

$$\sqrt{16} \times \sqrt{16} = 4 \times 4 = 16$$

قسمة الجذور

إن قسمة بسط كسر ما على مقامه و إيجاد الجذر التربيعي للنتيجة يساوي ناتج قسمة جذر البسط على جذر المقام.

$$\sqrt{\frac{X}{X}} = \frac{\sqrt{X}}{\sqrt{X}}$$

$$\sqrt{X \div X} = \frac{\sqrt{X}}{\sqrt{X}}$$

$$\sqrt{49/36} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{36}} = 7\div6=1.16666666667$$

$$\sqrt{49 \div 36} = 1.66$$

النتيجة متماثلة.

إن قسمة بسط كسر ما على مقامه و إيجاد الجذر التربيعي للنتيجة يساوي ناتج قسمة جذر البسط على جذر المقام.

$$\sqrt{\frac{X}{X}} = \frac{\sqrt{X}}{\sqrt{X}}$$

$$\sqrt{X \div X} = \frac{\sqrt{X}}{\sqrt{X}}$$

$$\sqrt{49/36} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{36}} = 7 \div 6 = 1.16666666667$$

$$\sqrt{49 \div 36} = 1.66$$

إن ضرب عددين و إيجاد الجذر التربيعي للنتيجة يساوي ناتج ضرب الجذرين التربيعيين لهذين العددين .

$3 \times 5 = 75$

$\sqrt{75} = 8.66$

$\sqrt{3 \times 5} = 8.66$

إن تربيع الجذر التربيعي يعطي العدد الموجود تحت شارة الجذر التربيعي

$(\sqrt{4})^2 = 4$

إذا قمنا برفع الجذر التربيعي للقوة الثانية فذلك يعني بأنا لم نفعل شيئاً أي أنا سوف نحصل على المدخلة ذاتها أي أننا سوف نحصل على العدد الموجود تحت شارة الجذر.

إن تجذير ناتج قسمة عددين على بعضهما البعض يساوي ناتج قسمة الجذر التربيعي للعدد الأول على الجذر التربيعي للعدد الثاني:

$$\sqrt{A \div B} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$$

$\sqrt[3]{9 \div 8} = \sqrt[3]{9} \div \sqrt[3]{9} = 1.125$

$\sqrt[3]{9 \div 8} = 1.125$

$\sqrt[3]{9} \div \sqrt[3]{9} = 1.125$

$\sqrt[3]{9 \div 8} = \sqrt[3]{9} \div \sqrt[3]{8} = 1.125$

$\sqrt[3]{9 \div 8} = 1.125$

$\sqrt[3]{9} \div \sqrt[3]{8} = 1.125$

التعامل مع الكسور الجذرية و تفكيكها :

طرق تفكيك الكسر الجذري:

إذا كان لدينا كسرٌ جذري فإننا نضرب كلاً من بسط الكسر الجذري و مقامه بالمقام (إذا كان مقام الكسر جذر) :

$$\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A \times \sqrt{B}}{\sqrt{B \times \sqrt{B}}}$$

لدينا كسرٌ جذري $\frac{A}{\sqrt{B}}$ مقامه جذر $\frac{\square}{\sqrt{B}}$ لتفكيك هذا الكسر الجذري فإننا نضرب كلاً من البسط $\frac{A}{\square}$ و المقام الجذري $\frac{\square}{\sqrt{B}}$ بالمقام الجذري $\frac{\square}{\sqrt{B}}$.

عندما نضرب عنصراً ما بجذر يُصبح الناتج هو ذلك العنصر مضروباً بذلك الجذر:

$$A \times \sqrt{B} = A\sqrt{B}$$

عندما نضرب الجذر التربيعي لعددٍ ما بنفسه فإن الناتج هو العدد ذاته :

$$\sqrt{A} \times \sqrt{A} = A$$

لماذا؟

لأن عملية الرفع لقوة أي ضرب العدد بنفسه هي العملية المعاكسة لعملية التجذير و بالتالي فإننا عندما نضرب $\sqrt{2}$ بنفسه مثلاً فإن ناتج عملية الضرب هذه هو ذلك العنصر أو ذلك العدد نفسه أي العدد 2 و ليس جذره .

عملية التجذير التربيعي هي العملية المعاكسة للرفع للقوة الثانية.

عملية التجذير التكعيبي هي العملية المعاكسة للرفع للقوة الثالثة.

إذا قابلنا كسراً جذرياً مقامه جذر فإن بإمكاننا تفكيك هذا الجذر عن طريق ضرب كلٍ من بسطه (اللاجذري X) و مقامه الجذري $\sqrt{A}$ بمقامه الجذري $\sqrt{A}$:

و الآن لنتأكد من صلاحية الطريقة السابقة عن طريق التأكد بأن النتيجة ستكون متماثلة .

ليكن لدينا الكسر الجذري التالي $\frac{3}{\sqrt{25}}$ ، و هو كسرٌ جذري بسطه غير جذري و هو هنا العدد 3 $\frac{3}{\blacksquare}$ ، أما مقامه فهو الجذر التربيعي للرقم 25 $\frac{\square}{\sqrt{25}}$ ، فكم تبلغ قيمة هذا الكسر الجذري؟

كما هي حال أي كسر فإننا حتى نعرف قيمته فإننا نقسم البسط على المقام :

$$\sqrt{25}=5$$

$$3\div5=0.6$$

تذكروا جيداً هذه النتيجة .

الآن كما قلت سابقاً فإننا إذا صادفنا كسرٌ جذري بسطه غير جذري (هنا العدد 3) و مقامه جذر (هنا الجذر التربيعي للعدد 5) $\sqrt{25}$ فإن علينا أن نضرب كلاً من البسط و المقام بالجذر :$\sqrt{25}$

$$\frac{3}{\sqrt{25}}=\frac{3\times\sqrt{25}}{\sqrt{25\times\sqrt{25}}}$$

$$=\frac{3\times5}{5\times5}=\frac{15}{25}=0.6$$

هل تذكرون النتيجة السابقة التي حصلنا عليها ؟ النتيجتين متطابقتين إذاً فإن المقولة صحيحة.

قم بتفكيك الكسر الجذري التالي :

$$\frac{10}{6-\sqrt{9}}$$

كما مر معنا سابقاً فإننا **لتفكيك كسرٍ جذري بسطه غير جذري و مقامه جذري فإننا نضرب كلاً من البسط (غير الجذري) 10 و المقام الجذري بالمقام** $6-\sqrt{9}$:

$$10\times 6-\sqrt{9}$$

$$6-\sqrt{9}\times 6-\sqrt{9}$$

فنحصل على الكسر الجذري التالي :

$$\frac{10\times(6+\sqrt{9})}{(6-\sqrt{9})\times(6+\sqrt{9})}$$

نقوم بتحويل الشارة السلبية الموجود في مقام الكسر الجذري إلى شارةٍ موجبة ، أي أننا نقوم بتحويل عملية الطرح الموجودة في المقام إلى إلى عملية جمع و ذلك عندما نضرب كلاً من بسط و مقام الكسر الجذري بالمقام.

الآن **نقوم بتفكيك الأقواس و ذلك عن طريق ضرب محتويات القوس الأولى بجميع محتويات القوس الثانية** :

$10\times6=60$

$$10\times\sqrt{9}=10\sqrt{9}$$

و بذلك يصبح البسط الجديد $60+10\sqrt{9}$

$$6\times6=6^2$$

$$6\times\sqrt{9}=6\sqrt{9}$$

$$-\sqrt{9}\times6=-6\sqrt{9}$$

سالب $-\sqrt{9}$ ضرب موجب 6 = سالب $6\sqrt{9}$ -

عدو (-) صديقك (+) عدوك (-)

$$-\sqrt{9} \times \sqrt{9} = -\sqrt{9}$$

سالب $-\sqrt{9}$ ضرب موجب $\sqrt{9}$ = سالب $\sqrt{9}$ -

عدو (-) صديقك (+) عدوك (-)

و بذلك يصبح لدينا المقام التالي :

$$6^2-6\sqrt{9}+6\sqrt{9}-(\sqrt{9})^2$$

ليصبح لدينا الكسر الجذري التالي :

$$\frac{60+10\sqrt{9}}{6^2-6\sqrt{9}+6\sqrt{9}-(\sqrt{9}),^2}$$

$$\frac{60+10\sqrt{9}}{6^2-6\sqrt{9}+6\sqrt{9}-(\sqrt{9}),^2}$$

كما ترون فقد أصبحت لينا علاقة جمع بين مقدارين متماثلين متعاكسي الشارة محصلتهما الصفر و لذلك يمكننا حذفهما:

$$-6\sqrt{9}+6\sqrt{9}$$

$$-6\sqrt{9}+6\sqrt{9}=0$$

طبعاً لا يمكنني أن أطرح كذلك $(\sqrt{9})^2$ من $6\sqrt{9}$ لأنها مرفوعة لقوة فلا يمكنني أن أطرح او ان أجمع حداً مرفوعاً قوة مع حدٍ غير مرفوعٍ لقوة .

لنحصل على الكسر الجذري التالي :

و بالطبع فإن :

$6^2=6\times6=36$

$$(\sqrt{9}),^2=9$$

$$(\sqrt{9}),^2 = \sqrt{9} \times \sqrt{9} = 9$$

$$\frac{60+10\sqrt{9}}{36-9} = \frac{60+10\sqrt{9}}{27}$$

ليكن لدينا الكسر الجذري التالي :

$$\frac{1}{\sqrt{16}}$$

كما نرى فإن هذا الكسر الجذري يتألف من بسطٍ عبارة عن عددٍ عادي 1 و مقامٍ عبارة عن جذر $\sqrt{16}$ ، و كما مر معنا سابقاً فإننا في مثل هذه الحالة نضرب كلاً من البسط 1 و المقام $\sqrt{16}$ بالمقام $\sqrt{16}$ ليصبح لدينا الكسر الجذري التالي :

$$\sqrt{16} = 4$$

$$\frac{1\times\sqrt{16}}{\sqrt{16}\times\sqrt{16}}=\frac{1\times4}{4\times4}=\frac{4}{16}$$

تحليل العلاقات الجذرية

إن جذر عددٍ ما يساوي ناتج ضرب جذري العددين الذين ناتج ضربهما ببعض يساوي ذلك العدد .

مثال :

$$49=7\times7$$

$$49=\left(\sqrt{7}\right)$$

49 و ليس جذرها التربيعي تساوي الجذر التربيعي للعدد 7 .

$$\sqrt{49} = (\sqrt{7})^2$$

الجذر التربيعي للرقم 49 يساوي الجذر التربيعي للعدد 7 مرفوعاً للقوة الثانية.

جذر الرقم 49 يساوي جذر 7 المرفوع للقوة الثانية لأن 7 ضرب 7 تساوي 49 .

لاحظ بأن 7 ضرب 7 تساوي 49 و أن الجذر التربيعي للرقم 49 هو 7 ، كما أن الجذر التربيعي للعدد 7 المرفوع للقوة الثانية يساوي كذلك 7 :

$$\sqrt{49} = (\sqrt{7})^2 = 7$$

$$\sqrt{49} = \left(\sqrt{7 \times \sqrt{7}}\right) = 7$$

هذا أمرٌ مفروغٌ منه في الجبر مع أن الحاسبات تعامل الرفع لقوة الثانية فيما يختص بالجذر بطريقةٍ مختلفة عن ضرب جذرين تربيعيين أي أن ناتج ضرب الجذرين التربيعيين للعدد 7 لا يساوي الجذر التربيعي للعدد 7 مرفوعاً للقوة الثانية في بعض الحاسبات.

$$\sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{16} = \left(\sqrt{4 \times \sqrt{4}}\right) = 4$$

يُمكننا في الجبر كتابة جذر أي رقمٍ على أنه يساوي ناتج ضرب جذري العددين الذين ناتج ضربهما يساويه فالجذر التربيعي للرقم 16 يساوي 4 أي أن الجذر التربيعي للرقم 16 يساوي الجذر التربيعي للعدد 4 مرفوعاً للقوة الثانية أي $^{2}\sqrt{4^{2}}$ أي أنه يساوي $^{2}\sqrt{4\times4}$ غير أن هذا الأمر لا يحدث عندما نستخدم الحاسبة بالطريقة الاعتيادية حيث نحصل على نتائج مختلفة ، و لكن هنالك طريقة تجعل الحاسبة عندما تقوم بضرب جذرين تربيعيين ببعضهما البعض تعطيك فعلياً الناتج الذي سوف تحصل عليه عندما تقوم بتجذير ناتج ضرب جذري هذين العددين ببعضهما البعض و تتمثل هذه الطريقة بكل بساطة بوضع الجذرين الذين نريد ضربهما ببعض ضمن قوسين :

$$(\sqrt{7})\times(\sqrt{7})=7$$

$$(\sqrt{7})\times(\sqrt{7})=7$$

$$\sqrt{7}\times\sqrt{7}\neq 7$$

إن لم نضع الجذور بين قوسين فإننا لا نحصل على إجاباتٍ صحيحة.

إذاً فإن بإمكاننا عند حساب الكسور الجذرية و تبسيطها القيام بتحويل جذر عددٍ ما إلى جذري العددين الذين ناتج ضربهما ببعض يساويه:

$$\sqrt{15}=\sqrt{3}\times\sqrt{5}$$

$$\sqrt{15}=3.87$$

$$\left(\sqrt{3}\right) \times \left(\sqrt{5}\right) = 3.87$$

لا تنسى أن تضع الجذرين ضمن أقواس عند استخدام الآلة الحاسبة و إلا فإنك سوف تحصل على نتائج خاطئة .

إن بإمكاننا حل و تبسيط الجذور بالطريقة التالية :

$$\frac{3}{\sqrt{4}\times\sqrt{4}}=\frac{3}{\sqrt{16}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{7}} \times \frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{21}}$$

الطريقة الثانية لحل الجذور و تبسيطها تتمثل في استخدام العامل الجذري و هو العدد الذي يوضع أحياناً أمام الجذر و هو العدد الذي يكون مضروباً بالجذر:

$$3\sqrt{2} = 3 \times \sqrt{2}$$

$$4\sqrt{5} = 4 \times \sqrt{5}$$

إذاً فإن العلاقة ما بين العامل العددي الذي يوضع أحياناً أمام الجذر و بين الجذر هي علاقة ضرب.

انتبه إلى أنه في الجذر التربيعي هنالك عدد 2 صغير موجود في أعلى الجذر سواءً وضعناه أم لم نضعه ، و غالباً فإننا لا نضع 2 فوق الجذر التربيعي كما لا نضع شارة موجب قبل الأعداد الموجبة.

$$\sqrt[2]{\ } = \sqrt{\ }$$

ما هي علاقة العامل العددي الذي نضعه أمام الجذر (هنا العدد 7) $7\sqrt[2]{\ }$ بالمطلوب الجذري ، أي العدد الموجود تحت شارة الجذر (اي العدد الذي يُطلب منا إيجاد جذره $7\sqrt[2]{6}$ (و هو هنا العدد 6)؟

إنها علاقة ضرب ، اي ان قيمة الجذر تساوي ناتج ضرب العامل العددي للجذر أي العدد الكبير الذي قد يوجد أمام الجذر $4\sqrt{\ }$ × المطلوب الجذري radicand أي العدد الموجود تحت شارة الجذر و المطلوب تجذيره (المطلوب إيجاد جذره).

إذاً يمكننا تبسيط الجذور وفق الطريقة السابقة :

$$\sqrt{16} = (\sqrt{4}) \times (\sqrt{4}) = 2 \times 2 = 4$$

4×4=16

$$2\ {}^{2}\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4$$

$$2\ \sqrt{4} = 2 \times 2 = 2$$

علامة التجذير التربيعي 2 موجودة بشكلٍ افتراضي في الجذر التربيعي حتى و إن لم تكتب في أعلى الجذر:

$$\sqrt{4} = {}^{2}\sqrt{4}$$

$$\sqrt{16} = (\sqrt{4}) \times (\sqrt{4}) = 4$$

$$\sqrt{16} = 4$$

$$2\ \sqrt[2]{4}=4$$

$$2\ \sqrt[2]{4}=4$$

لأن الجذر التربيعي للعدد 4 يساوي 2 و بالتالي فإن العامل العدد 2 الذي يتقدم الجذر التربيعي ضرب قيمة الجذر أي 2 تساوي 2 .

والمجذورهو العدد المطلوب تجذيره و الموجود تحت علامة الجذر.

في التعبير الجذري، تحدد هذه العناصر الثلاثة

كيفية تحليل العدد أو قياسه.

الدليل (العدد الصغير أعلى/داخل علامة الجذر): يشير إلى رتبة الجذر. يوضح عدد مرات ضرب العدد في نفسه للحصول على قيمة المجذور. إذا لم يُذكر أي رقم، يُفترض أن الدليل هو 2 (الجذر التربيعي).

المجذور (العدد أو التعبير تحت علامة الجذر): هو القيمة التي نبحث عن جذرها. يمثل ناتج رفع الجذر إلى قوة الدليل (الدليل الجذري هو العدد الصغير الذي يُبين رتبة الجذر: تربيعي، تكعيبي...

المعامل – العامل العدديcoefficient (العدد الذي يسبق الجذر): هو عامل الضرب. بعد إيجاد قيمة الجذر، نضربها في هذا المعامل.

$$2\ {}^{2}\sqrt{4}=2\times\sqrt{4}$$

$$\sqrt{100}=\sqrt{5}\times\sqrt{20}=10$$

$$\sqrt{100}=10$$

$$\sqrt{25}=\sqrt{5}\times\sqrt{5}$$

حالة :

$$\frac{2}{2\sqrt{25}}$$

إذا كان لدينا كسرٌ جذري من الشكل $\frac{2}{2\sqrt{25}}$ فإن بإمكاننا أن نختصر العدد 2 الموجود في بسط الكسر الجذري مع العامل الجذري 2 الموجود في المقام :

2/2=1

ليصبح الكسر الجذري السابق على الشكل :

$$\frac{2}{2\sqrt{25}}$$

$$\frac{\cancel{2}}{\cancel{2}\sqrt{25}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{25}}$$

مثال آخر :

$$\frac{2}{2\sqrt{4}}$$

إذا كان لدينا كسرٌ جذري على الشكل التالي $\frac{2}{2\sqrt{4}}$ فإن بإمكاننا أن نختصر العدد 2 الموجود في بسط الكسر الجذري مع العامل الجذري 2 الموجود في المقام :

2/2=1

ليصبح الكسر الجذري السابق على الشكل :

$$\frac{\cancel{2}}{\cancel{2}\sqrt{4}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{4}}$$

و كما مر معنا سابقاً فإنه **إذا كان لدينا كسرٌ جذري بسطه رقمٌ عادي و مقامه جذر فإننا نقوم بضرب كلٍ من بسط الكسر و مقامه بالمقام كذلك**:

$$\frac{1}{\sqrt{25}}$$

نضرب البسط 1 بالمقام $\sqrt{25}$ **كما نضرب**

المقام $\sqrt{25}$ **بالمقام** $\sqrt{25}$ **كذلك** فنحصل على الكسر

الجذري التالي:

$$\frac{1\times\sqrt{25}}{\sqrt{25\times\sqrt{25}}}$$

و بالطبع فإن ضرب كسرين ببعضهما البعض يعني ضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام :

$$1\times\sqrt{25}=\sqrt{25}$$

$$\sqrt{25}\times\sqrt{25}=25$$

ذلك أن ضرب الجذر التربيعي بنفسه مرة واحدة يعطي المجذور ذاته (المطلوب الجذري) أي العدد الموجود تحت شارة الجذر ليصبح لدينا الكسر الجذري التالي:

$$\frac{\sqrt{25}}{25}$$

و **بالنسبة للكسر الجذري الثاني** $\frac{1}{\sqrt{4}}$ **و كما مر معنا سابقاً فإننا نضرب كلاً من البسط و المقام بالمقام لجذري ليصبح لدينا الكسر الجذري** التالي :

$$\frac{1}{\sqrt{4}}$$

$$\frac{1\times\sqrt{4}}{\sqrt{4}\times\sqrt{4}}$$

نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام

$$1\times\sqrt{4}=1\sqrt{4}\times\sqrt{4}$$

$$\sqrt{4}\times\sqrt{4}=4$$

لأن ناتج ضرب الجذر بنفسه يُساوي العدد المجذور ذاته الموجود تحت شارة الجذر (المطلوب الجذري)

لنحصل على الكسر الجذري التالي :

$$\frac{\sqrt{4}}{4}$$

اكتب المعادلة هنا.

مسألة جذرية

إذا كانت مساحة دائرة $49cm^2$ سنتمتر مربع ، فكم يبلغ طول نصف قطر r هذه الدائرة؟

الحل:

إن نصف قطر هذه الدائرة و كل دائرة يساوي الجذر التربيعي لمساحتها مقسوماً على الثابت باي π.

أي أن عملية حساب نصف القطر من المساحةهي العملية المعاكسة لحساب مساحة الدائرة حيث نقلب عملية التربيع (الرفع للقوة الثانية) إلى عملية تجذيرٍ تربيعي بينما نقلب عملية الضرب إلى عملية قسمة.

إن نصف قطر هذه الدائرة و كل دائرة يساوي الجذر التربيعي لمساحتها مقسوماً على الثابت باي π .

حيث أن مساحة الدائرة تساوي :

مساحة الدائرة A = الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر r^2.

$$A= \pi r^2$$

$$A= \pi \times r^2$$

$$A = \pi \times (r \times r)$$

أي أن عملية إيجاد طول نصف القطر يجب أن تكون عمليةٌ معاكسة لعملية حساب مساحة الدائرة حيث يتوجب أن تكون علاقة تجذير تربيعي ، أي عملية إيجاد الجذر التربيعي لمساحة الدائرة مقسوماً على الثابت باي π.

$$r = \sqrt{A/\pi}$$

مثال :

$$A = \pi r^2$$

$$A = \pi \times r^2$$

$$A = \pi \times 7^2$$

$$A = \pi \times 49$$

$$A = \pi \times 49 = 154$$

مساحة الدائرة A تساوي الثابت باي π ضرب نصف القطر مرفوعاً للقوة الثانية r^2 .

طول نصف القطر r يساوي الجذر التربيعي لمساحة الدائرة على الثابت باي.

$$r=\sqrt(A/\pi)$$

$$r=\sqrt(154/\pi)=15.6$$

إذا كان لدينا عنصرٌ ما (مساحة الدائرةA) يساوي ناتج ضرب عنصرين ببعضهما البعض أحدهما مرفوعٌ للقوة الثانية (نصف القطرr^2) ببعضهما البعض فإن العنصر المرفوع للقوة الثانية (نصف القطر مثلاً r^2 مجرداً من قوته r يساوي الجذر التربيعي لناتج قسمة العنصرين الآخرين على بعضهما البعض .

$$r=\sqrt{A/\pi}$$

و هذه هي العلاقة المعاكسة لعلاقة حساب مساحة الدائرة و هي علاقةٌ شديدة الأهمية لأنها تمكننا من معرفة طول نصف القطر إذا علمنا مساحة الدائرة.

كيف أحسب مثل هذه العلاقة بشكلٍ صحيح ؟

بدايةً أحسب ما تحت الجذر أي أقوم بإيجاد ناتج قسمة A/π و بعد أن أحسب ناتج القسمة أقوم بتجذيره تجذيراً تربيعياً .

مثال :

بدايةً اقسم مساحة الدائرة اي 154 على الثابت باي π فاحصل على 46 و بعد ذلك أقوم بتجذير الرقم 46 فأحصل تقريباً على الرقم الذي يمثل طول نصف القطر و هو 6.78 سنتمتر .

مساحة الدائرة A تساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر r^2

$$A = \pi r^2$$

أي أن نصف القطر مرفوعاً للقوة الثانية r^2 يساوي مساحة

الدائرة A تقسيم الثابت باي π

$$r^2=(A/\pi)$$

إذا كان لدي عنصرٌ يساوي ناتج ضرب عنصرين ببعضهما البعض أحدهما مرفوعٌ للقوة الثانية فإن ذلك العنصر المرفوع للقوة الثانية r^2 (و ليس مجرداً من القوة r كما في الأمثلة السابقة) يساوي ناتج قسمة الناتج على العنصر الآخر (و ليس ناتج قسمة الجذر التربيعي لناتج قسمة الناتج على العنصر الآخر) .

$$A=B\times C^2$$

$$C^2 = \frac{A}{B}$$

بينما :

$$C = \sqrt{(A/B)}$$

الجذر التربيعي مرتبطٌ بوجود القوة الثانية لأن التجذير التربيعي هو العملية المعاكسة لعملية الرفع للقوة الثانية.

$$1600 = 100 \times 4^2$$

$$4^2 = 1600 \div 100$$

$$4=\frac{\sqrt{1600}}{100}$$

إذا نزعنا عن العنصر قوته فإننا نقسم دون تجذير.

إذا أردنا أن نتخلص من القوة الثانية فإننا نستخدم الجذر التربيعي.

التدوين العلمي SCIENTIFIC NOTIFICATION

يستخدم أسلوب التدوين العلمي للتعبير عن الأرقام البالغة الضخامة أو المتناهية الضآلة وفق الصيغة :

$$a\times10^{n}$$

حيث يجب أن تكون a ما بين 1 و 10 .

$$1 < 10 \le a$$

تكون القوة موجبة إذا كان الرقم أكبر من واحد و تكون سلبية إذا كان الرقم أدنى من واحد.

قسمة و ضرب التدوينات العلمية

لضرب و قسمة التدوينات العلمية فإننا نقوم أولاً بتجزئة التدوينة العلمية إلى رقمٍ و قوة .

مثال :

2000 000 ×310 000

التدوينة العلمية للرقم 2000000 هي :

$$2 \times 10^{6}$$

أما التدوين العلمي للرقم 310000 فهو 3.1×10^{5}

الأن نقوم بفصل الرقم عن القوة ، أي أننا نقوم بفصل العدد 2 عن القوة 10^{6} ، كما نقوم بفصل الرقم 3.1 عن القوة 10^{5} :

$$(2\times10^{6})\ (3.1\times10^{5})$$

$$(2\times10^{6}) \times (3.1\times10^{5})$$

الآن نضرب الرقمين ببعضهما البعض أي نضرب 3.1 بالعدد 2 ، كما نضرب القوى ببعضها البعض أي أننا نضرب 10^5 بالقوة 10^6 :

$$(2\times3.1)\ (10^6\times10^5)$$

$$(2\times3.1)\times(10^6\times10^5)$$

ننفذ عملية الضرب المعلقة :

$$2\times3.1=6.2$$

$$2\times3=6$$

$$2\times1=2$$

نضرب القوى ببعضها البعض أي أننا نضرب القوة 10^6 بالقوة 10^5 ، و كما علمنا فإن ضرب قوتين متماثلتين يعني جمع القوتين مع بعضهما البعض :

$$10^6\times10^5=10^{6+5}=10^{11}$$

$6+5=11$

نضرب الرقم النهائي بالقوة النهائية

$$6.2\times10^{11}$$

ما هو ناتج ضرب 620000×4000000؟

نقوم بتحويل هذين الرقمين إلى تدوينتين علميتين فنحصل على :

$$(4\times10^{6})\ (6.2\times10^{5})$$

$$(4\times10^{6})\times(6.2\times10^{5})$$

نعد الأصفار بعد النقطة العشرية في التدوينة أي بعد العدد 6 :

لضرب هاتين التدوينتين نفصل الرقمين أي 6.3 و 4 عن القوتين أي 10^5 و 10^6.

نضرب الرقمين ببعضها البعض كما نضرب القوتين ببعض ، ثم نضربها جميعاً ببعض.

$$(4\times6.2)\ (\ 106\times105)$$

$$(4\times6.2)\times(\ 10^{6}\times10^{5})$$

لا تضع في الامتحان شارة ضرب بين قوسين .

$$4\times6.2=24.8$$

نضرب القوتين ببعضها البعض و كما مر معنا فإننا عندما حتى نضرب قوتين متماثلتين ببعضهما البعض فإننا نجمع هاتين القوتين مع بعضهما البعض :

$$10^6\times10^5=10^{6+5}=10^{11}$$

فنحصل على 24.8×10^{11}

و كما ترون فإن الرقم 24 أكبر من عشرة أي أنه لا يقع ما بين 1 و 10 و لذلك فإننا نقسمه على عشرة :

$24\div10=2.4$

و حتى نوازن عملية القسمة على عشرة التي أجريناها على الرقم 24 فإننا نضرب القوة 10^{11} بالرقم عشرة حتى نحافظ على الرقم دون تغيير :

$$10^{11}\times10=10^{11}\times10^1=10^{11+1}=10^{12}$$

حتى نضرب قوتين متماثلتين ببعضهما البعض فإننا نجمع هاتين القوتين مع بعضهما البعض.

فنحصل على النتيجة التالية :

$2.48×10^{12}$

تذكر دائماً بأن الرقم الموجود قبل النقطة العشرية يجب أن يكون بين واحد و عشرة فقط ، أما إذا كان أكبر من عشرة ، أي إذا كان 12 مثلاً فإننا نقسم على عشرة فنحصل على :

$11÷10=1.1$

و لموازنة عملية القسمة على عشرة التي قمت بها و حتى أحافظ على قيمة الرقم دون تغيير فإنني أضرب القوة بعشرة.

قسمة التدوينات العلمية

ما هي نتيجة قسمة هاتين القوتين :

$$7.8631\times10^{16}\div8.3282\times10^{14}$$

نقوم أولاً بقسمة هذين الرقمين على بعضهما البعض :

$$7.8631\div8.3282=0.9306912184$$

ثم نقسم القوتين على بعضها البعض :

$$10^{16}\div10^{14}$$

$$7.8631\times10^{16}\div8.3282\times10^{14}=0.9306912184^{16-14}$$

$$10^{16}\div10^{14}=10^{16-14}=10^{2}$$

ذلك أن قسمة قوتين متماثلتين على بعضهما البعض تعني طرح هاتين القوتين من بعضهما البعض.

16-14=2

و بالتالي يصبح ناتج القسمة :

0.9306912184^2

مسألة في التدوينات العلمية

إذا كان اختبار الحمض النووي دي إن إي DNA يتطلب توفر 1 واحد مليمتر أي $0.001=(1\times10^{-3})$ وإذا كانت أجزاء الحمض النووي المتوفرة يبلغ طولها على التوالي :

3×10^{-6} m

7.5×10^{-5} m

4.3×10^{-4} m

7.6×10^{-4} m

كم يبلغ مجموع قصاصات الحمض النووي DNA هذه و هل تكفي لإجراء فحص البصمة النووية ؟

هل يمكننا جمع أطوال عينات الحمض النووي هذه مع بعضها البعض؟

لا بالطبع فلكي نتمكن من جمع أطوال قصاصات الحمض النووي هذه مع بعضها البعض يتوجب أولاً القيام بتوحيد قوى تلك القصاصات .

و لكن إلى أية قوة نقوم بتوحيد هذه القوى المختلفة؟

بما أن هدفنا يتمثل في مقارنة مجموع هذه الأطوال مع أقل طول يمكن عند التوصل إليه إجراء اختبار البصمة النووية و هو واحد 1 مليمتر $0.001=(1\times10^{-3})$ فإنه يتوجب علينا تحويل تلك القوى جميعها إلى القوة السلبية الثالثة -3 التي هي القوة التي تمثل مقدار 1 مليمتر لأنها هي الطول القياسي الذي سوف نقوم به النتائج .

نقوم بالتحويل وفق الطريقة السابقة :

بالنسبة لطول العينة الأولى 3×10^{-6} m للتحويل من 3×10^{-6}

m إلى الطول القياسي 3×10^{-3} m فإننا نضرب القوة

10^{-6} بالقوة الموجبة 10^{3} ، لأن عملية ضرب القوى هي

عملية جمع :

$$10^{-6}\times10^{3}=10^{-6+3}=10^{-3}$$

لأن

$$-6+3=-3$$

و بالطبع فإن 10^{3} و هي القوة الموجبة التي

ضربت بها 10^{-6} حتى تصبح 10^{-3} و هذه

القوة الموجبة أي 10^{3} تساوي :

$$10^{3}=10\times10\times10=1000$$

أي أن قوة الرقم قد ازدادت بمقدار ألف 1000 ، و حتى

نوازن هذه الزيادة و حتى يبقى الرقم بنفس قيمته السابقة

فإننا نقوم بقسمة الرقم 3 على ذات الرقم الذي ضربنا به قوته أي أننا نقوم بقسمته على 1000 .

$$3\div1000=0.003$$

ثلاثة بالألف يصبح الرقم على الشكل التالي :

$$0.003\times10^{-3}$$

هل هذين الرقمين متساويين فعلياً؟

نتأكد من ذلك باستخدام الآلة الحاسبة :

$$3\times10^{-6}=0.000003$$

هذه قيمة الرقم الأصلي قبل التعديل.

قيمة الرقم الذي توصلنا إليه بعد التحويل :

$$0.003\times10^{-3}=0.000003$$

القيمة ذاتها أي أن عملية التحويل التي قمت بها صحيحة.

الآن أقوم بتحويل الرقم الثاني أي طول العينة الثانية **7.5×10^{-5} m**

لتحويل القوة من 10^{-5} إلى 10^{-3} فإنني أضرب بالقوة الموجبة 10^2 ذلك أن عملية ضرب القوى ليست إلا عملية جمعٍ للقوى :

$$10^{-5}\times10^{2}=10^{-5+3}=10^{-3}$$

لأن

$$-5+2=-3$$

القوة الثانية أي 10^2 تساوي :

$$10^{2}=10\times10=100$$

الآن بعد أن ضربت بالقوة الثانية أي بعد ان أضفت 2 موجب فذلك يعني بأن قيمة الرقم قد ازدادت و لم تعد كما كانت في السابق ، و حتى أعيد للرقم قيمته السابقة ، و كما ضربت قوة الرقم بالقوة الثانية الموجبة 10^2 أي :

$$10^{2}=10\times10=100$$

فإنني أقسم الرقم المرافق للقوة على مئة 100 فاقول :

$$7.5\div100=0.075$$

فيصبح الرقم على الشكل التالي :

$$0.075\times10^{-3}$$

أتأكد من صحة عملية التحويل التي قمت بها باستخدام الالة الحاسبة :

قيمة الرقم الأصلي 7.5×10^{-5} m

$$7.5\times10^{-5}=0.000075$$

قيمة الرقم بعد أن قمت بتحويله :

$$0.075\times10^{-3}=0.000075$$

القيمة ذاتها أي أن عملية التحويل صحيحة

و الان أقوم بتحويل الرقم 4.3×10^{-4} m

لتحويل القوة من ناقص 4 أي 10^{-4} إلى ناقص ثلاثة 10^{-3} (المقياس) فإننا نضرب بالقوة 10^{-1} حيث أن عملية ضرب القوى هي عملية جمع :

$$10^{-4}\times10^{1}=10^{-4+1}=10^{-3}$$

$$10^{1}=10$$

لأن

$$-4+1=-3$$

$$-4+1=-3$$

تصور بأنه كان عليك دين 3$ دولارات (قيمة سلبية ، دين) و أنك قمت بتسديد دولار واحد (موجب) فذلك يعني بأنه تبقى عليك دين قيمته ثلاثة دولارات -3.

و بما أننا ضربنا القوة بعشرة فذلك يعني بأن القوة قد ازادت ، و حتى نحافظ على قيمة الرقم الأصلية فإننا نجري عمليةً معاكسة على الرقم المرافق للقوة أي أننا نقوم بقسمة الرقم المرافق للقوة على عشرة:

$$4.3 \div 10 = 0.43$$

ليصبح الرقم على الشكل التالي :

$$0.43 \times 10-3$$

أتأكد من صحة العملية التي قمت بها باستخدام الآلة الحاسبة :

قيمة الرقم الأصلي $4.3 \times 10^{-4}\ m = 0.00043$

قيمة الرقم الجديد :

$$0.43\times10^{-3}=0.00043$$

القيمتين متساويتين إذاً فإن عملية التحويل التي قمت بها صحيحة .

لأن المطلوب رفع الرقم للقوة الثالثة (القوة القياسية في هذه المسألة) مع المحافظة على قيمته الأصلية.

الآن أقوم بتحويل الرقم الأخير $7.6\times10^{-4}\ m$

لتحويل القوة من ناقص 4 أي 10^{-4} إلى ناقص 3 أي 10^{-3} فإننا نضرب بالقوة العاشرة أي 10 التي تساوي بالطبع 10^{1} ذلك أن عملية ضرب القوى ليست إلا عملية جمع للقوى :

$$10^{-4}\times10^{1}=10^{-4+1}=10^{-3}$$

$$10^{1}=10$$

لأن

$$-4+1=-3$$

و بذلك تكون القوة قد ازدادت لأننا ضربناها بعشرة أي أن قيمة الرقم الأصلي قد ازادت و لكي نعيد الرقم إلى قيمته الأصلية فإننا نقسم الرقم المرافق للقوة على عشرة ، أي أننا نجري عمليةً معاكسة لعملية الضرب التي أجريناها على القوة و بالقيمة ذاتها :

$$7.6\div10=0.76$$

و بذلك فإن الرقم يصبح على الشكل التالي :

0.76×10^{-3}

أتأكد من صحة العملية التي قمت بها :

$$7.6\times10^{-4}=0.00076$$

قيمة الرقم بعد التحويل :

$$0.76\times10^{-3}=0.00076$$

إذاً فإن العملية التي قمت بها صحيحة .

الآن نصل إلى الخطوة الأخيرة و التي تتمثل في جمع أطوال جميع العينات بعد أن قمت بتوحيد قواها و ذلك لمعرفة ما إذا كان طولها النهائي يساوي 1 ميلمتر أي أنه يكفي لإجراء اختبار البصمة الوراثية أم لا .

$$0.003+0.075+0.43+0.76=1.268$$

$$1.268\times10^{-3}=0.000001268$$

المقدار المتوفر من عينات الحمض النووي DNA أطول من 1 ميليمتر و التي تُساوي

1×10^{-3} 1 mm أي أنه يكفي لإجراء اختبار البصمة الوراثية Genetic fingerprints

---

استخدام الحاسبة في حساب القوى في التدوينات العلمية Scientific notation

حساب التدوينة العلمية على الآلة الحاسبة :

إذا كانت الحاسبة تحتوي على زر حساب التدوينة العلمية $X10^x$ فذلك يمكننا من حساب التدوينات العلمية على الحاسبة بشكلٍ آلي .

مثال :لحساب قيمة التدوينة العلمية 9×10^3 :

نضغط زر العدد 9 ثم زر القوة العشرية $X10^x$ ثم نضغط زر العدد 3 لرفع الرقم عشرة للقوة الثالثة .

و إن لم تحتوي الآلة الحاسبة على زر حساب التدوينة العلمية فإننا نستخدم زر الرفع للقوة :

$$9\times10^3$$

ندخل العدد 9 ثم شارة الضرب ثم ندخل الرقم عشرة 10 ثم نضغط زر الرفع للقوة X^Y

ثم ندخل العدد 3 فيرتفع الرقم عشرة للقوة الثالثة .

تعليق على المسألة السابقة :

لا يتطلب اختبار الحمض النووي بالضرورة 1 مل من العينة؛ ومع ذلك، يُعد هذا الحجم معيارًا شائعًا، خاصةً للدم، لضمان نتائج عالية الجودة. تختلف الكمية المطلوبة فعليًا بناءً على نوع العينة، والتقنية المستخدمة، والهدف من الاختبار.

المتطلبات الرئيسية والاختلافات:

عينات الدم: على الرغم من أن 1-5 مل من الدم تُطلب عادةً لاختبارات الحمض النووي، تشير بعض الدراسات إلى أن 1 مل كافٍ، مع ملاحظة انخفاض طفيف في جودة بعض العينات (مؤشرات DIN) مقارنةً بعينات 3-4.5 مل. بالنسبة للرضع، يُطلب عادةً 1 مل.

عينات اللعاب: غالبًا ما تتطلب مجموعات اختبار الحمض النووي 1.5-2.0 مل من اللعاب لضمان الحصول على كمية كافية من الحمض النووي.

عينات بديلة:

مسحات الخد: يمكن استخلاص الحمض النووي من خلايا الفم باستخدام مسحة دون الحاجة إلى كمية كبيرة من السائل.

العينات الجنائية: تُستخدم كميات أقل بكثير في أغلب الأحيان، حيث يمكن إجراء بعض التحليلات باستخدام 0.001 نانوجرام لكل ميكرولتر (نانوجرام/ميكرولتر) من الحمض النووي، وفقًا للمعايير الجنائية.

مصفوفات أخرى: يُستخدم من 0.5 إلى 2 مل من الدم للحيوانات الأليفة الصغيرة، ومن 1 إلى 4 مل من السائل الأمنيوسي عادةً للفحوصات قبل الولادة.

يمكن للتقنيات الحديثة والحساسة، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، الحصول على نتائج من كميات ضئيلة جدًا من الحمض النووي الأولي، مما يجعل 1 مل من السائل، مثل الدم أو اللعاب، أكثر من كافٍ في معظم الحالات.

باختصار، يُعد 1 مل 1 milliliter, واحد ميلي ليتر (1(mL **غالبًا الحد الأدنى أو المعيار المطلوب للاختبارات التشخيصية التقليدية عالية الإنتاجية، ولكنه ليس الحد الأدنى العالمي لجميع تقنيات تحليل الحمض النووي.**

مسائل هندسية

لدينا أسطوانة تبلغ مساحة مقطعها العرضي الدائري $4cm^2$ سنتمتر مربع و يبلغ ارتفاعها أربعة أضعاف نصف قطر مقطعها العرضي الدائري r ، فكم يبلغ نصف قطرها r .

احسب حجم هذه الأسطوانة .

بيانات المسألة :

تبلغ مساحة مقطعها العرضي الدائري $4cm^2$ سنتمتر مربع .

ارتفاع هذه الأسطوانة يبلغ أربعة أضعاف نصف قطر مقطعها الدائري.

$$h=4r$$

$$h=4\times r$$

إن حجم هذه الأسطوانة V يساوي المساحة السطحية للمقطع الدائري للأسطوانة ضرب ارتفاع الأسطوانة :

Cross-section × height

تتضمن عمليات حساب المساحة ضرب بعدين اثنين فقط ببعضهما البعض (بعدين يقعان على مستوي واحد أو صفحة واحدة).

تتضمن عمليات حساب الحجم ضرب جميع أبعاد الشكل الهندسي ببعضها البعض (ضرب الأبعاد الثلاثة ببعضها البعض) .

أي

$$\pi r^2 h$$

$$\pi \times r^2 \times h$$

حيث أن πr^2 هي مساحة المقطع العرضي الدائري للأسطوانة (مساحة الدائرة) أما h فهو ارتفاع الأسطوانة (ارتفاع المستطيل المكون للأسطوانة) :

$$Area(A) = \pi r^2$$

مساحة الدائرة A تساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر r^2.

الآن حتى نحسب حجم الأسطوانة فإن علينا أن نعرف ارتفاعها الذي قيل لنا بأنه يساوي أربعة أضعاف نصف قُطرها ، فكيف نحسب نصف قطر المقطع العرضي الدائري للأسطوانة؟

كما مر معنا سابقاً في بحث الجذور فإن بإمكاننا ان نحسب نصف قطر الدائرة إذا عرفنا مساحتها ، فإذا كان لدي معادلة ناتجها يساوي ناتج ضرب عنصرين ببعضهما البعض أحدهما مرفوعٌ للقوة الثانية كما هي الحال في معادلة حساب مساحة الدائرة :

$$Area(A) = \pi r^2$$

فإننا نحصل على قيمة العنصر المرفوع للقوة الثانية مجرداً من القوة الثانية تلك و هو هنا نصف قطر الدائرة r^2 و ذلك عندما نقسم الناتج A (أي مساحة سطح الدائرة) على العنصر الآخر غير المرفوع لقوة و هو هنا الثابت باي π ثم القيام بتجذير الناتج تجذيراً تربيعياً :

$$Rdius(r) = \sqrt{a/\pi}$$

ذلك أن عملية التجذير التربيعي هي العملية المعاكسة لعملية الرفع للقوة الثانية r^2 كما أن عمية القسمة $\sqrt{a/\pi}$ هي العملية المعاكسة لعملية الضرب r^2 π أي

$$\pi \times r^2$$


و بالتالي فإن حجم هذه الأسطوانة يُساوي 4h أي 4 سنتمتر مربع (مساحة المقطع العرضي الدائري) ضرب الارتفاع.

وذلك لأن مساحة المقطع العرضي الدائري لهذه الأسطوانة هي هنا $4cm^2$ سنتمتر مربع ضرب الارتفاع h تساوي حجم هذه الأسطوانة :

$$4h = 4 \times h$$

ارتفاع هذه الأسطوانة h يساوي أربع أضعاف نصف القطر r :

4r



إن ارتفاع هذه الأسطوانة h يساوي :

h=4r

و بما أن مساحة المقطع الدائري لهذه الأسطوانة يساوي $4cm^2$ سنتمتر مربع و بما أن ارتفاع هذه الأسطوانة يبلغ أربعة أضعاف نصف قطرها، فإن ارتفاع هذه الأسطوانة يساوي :

$$4\times4r=16\ r$$

الأربعة الأولى هي مساحة المقطع الدائري للأسطوانة أما الأربعة الثانية أي 4r فهي ارتفاع الأسطوانة و الذي يبلغ أربعة أضعاف نصف القطر 4 الذي لم نعرف طوله حتى الآن .

الأربعة الأولى هي $4cm^2$ سنتمتر مربع مساحة المقطع الدائري للأسطوانة.

الأربعة الثانية 4r هي ارتفاع الأسطوانة الذي يساوي 4 أضعاف نصف قطرها 4 أي

4r.

نصف قُطر الأسطوانة = مساحة الأسطوانة 4 سنتمتر تقسيم الثابت باي.

لأن مساحة المقطع العرضي الدائري للأسطوانة تساوي مربع نصف القطر r^2 ضرب

الثابت باي π.

و بالتالي فإن طول نصف القطر مجرداً من القوة يساوي الجذر التربيعي لناتج قسمة مساحة الدائرة على الثابت باي.

$$\text{Rdius(r)}= \sqrt{4/\pi}$$

إذا كانت لدينا قيمة ما هي (هنا المساحة) هي ناتج ضرب قيمتين اثنتين إحداهما مرفوعة للقوة الثانية (نصف القطر) ببعضهما البعض فإن القيمة المرفوعة للقوة الثانية (نصف القطر) تساوي الجذر التربيعي لناتج قسمة ناتج عملية الضرب (مساحة المقطع العرضي الدائري) على القيمة الثانية غير المرفوعة لقوة (الثابت باي).

كيف أحسب $\sqrt{4/\pi}$ ؟

بداية أقوم بإجراء عملية القسمة التحت جذرية $4/\pi$ و بعد ذلك أقوم بتجذير الناتج تجذيراً تربيعياً.

$$4/\pi=1.13$$

نصف قطر المقطع العرضي الدائري (نصف قطر دائرة الأسطوانة)

$$\sqrt{4/\pi} = 1.13$$

أضرب الناتج الذي يُمثل نصف القطر 1.13 بالعدد 4 حتى أحسب ارتفاع الأسطوانة.

لماذا ؟

لأنه و حسب بيانات هذه المسألة فإن ارتفاع هذه الأسطوانة يساوي أربعة أضعاف قُطرها :

$$4 \times 1.13 = 4.52 cm$$

هو ارتفاع الأسطوانة.

الآن حتى أحسب حجم الأسطوانة فإنني أضرب مساحة مقطعها العرضي الدائري و التي تبلغ 4 سنتمتر مربع بارتفاعها الذي يبلغ 4.52 :

$$4 \times 4.52 = 18.8 cm^3$$

18.8 سنتمتر مكعب هو حجم الأسطوانة.

حجم الأسطوانة يبلغ 18 سنتمتر مكعب تقريباً.

اتأكد من النتيجة التي توصلت إليها   عن طريق تطبيق معادلة حساب سطح الدائرة :

$$Area(A) = \pi r^2$$

مساحة الدائرة تُساوي الثابت باي π ضرب مربع نصف القطر r^2 .

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة:

$$Area(A) = \pi \times 1.13^2 = 4\ cm^2$$

مساحة المقطع الدائري التي بدأنا بها المسألة.

إذاً فإن الحل الذي توصلنا إليه صحيح.

ملاحظة هامة :

في حال لم تحصل على نتائج صحيحة جرب تغيير الآلة الحاسبة حيث تختلف النتائج قليلاً من حاسبة لأخرى عند إجراء العمليات على أرقام معقدة ، و من وجهة نظري أعتقد بأن الحاسبات الافتراضية الموجودة في الهواتف الذكية هي اكثر دقة من الحاسبات الموجودة في بعض أنظمة التشغيل ويندوز.

المعادلات الرياضية

استراتيجيات حل المعادلات الرياضية

عزل العنصر المجهول

إن حل المعادلة يتطلب منا عزل العنصر المجهول في أحد طرفي المعادلة و يتم ذلك عن طريق إجراء عملية معاكسة للعملية الجارية على العنصر المجهول شريطة أن نجري العملية ذاتها كذلك على الطرف الآخر من المعادلة حتى نحافظ على توازن و تعادل طرفي المعادلة.

كل ما نجريه من عمليات رياضية على أحد طرفي المعادلة يتوجب أن نقوم به كذلك على طرفها الآخر حتى نحافظ على تعادلها.

عزل العنصر المجهول X ووضعه منفرداً في احد طرفي المعادلة و يتم ذلك من خلال إجراء عملياتٍ معاكسة على القيمة المجهولة ، مع التنبيه إلى ضرورة القيام بإجراء العمليات ذاتها كذلك على طرف المعادلة الاخر.

الاستراتيجية الثانية في حل المعالات :

طرح عنصرٌ من كلا طرفي المعادلة

و هذه الطريقة تمكننا من حذف عنصرٍ من المعادلة دون أن يختل التوازن بين طرفيها.

مثال :

$$X+6=15$$

لحل هذه المعادلة فإننا نجري عمليةً معاكسة لعملية الجمع حيث نقوم بطرح العنصر 6 من كلا طرفي المعادلة

$$X+6=15$$

$$X+6-6=15-6$$

$$X+6-6=15-6$$

$$6-6=0$$

و بذلك فقد أصبح بإمكاننا إن نحذف العدد 6 من طرف المعادلة الأيسر أو أن ننقله من طرف المعادلة الأيسر إلى طرفها الأيمن و بهذه الطريقة فإننا نكون قد تمكنا من عزل مجهول المعادلة في أحد طرفيها .

$$15-6=9$$

اي ان المعادلة قد أصبحت على الصورة التالية :

$$X=15-6$$

$$15-6=9$$

أي أن

$$X=9$$

إن الاستراتيجية الأولى في حل المعادلات تتمثل في طرح أحد العناصر من كلا طرفي المعادلة و عند طرح عنصرٍ من نفسه فإننا نتخلص منه لن ناتج طرح عنصرٍ من نفسه هو الصفر بينما يبقى ذلك العنصر في الطرف الثاني ، أي ان هذه الطريقة تمكننا من نقل عنصر ما من أحد طرفي المعادلة إلى طرفها الاخر و ذلك حتى نتمكن من عزل مجهولها في أحد طرفيها.

إذاً كما مر معنا سابقاً فإن الاستراتيجية الأولى في حل المعادلات تتمثل في طرح عنصرٍ من كلا طرفي المعادلة و ذلك عندما تكون العملية الجارية في المعادلة هي عملية جمع.

الاستراتيجية الثانية في حل المعادلات تتمثل في جمع أحد العناصر في المعادلة مع كلا طرفي المعادلة ، أي إضافة ذلك العنصر إلى نفسه و إلى الناتج ، و نحن نقوم بذلك عندما تكون العملية الجارية على ذلك العنصر هي عملية طرح ، أي أننا نجري عمليةً معاكسة للعملية الجارية.

مثال :

$$X-16=4$$

$$X-16+16=4+16$$

قمت بجمع الرقم 16 مع كلا طرفي المعادلة و ذلك حتى أتمكن من عزل مجهول المعادلة X في أحد طرفيها

$$-16+16=0$$

قيمتين متماثلتين متعاكستي الشارة ناتج جمعهما يُساوي الصفر(الرقم 16 الأول سالب بينما الرقم 16 الثاني موجب)

لتصبح المعادلة على الصورة التالية :

$$X=4+16\rightarrow X=20$$

إذا كانت العملية الجارية على العنصر الذي نريد نقله للطرف الآخر عملية جمع فإننا على الأغلب نطرح ذلك العنصر من نفسه و من الناتج اي أننا نقوم بطرحه من كلا طرفي المعادلة .

إذا كانت العملية الجارية على العنصر الذي نريد نقله للطرف الآخر عملية طرح فإننا على الأغلب نجمع ذلك العنصر مع نفسه و مع الناتج اي أننا نقوم بجمعه مع كلا طرفي المعادلة .

إذا كانت العملية الجارية على العنصر عملية ضرب فإننا نجري عمليةً معاكسة، أي عملية قسمة حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على ذلك العنصر المعلوم

$$4X=100$$

$$(4)\ (X)=100$$

$$(4)\times(X)=100$$

العملية الجارية هي عملية ضرب نقوم بعكسها فتتحول إلى عملية قسمة:

حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على العنصر المعلوم 4

$$\frac{4X}{4}=\frac{100}{4}$$

ننفذ عمليات القسمة المعلقة القابلة للتنفيذ :

$$4X\div4=1X=X$$

لأن $4\div4=1$

$$100 \div 4 = 25 \rightarrow$$

$$\frac{100}{4} = 25$$

$$X = 25$$

إذا كانت العملية الجارية هي عملية قسمة فإننا نعكسها عن طريق ضرب العنصر المعلوم بكلا طرفي المعادلة :

$$\frac{X}{5} = 6$$

نضرب الطرف المعلوم التي تجرى عليه عملية القسمة أي العدد 5 بكلا طرفي المعادلة :

$$\frac{X}{5} = 6$$

$$6 \times 5 = 30$$

$$X = 30$$

يعتمد حل المعادلات على إعادة ترتيبها بحيث نتمكن من عزل العنصر المعلوم في أحد طرفيها.

إن عزل العنصر المجهول في أحد طرفي المعادلة يمكننا من معرفة قيمة مجهولها.

تبقى المعادلة في حالة تعادلٍ و اتزان طالما أننا نقوم بإجراء كل عملية على كلا طرفي المعادلة .

كل زيادة او نقص تطرأ على أحد طرفي المعادلة يجب أن تواكبها زيادةٌ أو نقصٌ مماثلين على طرف المعادلة الاخر.

و لكن الأمور لا تسير دائماً بهذه الصورة فقد تصادفك معادلة يتكرر فيها العنصر المجهول X في كلا طرفي المعادلة ، كما قد تصادفك معادلةٌ اخرى تحوي أكثر من عملية رياضية واحدة فقد تجد معادلةٌ تحتوي مثلاً عمليتين أو ثلاث عمليات رياضية مختلفة (ضرب و جمع و طرح) كما في المثال التالي:

$$6X-5=X+10$$

كما ترون فإن العنصر المجهول X موجودٌ في كلا طرفي المعادلة .

تحتوي المعادلة السابقة على ثلاث عملياتٍ رياضية : ضرب 6X اي $6\times X$ و طرح و جمع .

نقوم بنقل العنصر المجهول X إلى طرف المعادلة الآخر وذلك من خلال طرحه من كلا طرفي المعادلة :

$$6X-5-X=X+10-X$$

نطرح المجهول X من نفسه في الميسرة :

$$6X-5-X=X+10-X$$

أي متغيرٍ حرفي لا يسبقه عاملٌ عددي فذلك يعني بأن عامله العددي هو العدد واحد.

الطرف الثاني :

$$X-X=0$$

ناتج طرح قيمتين متماثلتين من بعضهما البعض هي الصفر .

و بذلك فقد تمكنا من نقل العنصر المجهول X إلى طرف المعادلة الأيسر.

$$6X-5-X= 10$$

الآن نعكس عملية الطرح الواقعة على العدد 5 حيث نقوم بجمعه مع كلا طرفي المعادلة:

$$6X-5-X+5= 10+5$$

كما ترون فقد أصبح لدينا في ميمنة المعادلة عنصرين متماثلين متعاكسي الشارة أي أن ناتج جمعهما الصفر:

$$-5- +5=0$$

لتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$6X-X= 10+5$$

اي متغيرٍ حرفي لا يسبقه عاملٌ عددي فذلك يعني بأن عامله العددي هو العدد واحد.

الطرف الثاني :

$$6X-1X= 10+5$$

$$6X-X=6X-1X=5X$$

لتصبح المعادلة على الصورة التالية :

$$5X= 10+5$$

$$5X= 15$$

لتصبح المعادلة على الشكل التالي :

$$5X= 15$$

وصلنا إلى عملية ضرب نقوم بعكسها لتتحول إلى عملية قسمة :

لدينا عملية ضرب لحل المعادلة نقوم بعكسها لتتحول إلى عملية قسمة

$$X = \frac{15}{5} = 15 \div 5 = 3$$

$$X=3$$

نتأكد من صحة الحل الذي توصلنا إليه عن طريق إبدال المجهول X أينما ورد بالحل الذي توصلنا إليه أي العدد 3 :

$$6X-5=X+10$$


$$6(3)-5=(3)+10$$

$$6\times(3)-5=(3)+10=$$

$$18-5=(3)+10=$$

$$13=13$$

الحل صحيح



المعادلات في الحياة الواقعية

يبلغ العجز التجاري في ميزانية إحدى الدول 16 مليار(عملة محلية منخفضة القيمة) ، و يزيد هذا العجز بمقدار 3 مليارات شهرياً ، فإذا استمر الوضع على ما هو عليه فبعد كم شهر سوف يصبح هذا العجز 40 مليار ؟

بيانات المسألة :

قيمة العجز الأساسي في الميزانية 16 مليار.

لحل هذه المسألة نضع القيمة الحالية للعجز في الميزانية و التي تبلغ 16 مليار و نضيف إليها عملية ضرب (عامل ضرب) حيث نضرب معدل الزيادة في العجز أي 3 مليارات بمجهول X يمثل عدد الأشهر اللازمة .

معدل الزيادة أي 3 مليارات شهرياً مضروباً بمجهول هو عدد الأشهر اللازمة ، أما الناتج و هو 40 مليار فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$16+3X=40$$

كما ترون فإن **العملية الأولى في المعادلة هي عملية جمع** $16+3X$ و

لذلك فإننا **لحل هذه المعادلة فإننا نعكسها و نقلبها إلى عملية طرح ثم نطرح العنصر المعلوم 16 من كلا طرفي المعادلة** :

$$16+3X-16=40-16$$

ننفذ العمليات الرياضية المعلقة :

$$16-16=0$$

و بذلك فإننا نكون قد تخلصنا من الرقم 16 في ميمنة المعادلة .

$$40-16=24$$

لتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$3X=24$$

$$3\times X=24$$

كما ترون فإن العملية الرياضية الوحيدة التي بقيت في المعادلة هي عملية ضرب نعكسها لتتحول إلى عملية قسمة ثم نقسم المقسوم عليه المعلوم 3 من كلا طرفي المعادلة فنقول :

$$\frac{\cancel{3}X}{\cancel{3}}=\frac{24}{3}=X=\frac{24}{3}\rightarrow X=24\div3=8$$

أي أن العجز في الميزانية سوف يصل إلى 40 مليار بعد عشرة أشهر.

أتأكد من صحة العملية التي قمت بها عن طريق إبدال مجهول المعادلة بالحل الذي توصلت إليه:

$$16+3X=40$$

$$16+3(8)=40$$

$$16+24=40$$

الحل صحيح

نموذج ثاني عن تطبيق المعادلات في الحياة الواقعية :



إذا كانت نبتة الموز تنتج ورقةً كل أسبوعين و إذا كان عليها ثلاثة ورقات فكم أسبوعاً تحتاج هذه النبتة حتى يصبح عليها 13 ورقة؟

بيانات المسألة :

عدد الأوراق الموجودة على النبتة 3

معدل الزيادة ورقة كل أسبوعين 2X

الحد النهائي الذي سوف نتوقف عن الحسبة عند بلوغه هو 13 ورقة .

2X تعني هنا معدل الزيادة 2 ضرب المجهول X سوف يؤدي إلى أن يصبح عدد أوراق هذه النبتة 13 ورقة.

$$3+2X=13$$

العملية الأولى في المعادلة هي عملية جمع، نعكسها فتصبح عملية طرح حيث نطرح العنصر المعلوم 3 من كلا طرفي المعادلة :

$$3+2X-3=13-3$$

نجري العمليات الرياضية المعلقة القابلة للإجراء :

$$3+2X-3=13-3$$

$$3+-3=0$$

سواء أقلنا 3 + ناقص 3 أو قلنا بأن 3 ناقص 3 فالنتيجة صفر .

$$13-3=10$$

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$2X=10$$

العملية المعلقة هي عملية ضرب :

$$2\times X=10$$

نعكس عملية الضرب لتصبح عملية قسمة حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على العامل العددي المرافق للمجهول أي العدد 2 :

$$2X\div 2=X$$

$$10\div 2=5$$

$$X=5$$

أتأكد من صحة الحل الذي توصلت إليه عن طريق إبدال الحل الذي توصلت إليه أي العدد 5 بمجهول المعادلة **X** :

$$3+(2\times 5)=13$$

$3+10=13$

إذاً فإن الحل الذي توصلت إليه صحيح.

المعادلات القوسية

المعادلات القوسية هي المعادلات التي تحتوي على أقواس .

عندما تكون القيمة المجهولة محصورة بين قوسين فإنه من الأفضل القيام بتفكيك الأقواس قبل حل المعادلة .

نقوم بتفكيك الأقواس عن طريق ضرب ما هو خارج الأقواس بما هو داخلها.

لتكن لدي المعادلة القوسية التالية :

$$6\left(\frac{4X}{6}+6\right)-4(2-X)=11X+22$$

لحل المعادلة القوسية فإننا نبدأ بتفكيك الأقواس عن طريق ضرب ما هو خارج الأقواس بما هو داخلها :

نبدأ بضرب العدد 6 بالكسر $\frac{4X}{6}$ و كما علمنا من قبل فإننا حتى نضرب عدداً ما بكسر فإننا نقوم بتحويل ذلك العدد إلى كسر و ذلك عن طريق جعل ذلك العدد بسطاً لمقامٍ مقداره واحد 1 ، أي أن العد 6 سوف يصبح $\frac{6}{1}$ فأحصل على عملية الضرب التالية :

$$6\times\frac{4}{6}=\frac{6}{1}\times\frac{4}{6}=$$

لضرب كسرين ببعضهما البعض فإننا نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام :

$$6\times4=24$$

$$1\times6=6$$

فنحصل على الكسر التالي $\frac{24X}{6}$.

و حتى نختزل هذا الكسر فإننا نقسم كلاً من بسطه و مقامه على قاسمٍ مشترك أكبر و هو هنا العدد 6 :

$$24\div6=4$$

$$6\div6=1$$

ليصبح لدينا بعد الاختزال الكسر التالي $\frac{6X}{1}$ **أي** $6X$ **لأن أي قيمة كسرية مقامها واحد فإنا تساوي تلك القيمة ذاتها دون كسر لأن أي قيمة مقامها العدد واحد فإنها قيمةٌ صحيحة.**

$$6\left(\frac{4X}{6}+6\right)-4(2-X)=11X+22$$

الآن نأتي للعدد التالي حيث نضرب العدد 6 الموجود خارج القوس بالعدد 6 الموجود داخل القوس:

$$6\left(\frac{4X}{6}+6\right)$$

$$6\times6=36$$

و بذلك نكون قد فككنا القوس الأولى فنتجه لتفكيك القوس الثانية :

$$-4(2-X)=$$

$$-4\times2=-8$$

سالب×موجب=سالب

عدو (-) صديقك (+) = عدوك (-)

$$-4\times-X=4X$$

$$-4\times-X=+4X$$

سالب - × سالب - = موجب+

عدو (-) عدوك (-) صديقك (+)

لتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$4X+36-8+4X=11X+22$$

نقوم بتنفيذ العمليات المعلقة القابلة للتنفيذ :

$$36-8=28$$

$$4X+4X=8X$$

لا يمكن لنا أن نجمع و نطرح إلا الحدود المتشابهة أي الحدود التي يكون متغيرها الحرفي واحداً.

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$8X+28=22$$

كما ترون فإن لدي في الطرف الأول من المعادلة عملية جمع $8X+28$ و لكي أنقل الطرف المجهول إلى الطرف الثاني فإنني أعكس عملية الجمع ، أي انني اقوم بطرح هذا الحد من كلا طرفي المعادلة:

$$8X+28-8X=22-8X$$

$$8X+28-8X=11X+22-8X$$

$$8X-8X=0$$

و بذلك أكون قد نقلت الحد $-8X$ إلى طرف المعادلة الثاني و حذفته من طرفها الأول.

طبعاً لا يمكن لنا أن نطرح الحد $8X$ من 22 لأنهما حدين غير متشابهين ذلك أن الحد $8X$ يحتوي على المتغير X و لذك فإننا نقوم بطرحه من الحد $11X$ لأنهما حدين متشابهين حيث أن متغيرهما واحد و هو المتغير X :

$$11X-8X=3X$$

$$8X+28-8X=11X+22-8X$$

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$28=3X+22$$

الان نقوم بطرح الرقم 22 من الرقم 28 الموجود في طرف المعادلة و لتحقيق ذلك لابد من نقل الرقم 22 إلى طرف المعادلة الأول ، و كما علمتم فإن ذلك يتطلب منا القيام بطرح الرقم 22 من كلا طرفي المعادلة .

بما أن العملية الحالية التي يخضع لها الرقم 22 هي عملية جمع فإننا نعكس هذه العملية و نحولها إلى عملية طرح فنقوم بطرح الرقم 22 من طرفي المعادلة لتصبح معادلتنا على الشكل التالي:

$$28-22=3X+22-22$$

$$28-22=3X+22-22$$

ننفذ عمليات الطرح المعلقة القابلة للتنفيذ:

$$28-22=6$$

$$22-22=0$$

و بذلك تصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$6=3X$$

أصبحت لدينا عملية ضرب $3X$ أي $3\times X$ ، لحل هذه المعادلة فإننا نعكس عملية الضرب لتصبح عملية قسمة حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على معامل المتغير X

أي أننا نقسمهما على العدد 3 :

$$\frac{3X}{3} = 1X = X$$

$$3 \div 3 = 1$$

$$\frac{6}{3} = 2$$


$$X = 2$$

إذا كان هنالك عنصرٌ مجهول بين قوسين فإنه يتوجب علينا إزالة الأقواس قبل حل المعادلة .

هنالك طريقتين لتفكيك الاقواس الطريقة الأولى هي إجراء عملية ضرب حيث نضرب العناصر الموجودة في قوسين ببعضها البعض أو نضرب ما هو خارج القوس بما هو داخلها ، أما الطريقة الثانية لتفكيك الأقواس فهي طريقة إزالة القاسم المشترك Common factor .

مسالة :

يبلغ طول مستطيل X+4 بينما يبلغ عرضه X-6 فإذا كان محيط هذا المستطيل يبلغ 28 سنتمتر فكم تبلغ قيمة X ؟



المعادلة التي تمثل المسألة :

$$2(X+4)+2(X-6)=32$$

تعني المعادلة السابقة بأن 2 ضرب الطول + 2 ضرب العرض = 32 و هو المحيط .

2 ضرب الطول $(X+4)$ + 2 ضرب العرض $(X-6)$ = 32 و هو محيط المستطيل فكما تعلمون فإن محيط المستطيل يساوي مجموع قياس جميع أضلاعه أي 2 × الطول +2 ×العرض ، على اعتبار أن للمستطيل 4 اضلاع فإن لم نضرب كل قياس بالعدد 2 فذلك يعني بأننا قد حسبنا طول ضلعين فقط من أضلاعه و ليس 4 أضلاع:

$$2(X+4)+2(X-6)=32$$

هذه المرة سوف نقوم بحل المعادلة بطريقة مختلفة سوف تمكننا من اختصار عملية تفكيك الأقواس ، و هذه الطريقة هي طريقة القاسم المشترك حيث سنقوم بقسمة كلٍ من ناتج المعادلة أي 32 و العوامل العددية الموجودة خارج الأقواس أي 2 على قاسمٍ مشتركٍ واحد و هو كما ترون هنا العدد 2 حيث تقبل جميع هذه الأعداد القسمة التامة عليه.

$$2÷2=1$$

$$2 \div 2 = 1$$

و العدد 1 كما تعلمون هو عنصرٌ محايد بالنسبة عمليات الضرب اي أنه لا يغير من نتائجها.

$$32 \div 2 = 16$$

$$2(X+4)+2(X-6)=32$$

لتصبح معادلتنا السابقة على الشكل التالي دون عوامل و دون أقواس :

$$1(X+4)+ 1(X-6)=16$$

لا تضع العدد 1 كعامل لأي متغيرٍ حرفي و لا تضربه بقوس في الامتحان و إنما قد وضعته لأبين بأنه ناتج قسمة 2 على 2 .

$$(X+4)+ (X-6)=16$$

نقوم بتنفيذ العمليات المعلقة القابلة للتنفيذ أي أننا نقوم بجمع و طرح العناصر و الحدود المتشابهة :

$$X+X=1X+1X =2X$$

$$4+-6=-2$$

شخص كان معه 4 دولارات أتته +4 غرامة مالية مقدارها 6 دولارات -6، دفع الدولارات الأربعة التي كانت معه فلم يبقى معه شيئ 0 و بقي عليه دينٌ

مقداره دولارين لإكمال قيمة الغرامة -2 أي أن موقفه المالي قد أصبح -2$.

$$4+-6=-2$$

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$2X -2=16$$

كما ترون فإن لدينا عملية طرح -2 نقوم بعكسها و ذلك لنقل العدد -2 إلى طرف المعادلة الآخر و ذلك عن طريق جمعه مع كلا طرفي المعادلة:

$$2X -2+2=16+2$$

$$-2+2=0$$

قيمتين متماثلتين متعاكستي الشارة ناتجهما الصفر .

16+2=18

و بذلك تصبح معادلتنا على الصورة التالية :

2X=18

كما ترون فإن لدينا عملية ضرب 2X أي 2×X نعكسها فتصبح عملية قسمة .

نقسم كلا طرفي المعادلة على العامل العددي المرافق للمجهول أي أننا نقسم على 2 :

$$\frac{2X}{2}=1X=X$$

$$2 \div 2 = 1$$


$$\frac{18}{2} = 9$$

$$X = 9$$

نتأكد من صحة الحل عن طريق إبدال مجهول المعادلة بالحل الذي توصلنا إليه :

$$2(X+4)+2(X-6)=32$$

$$2(9+4)+2(9-6)=32$$



تمهل و اعطِ الأولوية

في سلسلة العمليات السابقة لدينا علاقتي ضرب و علاقة جمع و علاقة طرح ، و علاقة الضرب لها أولوية على علاقتي الجمع و الطرح كما مر معنا ، و لكن للعمليات المحصورة بين قوسين أولوية على عملية الضرب حتى و إن كانت العملية المحصورة بين قوسين أدنى أولويةً من عملية الضرب و لذلك فإننا نقوم أولاً بتنفيذ العمليات المحصورة بين قوسين و بعد ذلك فإننا نقوم بإجراء عملية الضرب على ناتج العملية المحصورة بين قوسين و إلا فإننا سوف نحصل على نتائج خاطئة.

$$2\times(9+4)+2\times(9-6)=32$$

و لذلك فإننا نجمع أولاً 9 مع 4 و نضرب الناتج بالعدد 2 ثم نطرح 6 من 9 و نضرب الناتج بالعدد 2 .

$$2\times(13)+2\times(3)=32$$

$$26+6=32$$

إذاً فإن الحل الذي توصلت له صحيح.



إياك في الامتحان أن تضع شارة ضرب بين قوسين أو قبل قوس أو بعد قوس.

لا توضع شارة الضرب أبداً بجانب قوس ، و إنما فعلت ذلك لغاية تعليمية بحتة.

المعادلات المتزامنة - المعادلات المتناظرة

Simultaneous equations

إذا كانت لدينا معادلتين تحويان المجاهيل ذاتها (التي تحمل القيم ذاتها) فإننا ندعوا هاتين المعادلتين بأنهما معادلتين متزامنتين .

إن حل منظومة من المعادلات المتزامنة simultaneous equations يُمكننا من معرفة قيمة كلا المجهولين .

هنالك طريقتين أساسيتين في حل المعادلات المتزامنة و هما طريقة الإبدال و طريقة الحذف .

إن معرفة قيمة مجهول إحدى المعادلتين المتناظرتين سوف يُمكننا حتماً من معرفة قيمة مجهول المعادلة الثانية.

لتكن لدينا هاتين المعادلتين المتزامنتين :

$$X+4Y=18$$

$$2X+6Y=30$$

معادلتين متزامنتين تحويان عنصرين مجهولين متماثلين و هما X,Y .

حل معادلتين متزامنتين باستخدام طريقة الإبدال

عندما تحوي إحدى معادلتين متناظرتين مجهولاً عامله العددي 1 (كما هي حال المُتغير الحرفي X) في المعادلة الأولى فإن علينا إعادة ترتيب تلك المعادلة و أن نقوم باستخدام طريقة الإبدال فيها .

نقوم بتسمية المعادلة الأولى 1 مثلاً و المعادلة الثانية 2 مثلاً .

هل يمكن استخدام طريقة الإبدال في المعادلتين المتزامنتين السابقتين ؟

$$X+4Y=18$$

$$2X+6Y=30$$

نعم يمكننا استخدام طريقة الإبدال في حل المعادلتين السابقتين المتناظرتين لأن العامل العددي coefficient للمجهول X هو 1 في المعادلة الأولى :

$$X=1X$$

في الجبر كل متغير X أو Y مثلاً لا يتقدمه عاملٌ عددي أي لا يأتي قبله عددٌ فذلك يعني بأن عامله العددي يساوي 1:

$$X=1X$$

$$Y=1Y$$

و لكن إياك في الامتحان أن تضع العدد 1 واحد قبل أي متغيرٍ حرفي و إنما فعلت ذلك لغاية تعليمية.

$$X+4Y=18$$

نقوم بعزل المجهول X الذي عامله العددي 1 في المعادلة الأولى و ذلك بأن نجعل منه نتيجةً للمعادلة :

$$X=18-4Y$$

ماذا تحولت عملية الجمع في المعادلة الأصلية إلى عملية طرح؟

لأننا كما مر معنا سابقاً نقوم بعكس العمليات الجارية في المعادلة في كل مرة نعيد فيها ترتيب عناصرها.

كما ترون فقد تمكنا عن طريق جعل مجهول المعادلة الأولى X نتيجةً لها و عن طريق عكس العملية الجارية و تحويل عملية الجمع إلى عملية طرح (عكس) توصلنا إلى القول بأن مجهول المعادلة يساوي :

$$X=18-4Y$$

و بذلك نكون قد توصلنا إلى أن المجهول X يساوي $18-4Y$

نستبدل المجهول X بالقيمة المساوية لها أي القيمة $18-4Y$ **في كل موضعٍ يرد فيها المجهول X بحيث تصبح المعادلة الثانية**

$$2X+6Y=30$$

على الشكل التالي :

$$2(18-4Y)+6Y=30$$

و لكن ما الذي جنيناه من ذلك؟

الذي جنيناه أننا استبدلنا مجهولاً X لا يحمل في ذاته ما يدلنا على ماهيته بعبارة تحوي قيماً عددية هي $18-4Y$ و بالتالي فإن حلها يكون أكثر سهولة.

الآن نقوم بحل المعادلة الثانية بدلالة المعادلة الأولى أي بدلالة القيمة المساوية للمجهول X الذي يساوي $18-4Y$.

نقوم بتفكيك الأقواس و ذلك عن طريق ضرب ما هو خارج الأقواس أي 2 بما هو محصورٌ بين قوسين $(18-4Y)$:

$$2(18-4Y)+6Y=30$$

نقوم بتفكيك الأقواس و ذلك عن طريق ضرب ما هو خارج الأقواس أي 2 بما هو محصورٌ بين قوسين :

$$2\times18=36$$

$$2\times4Y=8Y$$

فتصبح معادلتنا بالصورة التالية :

$$36-8Y+6y=30$$

نقوم بإجراء العمليات الرياضية المعلقة القابلة للتنفيذ :

كما ترون فإن لدينا حدين متشابهين أي أن متغيرهما متماثل و لذلك فإنهما قابلين للجمع مع بعضهما البعض و هما الحد السالب $-8Y$ و الحد الموجب $+6y$ و لذلك فإننا ننفذ عملية الجمع المعلقة :

$$-8Y+6y=-2y$$

$$-8+6=-2$$

كانت معي 6 دولارات +6 و جائتني غرامة مالية مقدارها 8 دولارات (-8)أذهبت الدولارات الستة التي كانت معي و جعلتني استدين دولارين أي أن ناتج كل ذلك هو أنه قد أصبح علي دينٌ مقداره دولارين (-2).

لتصبح معادلتنا السابقة :

$$36-8Y+6y=30$$

على الصورة التالية :

$$36-2Y=30$$

$$36-2\times Y=30$$

و بالطبع فإن ذلك يعني بأن 2×Y تُساوي 6 لأن :

$$36-(2\times y)=30$$

$$36-(6)=30$$

أي أن 2Y أي 2×Y تساوي 6 كما تشير المعادلة السابقة لأن 36 ناقص 2Y تساوي 30 ،و بما أن 2Y تساوي 6 فذلك يعني بأن Y تساوي 3 :

$$3\times 2=6$$

و بذلك نكون قد تمكنا من معرفة قيمة المجهول **Y** .

الآن بعد أن توصلنا لمعرفة قيمة المجهول Y و بأنه يُساوي 3 فإننا نعود إلى المعادلة الأولى لنقوم بحلها بدلالة المعادلة الثانية اي أننا نقوم بحلها بدلالة قيمة المجهول Y التي توصلنا لمعرفتها في المعادلة الثانية و ذلك عن طريق إبدال المجهول Y بالقيمة 3 .

$$X+4Y=18$$

$$X+4(3)=18$$

$$X+4\times(3)=18$$

قمت بإبدال المجهول Y في المعادلة الأولى بقيمته العددية التي توصلت إليها في المعادلة الثانية أي 3 ، و كما ترون فقد أصبحت لدي عملية ضربٍ معلقة بين عددين أقوم بتنفيذها :

$$4y=4(3)=4\times3=12$$

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$X+12=18$$

أقوم بعكس عملية الجمع لتصبح عملية طرح :

$$18-12=6$$

إذاً فإن المجهول X يساوي 6

$$X=6$$

و بذلك نكون قد تمكنا من حل معادلتين متناظرتين بدلالة بعضهما البعض.

إذاً فإن المعادلات المتناظرة هي المعادلات التي تحوي المتغيرات (المجاهيل) ذاتها حيث يتم حلها بشكلٍ متزامن بدلالة بعضها البعض .

يمكننا حل معادلاتٍ متناظرة من خلال إبدال متغيرٍ حرفي في أحد المعادلتين بالقيمة التي تمثله كما وردت في المعادلة الأخرى .

يمكن حل هذا النوع من المعادلات كذلك عن طريق حذف أحد المتغيرين و هو ما سوف أقوم به في المعادلة التالية .

حل المعادلات المتناظرة عن طريق حذف متغير (مجهول)

في المعادلات المتناظرة Simultaneous equations التي لا يمكن إعادة ترتيبها لجعل متغيرها (مجهولها) هو موضوعها أو ناتجها فإننا نستخدم طريقة حذف المتغير المجهول .

لحل مثل هذه المعادلات فإننا نقوم بضرب هذه المعادلات بمجملها بالعامل العددي coefficient لأحد المتغيرات (المجاهيل) و ذلك لتوحيد العوامل العددية للمتغيرات (المجاهيل):

لتكن لدينا هاتين المعادلتين المتزامنتين :

$$4X+3y=20$$

$$20X-9y=4$$

هل يمكن استخدام طريقة الإبدال و حل معادلة بدلالة معادلةٍ ثانية؟

في المعادلتين المتزامنتين السابقتين لا يمكن ذلك .

لماذا؟

لأنه ليس لدينا متغير (مجهول) عامله العددي 1 ، أي أنه ليس هنالك متغيرٌ حرفي لا يتقدمه عدد.

و لذلك فإن حل هاتين المعادلتين المتزامنتين يستدعي منا استخدام طريقة حذف المتغير (المجهول) :

$$4X+3y=20$$

$$20X-9y=4$$

لاستخدام طريقة حذف المتغير (المجهول) فإن الأمر يتطلب منا إجراء عملية توحيد للعوامل العددية للمتغيرات ، أي توحيد الأعداد التي تتقدم المتغيرات (المجاهيل)

الآن نبحث عن متغيرين يمكن توحيد عامليهما العدديين ، و كما ترون فإن لدينا متغيرين يمكن توحيد عامليهما العدديين فإذا ضربت العامل العددي 3 بالعدد 3 فإنه سوف يصبح 9 :

$$3\times3y=9y$$

يمكن ضرب حدين غير متشابهين و لكن لا يمكن جمع حدين غير متشابهين (متغيرهما الحرفي غير متماثل) .

و بذلك نكون قد وحدنا العامل العددي للمتغير y في كلتا المعادلتين ليصبح العامل العددي في المعادلة الأولى 9 كما هي حال العامل العددي للمُتغير الحرفي في المُعادلة الثانية:

$$4X+9y=20$$

$$20X-9y=4$$

و لكن يتوجب علينا الانتباه إلى أننا حتى نحافظ على تعادل المعادلة و تساوي طرفيها فإنه يتوجب علينا أن نضرب المعادلة بأسرها بالعدد ذاته الذي ضربنا به العامل العددي حتى يصبح 9 أي انه يتوجب علينا أن نضرب المعادلة بأسرها بالعدد 3 .

$$4X+9y=20$$

$$20X-9y=4$$

إذاً فإنني سوف أضرب جميع حدود المعادلة الأولى بالعدد 3

و لكن إحذر من أن تضرب العامل العددي 9 مرةً ثانية بالعدد 3

$$3\times4X=12X$$

$$3\times3Y=9Y$$

$$3\times20=60$$

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$12X+9y=60$$

سوف أدعو هذه المعادلة التي حصلت عليها بالمعادلة الثالثة .

نتذكر المعادلة الثانية :

$$20X-9y=4$$

و الآن أجمع المعادلة الثانية $20X-9y=4$ مع المعادلة الثالثة أي المعادلة الأولى التي ضربتها بالعدد 3 فتصبح لدي المعادلة التالية :

$$20X-9Y=4+12X+9Y=60$$

كما ترون فإن لدي حدين متماثلين تماماً و لكنهما مختلفي الشارة

$$-9Y+9Y$$

و لذلك فإن ناتج جمعهما صفر

$$-9Y+9Y=0$$

و بالتالي فإنني اتخلص منهما ، كما أنفذ العمليات المعلقة القابلة للتنفيذ و كما ترون فإن لدي علاقة جمع قابلة للتنفيذ كذلك لأنها بين حدين متشابهين :

$$20X=4+12X=60$$

$$20X+12X=32X$$

هل بقيت لدي عمليات معلقة قابلة للتنفيذ بين حدودٍ متشابهة او متماثلة ؟

$$32X=4+60$$

تماماً فإن النتيجتين 4 و 60 قابلتين للجمع مع بعضهما البعض :

$$4+60=64$$

لتصبح لدي المعادلة التالية :

$$32X=64$$

كما ترون فقد أصبحت لدي عملية ضرب ، أعكسها فتصبح عملية قسمة حيث أقسم كلا حدي المعادلة على العامل العددي المرافق للمتغير X أي الرقم 32 :

$$\frac{32}{32}=1$$

$$\frac{64}{32}=2$$

$$X=2$$

أتاكد من صحة الحل الذي توصلت إليه عن طريق إبدال المجهول X بالحل الذي توصلت إليه أي العدد 2 .

$$4(2)+3y=20$$

$$20(2)-9y=4$$

كما يبدو فإن قيمة المتغير الحرفي Y يُساوي 4 .

$$4(2)+3(4)=20$$

$$20(2)-9(4)=4$$

$$(8)+(12)=20$$

$$(40)-(36)=4$$

قد لا نتمكن من توحيد العاملين العدديين في معادلتين متناظرتين عن طريق ضرب إحداهما بعددٍ ما و في هذه الحالة فإنه يتوجب علينا القيام بضرب كلا المعادلتين حتى نتمكن من توحيد عاملين عدديين لمتغيرين متماثلين و بعد ذلك سوف يكون بإمكاننا عندها القيام بحذف المتغيرين.

لتكن لدي المعادلتين المتناظرتين التاليتين :

$$3X+6Y=57$$

$$4X+5Y=55$$

هل يمكننا استخدام طريقة الإبدال في المعادلتين المتناظرتين السابقتين و ذلك لحل معادلة بدلالة قيمة المجهول في المعادلة الثانية ؟

لا يمكننا استخدام طريقة حذف متغير لأنه لا يوجد لدينا متغير عامله العددي هو العدد1 (لايسبقه عدد) ،كما لا يمكننا أن نضرب العامل العددي بعددٍ ما لنجعل منه مماثلاً لعامل عددي في المعادلة الثانية.

(بالطبع شريطة أن يكون المتغير المرافق له مماثلاً للمتغير المرافق للعدد الذي نريد تسويته به) و ذلك لأنه ليس لدينا عاملٌ عددي قاسم Factor لعاملٍ عددي آخر و فماذا نفعل في هذه الحالة؟

في مثل هذه الحالة فإننا نضرب كلا المعادلتين حتى نحصل على حدين متماثلين في كلا المعادلتين ، أي حتى نحصل على عاملٍ عددي (عدد) و متغيرٍ (حرف) في المعادلة الأولى مماثلين تماماً لعاملٍ عددي و متغير في المعادلة الثانية.

إذاً لتوحيد حدين أي توحيد عاملين عددين (عددين مختلفين) مرافقين لمتغيرين (حرفين) متماثلين فإنني سوف أضرب العامل العددي 3 بالعدد 4 لأحصل على 12x ، كما سوف أضرب العامل العددي 4 المرافق للمتغير X بالعدد 3 حتى أحصل على الحد 12X .

و بذلك يُصبح لدينا حدين متماثلين 12X في كلتا المعادلتين ، غير أنه يتوجب علينا حتى نحافظ على صحة هاتين المعادلتين (أي حتى نحافظ على تعادل و تساوي طرفيهما) أن نضرب المعادلة بأكملها بالعدد ذاته الذي ضربنا به العامل العددي و إلا فإن المعادلة بأكملها سوف يختل توازنها و تصبح خاطئة (كما هي الحال عندما نضرب مقام الكسر بالعدد ذاته الذي ضربنا به البسط حتى نُحافظ على توازن الكسر).

إذاً فإننا سوف نضرب المعادلة الأولى بأكملها بالعدد الذي ضربنا به العامل العددي أي العدد 4 :

$$3X+6Y=57$$

$$4X+5Y=55$$

$$4\times3X=12X$$

$$4\times6Y=24Y$$

$$4 \times 57 = 228$$

لتصبح معادلتنا الأولى على الصورة التالية :

$$12X + 24Y = 228$$

و الآن **نضرب المعادلة الثانية** أي :

$$4X + 5Y = 55$$

بالعدد ذاته الذي ضربنا به العامل العددي 4 و هو العدد 3 :

$$3 \times 4X = 12X$$

$$3 \times 5Y = 15Y$$

$$3 \times 55 = 165$$

فتصبح المعادلة :

$$4X + 5Y = 55$$

على الصورة التالية :

$$12X+15Y=165$$

الآن نقوم بطرح هاتين المعادلتين بعد أن قمنا بتضخيمهما بعملية الضرب و بعد أن أصبح فيهما حدين متماثلين تماماً .

الغاية من طرح هاتين المعادلتين من بعضهما البعض تتمثل في التخلص من الحدين المتماثلين 12X الموجودين في كلتا المعادلتين:

أطرح المعادلتين من بعضهما البعض :

$$12X+24Y=228$$

$$-\quad 12X+15Y=165$$

$$12X-12X=0$$

و بذلك فإننا نكون قد تخلصنا من الحد المتماثل .

$$~~12X~~+24Y=228$$

$$-\ ~~-12X~~+15Y=165$$

$$24Y-15Y=9Y$$

$$~~12X+24Y~~=228$$

$$-\ ~~12X+15Y~~=165$$

$$228-165=63$$

لتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$9Y=63$$

$$9\times Y=63$$

كما ترون فقد أصبحت لدينا عملية ضرب، و لحل المعادلة فإننا نعكس عملية الضرب إلى عملية قسمة حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على العامل العددي المرافق للمتغير أي العدد 9 :

$$\frac{9}{9}=1$$

$$\frac{63}{9}=7$$

$$Y=7$$

إذاً فإن المجهول Y يساوي 7 .

و الآن بعد أن أصبح المجهول Y معلوماً بالنسبة لنا فإننا نعود إلى المعادلة الأولى قبل القيام بضربها بالعدد 3 لتوحيدها و نقوم بإبدال المجهول Y بعد أن عرفنا قيمته العددية أي العدد 7 .

نتذكر المعادلة الأولى كيف كانت :

$$3X+6Y=57$$

نستبدل المجهول Y بالعدد 7 الذي توصلنا إليه :

$$3X+6(7)=57$$

$$3X+42=57$$

كما ترون فإن لدينا علاقة جمع نقلبها لتصبح علاقة طرح حيث نطرح الحدود المتشابهة القابلة للطرح من بعضها :

$$3\times X+42=57$$

A+B=C

نطرح 42 من الناتج 57 و من نفسه أي أننا نطرحه من كلا طرفي المُعادلة:

$$3\times X+42-42=57-42$$

$$42-42=0$$

$$3X=57-42$$

$$57-42=15$$

فتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$3X=15$$

$$3\times X=15$$

كما ترون فقد بقيت لدينا علاقة ضرب 3X اي 3×X نعكسها لتصبح علاقة قسمة حيث نقسم كلا طرفي المعادلة على العدد المرافق للمجهول أي العامل العددي للمجهول X أي العدد 3 :

$$\frac{\cancel{3}X}{\cancel{3}}=1X=X$$

$$\frac{15}{3}=5$$

إذاً فإن المجهول X يساوي 5.

نستبدل المجهول X في المعادلة الأولى بالعدد 5 لنتأكد من صحة الحل:

$$3X+6Y=57$$

$$3\times5+6\times7=57$$

$$15+42=57$$

إذاً فإن الحل صحيح.

π

تطبيقات المعادلات المتزامنة Simultaneous equation في الواقع

تصادفنا الكثير من المواقف الحياتية التي يكون فيها أكثر من مجهولٍ واحد و في هذه الحالة فإننا نستخدم منظومة المعادلات المتزامنة التي مرت معنا سابقاً :

مثال:

اشترى شخص 4 منازل و 6 سيارات بسعر 92 الف دولار 92000$ ، بينما اشترى شخصٌ آخر 8 منازل و 4 سيارات بسعر 168 ألف دولار، فكم يبلغ سعر المنزل و السيارة إذا كانت أسعار جميع المنازل و السيارات هنا متماثلة؟

كما ترون فإن لدينا في هذه المعادلة مجهولين اثنين و هما سعر المنزل و سوف نرمز له بالمتغير X و سعر السيارة الذي سوف نرمز له بالمتغير Y و مقياسهما ألف دولار.

نتيجة كل معادلة هي السعر الإجمالي الذي دفعه كل زبون، و بذلك تكون المعادلة الأولى :

$$4X+6Y=92$$

و التي تعني 4 منازل و 6 سيارات بسعر 92 ألف دولار.

المعادلة الثانية :

$8X+4Y=168$

و التي تعني 8 منازل و 4 سيارات بسعر 168 ألف دولار.

هل يمكن أن نستخدم طريقة الإبدال ، أي استبدال مجهول المعادلة بما يدل عليه ، في حل هاتين المعادلتين؟ لا،

لا يمكن القيام بذلك لأنه ليس لدينا أي متغيرٍ (مجهول أو حرف) عامله العددي واحد 1 أي لا يتقدمه اي عاملٍ عددي .

إذاً فإننا سوف نستخدم طريقة الحذف في حل هاتين المعادلتين.

هل لدينا عددٌ يمكن أن نضربه بالعامل العددي في إحدى المعادلتين حتى يصبح مماثلاً للعامل العددي في المعادلة الثانية؟

نعم لدينا العدد 2 ، إذا ضربناه بالعامل العددي4 الموجود في المعادلة الأولى فإنه يصبح 8 ، أي 4X تصبح 8X و بذلك يصبح هذا الحد مماثلاً للحد 8X في المعادلة الثانية .

حتى تحافظ المعادلة على توازن طرفيها لا تنسى أن تضرب المعادلة بأكملها بالعدد 2 :

$$4X+6Y=92$$

$$2\times 4X=8X$$

$$2\times 6Y=12Y$$

$$2\times 92=184$$

لتصبح معادلتنا الأولى بعد الضرب بالعدد 2 على الصورة التالية :

$$8X+12Y=184$$

سوف ندعو المعادلة الأولى بعد الضرب و المضاعفة بالمعادلة رقم 3 .

و الآن نطرح المعادلة الثانية :

$$8X+4Y=168$$

من المعادلة الثالثة ، أي المعادلة الأولى بعد مضاعفتها بعملية الضرب لتصبح لدي عملية طرح.

ما الغاية من عملية الطرح هذه؟

تتمثل الغاية في التخلص من أحد مجهولي المعادلة .

تذكر دائماً بأننا نطرح المعادلة التي لم يتم تضخيمها أي المعادلة التي لم يتم ضربها بأي عاملٍ عددي من المعادلة التي تم تضخيمها ، أي المعادلة التي تم ضربها بعاملٍ عددي و بالتالي فإننا نضمن عندها (إلى حدٍ ما) بأننا سوف نطرح مقداراً ما من مقدارٍ أكبر منه .

تذكر دائماً بأن تضرب جميع عناصر المعادلة بالعدد (العامل العددي) الذي ضربت به أحد حدود المعادلة حتى يُصبح مماثلاً لحدٍ آخر في المعادلة الأخرى و ذلك حتى تحافظ على العلاقة المنطقية بين عناصرها.

نجري عملية الطرح : طرح 2 من 3 :

عملية الطرح :

$$8X+12Y=184$$

$$8X+4Y = 168 \quad -$$

$$8X-8X=0$$

$$12Y=184$$

$$4Y\ =168\ \ -$$

$$12Y-4Y=8Y$$

$$184$$

$$168\ \ \ -$$

$$184-168=16$$

فتصبح لدينا النتيجة التالية :

$$8Y=16$$

$$8\times Y=16$$

كما ترون فإن لدي عملية ضرب أقوم بعكسها فاحصل على عملية قسمة حيث أقسم كلا طرفي المعادلة على العامل العددي (العدد) المرافق للمتغير :

$$\frac{Y}{Y}=1Y=Y$$

$$\frac{16}{8}=2$$

أي أن المجهول Y يساوي 2 أي ألفي دولار $2000 .

اي أن سعر السيارة Y يبلغ $2000 دولار .

الآن نعود إلى المعادلة الأولى قبل تضخيمها أي :

$$4X+6Y=92$$

و نقوم باستبدال المجهول Y بقيمته العددية اي العدد 2 فيصبح لدينا :

$$4X+6(2)=92$$

$$4\times X+6\times(2)=92$$

$$4\times X+12=92$$

كما ترون فإن المعادلة السابقة تحوي عملية جمع 12+ أقوم بعكسها إلى عملية طرح و أطرح الرقم 12 من كلا طرفي المعادلة حتى تبقى المعادلة متزنة و حتى يبقى طرفيها متساويين :

$$4X+12-12=92-12$$

$$12-12=0$$

$$92-12=80$$

إذاً فقد أصبحت لدي عملية الضرب التالية :

$$4X=80$$

$$4\times X=80$$

اقوم بعكسها محولاً إياها إلى عملية قسمة حيث اقسم كلا الحدين على العامل العددي المرافق للعنصر المجهول أي العدد 4 :

$$\frac{4}{4}=1$$

$$\frac{80}{4}=20$$

$$X=20$$

المجهول X يساوي 20 أي 20 ألف دولار $20000 ، أي أن سعر المنزل الواحد يبلغ 20 ألف دولار.

الآن **للتأكد من من صحة الحل الذي قمت به أقوم دائماً بإبدال المجاهيل في المعادلة بالقيم التي توصلت إليها:**

$$4X+6(2)=92$$

$$(4\times 20)+6\times(2)=92$$

$$80+12=92$$

الحل صحيح .

$$8X+4y=168$$

$$8\times 20+4\times 2=160+8=168$$

الحل صحيح

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

المعادلات التربيعية Quadratic equations

المعادلة التربيعية هي معادلةٌ تحوي حداً أو عنصراً مرفوعاً للقوة الثانية ، و غالباً ما يكون للمعادلة التربيعية حلين اثنين .

لحل معادلة تربيعية فإننا نقوم بكتابتها بشكلها العام مع كتابة الحد X^2 أولاً متبوعاً بالحد X غير المرفوع لقوة ثم العدد المُنفرد أي الثابت Constant ، أي أن الصيغة العامة للمعادلة التربيعية هي :

$$ax^2+bx+c=0$$

حيث:

a **هو العامل العددي (العدد) للمتغيرالحرفي (المجهول) المرفوع للقوة الثانية** x^2.

x^2 **هو المتغير او المجهول المرفوع للقوة الثانية** .

b هو العامل العددي للمتغير **X** غير المرفوع لقوة.
C هو الثابت constant أي العدد الثابت (العدد المنفرد غير الملحق بمتغيرٍ حرفي).

تكون نتيجة المعادلات التربيعية مساوية للصفر.

حل المعادلات التربيعية بطريقة التخصيم (التقويس) Factoring :

عند تخصيم (تقويس) معادلة تربيعية فإننا نحصل على مجموعتين من الأقواس .

عندما يكون ناتج ضرب حدين صفراً فذلك يعني بأن قيمة احد الحدين مساوية للصفر و لذلك

فإن $(X+1)$ **أو** $(X+2)$ **يجب أن تكون مساويةً للصفر** .

إن تجربة كلا هذين الخيارين سوف يمنحنا حلين للمعادلة.

انتبه جيداً :

إذا قيل لي بأن $X+1=0$ **فذلك يعني بأن** X **أقل من صفر بواحد ، أي**

أنه يساوي 1 - (ناقص واحد) :

$$X+1=0$$

$$-1+1=0$$

و إذا قيل لي بأن $(X+2)=0$ فذلك يعني بأن X يساوي ناقص 2

$$X=-2$$

$$-2+2=0$$

قيمتين متماثلتين متعاكسي الشارة ناتج جمعهما يساوي الصفر.

أحياناً فإن أفضل طريقة لحل المعادلات التربيعية تتمثل في استخدام الصيغة التربيعية
: Quadratic formula

$$ax^2+bx+c=0$$

المتغيرات a,b,c تمثل أعداداً .

a العامل العددي لمجهول مرفوع للقوة الثانية.

b العامل العددي لمجهول غير مرفوعٍ لأية قوة.

c عامل عددي (عدد) منفرد لا يسبق مجهولاً.

نستخدم الصيغة التربيعية لحساب قيمة المجهول **X** .

لاستخدام هذه الصيغة يتوجب استبدال الرموز الموجودة في الصيغة بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$X=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

a العامل العددي للمجهول المرفوع للقوة الثانية.

b العامل العددي للمجهول غير المرفوعٍ لأية قوة.

c عامل عددي (عدد) منفرد لا يسبق مجهولاً.

إن عملية استخدام الصيغة التربيعية هي مسألة استبدال رموز المعادلة بالقيم الرقمية المتوفرة.

مثال :

ما هي قيمة المجهول **X** في المعادلة التربيعية التالية :

$$6X^2-10X+4=0$$

a العامل العددي للمجهول المرفوع للقوة الثانية.

b العامل العددي للمجهول غير المرفوعٍ لأية قوة.

c عامل عددي (عدد) منفرد لا يسبق مجهولاً.

6 العامل العددي للمجهول المرفوع للقوة الثانية.

10 العامل العددي للمجهول غير المرفوعٍ لأية قوة.

4 عامل عددي (عدد) منفرد لا يسبق مجهولاً.

بدايةً نقوم بتحديد العدد الذي سوف نقوم بإبداله بكل رمز من رموز الصيغة :

$$a=6,b=-10,c=4$$

نقوم بحساب قيمة كل جزءٍ من المعادلة الجذرية

$$X=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$


$$b^2-4ac=10^2-4\times6\times4$$

$b^2 - 4 \times a \times c = 10^2 - 4 \times 6 \times 4$

$$10^2 = 10 \times 10 = 100$$

$$4 \times 6 \times 4 = 96$$

$$100 - 96 = 4$$



تمهل و اعطَِ الأولوية

انتبه إلى أن وجود عمليات ضرب مع عمليات طرح يعني بأنه يتوجب علي أولاً إنجاز عمليات الضرب لأن لها أولوية على عمليات الطرح و الجمع ، و لذلك أقوم بإنجاز عملية الضرب.

$$4ac$$

$$4 \times a \times c = 4 \times 6 \times 4$$

و اضع الناتج مكان عمليات الضرب هذه.

لحل هذه المعادلة حلاً صحيحاً يجب علينا تجربة تجاهل الشارات السلبية .

نقوم بإنجاز عمليات الضرب المتسلسلة كونها ذات أولوية قصوى بالنسبة لعمليات الطرح و نضع الناتج ككتلة واحدة :

$$b^2 - 4ac$$

$$10^2=10\times10=100$$

$$4\times6\times4=94$$

$$100-96=4$$

$$X=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$X=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2\times a}$$

$$X=\frac{-10\pm\sqrt{4}}{2\times 6}$$

$$\sqrt{4} = 2$$

$$2 \times 6 = 12$$

$$X=\frac{-10\pm 2}{12}$$

$$X=\frac{12}{12}=1$$

$$X=1$$

و بذلك نكون قد تمكنا من حل معادلةٍ تربيعية .

للتوصل لحلٍ صحيح لمعادلةٍ تربيعية يتوجب علينا القيام بالآتي :

تجاهل الشارات السلبية بشكلٍ تام .

تجربة إجراء عمليتي جمع و طرح ± .

إعطاء الأولوية لعمليات الضرب عندما تكون مع عمليات جمعٍ او طرح ثم وضع ناتج عمليات الضرب ككتلة واحدة كما مر معنا في بحث العمليات ذات الأولَوية.

مسألة تربيعية

حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها بخمسة امتار و تبلغ مساحتها $150m^2$ متر مربع .

كم يبلغ عرض هذه الحديقة؟

تحليل المسالة :

مساحة المستطيل تساوي الطول × العرض

المجهول X يمثل طول الحديقة، و الذي لا نعرف عنه إلا أنه أطول من العرض بخمسة أمتار و أننا

إذا أضفنا إليه 5 أمتر و ضربناه بالعرض فإننا سوف نحصل على 150 متر مربع (مساحة).

المساحة = الطول ×العرض .

$$150=(X+5)\times X$$

و تعني هذه المعادلة بأن مساحة الحديقة تبلغ 150 متر مربع و هذه المساحة تساوي الطول (مجهول) X زائد+ 5 أمتار (X+5) ضرب العرض X (مجهول) كذلك.

إن معادلة حساب المساحة و عناصرها أي الطول و العرض هي معادلة تربيعية و لذلك فإنني سوف أقوم بإعادة ترتيب عناصرها و حدودها حتى تناسب الصيغة التربيعية الرسمية و هي :

$$ax^2+bx+c=0$$

المتغيرات **a,b,c** تمثل أعداداً .

حيث a هو العامل العددي (العدد) للمتغير الحرفي المرفوع للقوة الثانية x^2.

x^2 هو المتغير او المجهول المرفوع للقوة الثانية .

b هو العامل العددي للمتغير x غير المرفوع لقوة.

c هو الثابت constant أي العدد المنفرد الذي لا يسبق أي متغيرٍ حرفي .

نعيد ترتيب معادلتنا السابقة :

$$150=(X+5)\times X$$

لتواطئ الصيغة التربيعية :

$$ax^2+bx+c=0$$

مساحة الحديقة $150m^2$ متر مربع و هي تساوي الطول + 5 متر × العرض (مجهول).

حيث أن طول الحديقة أكبر بخمسة أمتار من عرضها :

$(X+5)$ التي تمثل الطول الذي يساوي العرض +5 أمتار ضرب العرض

X العرض (مجهول) و هو يساوي الطول ناقص 5 أمتار = 150 متر مربع .

طول الحديقة = العرض + 5 أمتار.

عرض الحديقة = الطول – 5 امتار .

الطول × العرض = 150 متر مربع.

كما ترون فقد أصبحت لدينا عملية أقواس :

$$(X+5)\times X=150$$

$(X+5)$ الطول و هو يساوي العرض x زائد 5 أمتار.

X العرض

150 متر مربع مساحة الحديقة.

حيث يتوجب علينا تفكيكها من خلال ضرب ما هو محصورٌ بين قوسين بما هو خارجه :

$$X\times X=X^2$$

أصبح لدينا عنصرٌ مجهول مرفوع للقوة الثانيةX^2 يتوجب كشفه باستخدام صيغة تربيعية:

$$(X)\times 5=5X$$


و ليس X5 لأنه لا يجوز Hبداً ان يأتي المتغير (الحرف) قبل العامل العددي (العدد).

فتصبح معادلتنا على الشكل التالي :

$$X^2+5X=150$$

العرض مضروباً بنفسه أي مرفوعاً للقوة الثانية X^2 (شكل مربع)+ زيادة الطول عن العرض أي 5 مضروبة بالعرض 5X أي X×5 تساوي 150 متر مربع.

مساحة المربع (الضلع ضرب الضلع أو الضلع مرفوعاً للقوة الثانية) زائد مساحة الزيادة 5 أمتار ضرب العرض = مساحة مستطيل 150 متر.



بدون زيادة الطول عن العرض فإن الطول يساوي العرض حيث يكون لدينا مربع طول ضلعه X و مساحته X×X .

القطعة التي تحول المربع إلى مستطيل لأنها تجعل الطول أطول من العرض بخمسة امتار فمساحتها هي مقدار الزيادة اي 5 متر ضرب العرض X :

X×5

$$X^2+5X=150$$

نقوم بموافقتها مع الصيغة التربيعية :

$$X^2+5x-150=0$$

لماذا ناتج طرح هاتين القيمتين يساوي الصفر؟

لأن الطرف الأول X2+5x يمثل مساحة الحديقة حيث يعني الضلع ضرب الضلعX ×X أي الضلع مرفوعاً للقوة الثانية X^2 زائد مساحة القطعة التي تحول المربع إلى مستطيل و التي مساحتها تساوي 5 امتار ضرب ضلع المربع X و هذه القيمة تساوي 150 متر مربع، و 150 ناقص مساحة الحديقة 150 متر مربع فإن النتيجة تساوي صفر.

القيمة الموازية للقيمة **b** هي **5** و بالتالي فإن $\frac{b}{2}=\frac{5}{2}=2.5$

b هو العامل العددي للمتغير x غير المرفوع لقوة.

انتبه إلى ناحية هامة في المعادلات التربيعية **حيث يتوجب علينا أن نقوم دائماً تجربة قيمٍ موجبة و قيمٍ سلبية ثم اختيار القيمة التي تعطيناً حلاً منطقياً صحيحاً.**

و كما ترون فإن **لدي قيمتين رقميتين في هذه المعادلة و هما 150 التي تمثل مساحة الحديقة و 5 متر التي تمثل زيادة الطول على العرض.**

نعيد ترتيب المعادلة بحيث نحصل على علاقة طرح بين قيمتين متماثلتين متساويتين غير أنهما متعاكستي الشارة :

$$X^2+5x-150=0$$

مساحة الحديقة (و كأنها شكل مربع) أي طول الضلع X +زائد الزيادة 5 مرفوعة للقوة الثانية ناقص مساحة الحديقة أي 150 متر = صفر.

تفسير المعادلة و فهمها أهم من حلها و لذلك فإني سوف أستبق الأحداث و أقول بأن المجهول X يُساوي 10 و بالتالي فإن :

$$X=10$$

$$X^2=10\times10=100$$

مساحة المربع دون الزيادة(الضلع×الضلع)

$$5x=5\times10=50$$

الزيادة 5 متر ضرب العرض10 =50 متر مساحة الزيادة التي سوف تحول المربع إلى مستطيل.

و بالتالي فإن:

100+50=150

مساحة الحديقة

لنعتبر بأن w يمثل عرض الحديقة و l يمثل طولها بوحدة المتر .

وفقاً لمجريات المسألة فإن طول الحديقة أكبر من عرضها بخمسة امتار :

$l=w+5$

مساحة المستطيل = الطول × العرض

$w.(l+5)=150m^2$

$w\times(l+5)=150m^2$

العرض × الطول + 5 =150 متر مربع .

بما أن هنالك علاقة ضرب للقيمة بنفسها (ضرب الضلع بنفسه)أي علاقة مضاعفة فإننا سوف نستخدم في حل هذه المسألة المعادلة التربيعية :

$W^2+5w=150$

نعيد ترتيب عناصر هذه المعادلة التربيعية لتوافق الصيغة التربيعية الصفرية :

$$W^2+5w-150=0$$

W^2 أي العرض ضرب العرض W×W أي العرض مرفوعاً للقوة الثانية يساوي مساحة المربع.

$5w$ و هي تُساوي 5 ضرب العرض و هي تساوي مساحة الزيادة التي سوف تحول المربع إلى مُستطيل.

الان نقوم بتخصيم (تقويس) المعادلة التربيعية السابقة

$$W^2+5w-150=0$$

فنحصل على :

$$(w+15)\ (w-10)=0$$

فنحصل على قيمتين محتملتين ل w و هما :

$$W=-15$$

$$W=10$$

و بما انه لا يمكن للعرض أن يكون قيمةً سلبية فإننا نلغي الحل السلبي اي -15 فيتبقى لدينا الحل الإيجابي 10 اي أن عرض الحديقة يبلغ عشرة أمتار.

نتأكد من صحة الحل :

إذا كان عرض الحديقة يبلغ عشرة أمتار فذلك يعني بان طولها يساوي $10+5=15$

$$10\times15=150m^2$$

الحل صحيح

قمت بحل هذه المعادلة التربيعية بطريقة التخصيم (التقويس) بينما قمت بحل المعادلة التربيعية في المسألة السابقة بطريقة الصيغة التربيعية.

تخصيم (تقويس) المعادلة السابقة :

$$W^2+5w-150=0$$

فنحصل على :

$$(w+15)\ (w-10)=0$$

لنتأكد من صحة عملية التخصيم (التقويس) التي قمت بها .

إذا كانت عملية التخصيم صحيحة فيجب عند قيامي بضرب محتويات قوسي التخصيم أن أحصل على عناصر المعادلة الأصلية.

$$W \times W = W^2$$

$$W \times (-10) = (-10W)$$

$$15 \times W = 15W$$

$$15 \times (-10) = (-150)$$

أجمع ما يُمكن جمعه من النتائج :

$$15W + (-10W) = 5W$$

حصلت على عناصر المعادلة الأصلية إذاً فإن عملية التخصيم صحيحة.

$$W^2 + 5w - 150 = 0$$

التجربة و الخطأ Trial and Errors

تستخدم طريقة التجربة و الخطأ لحل المشكلات التي تتضمن قوىً و جذور و تتضمن هذه الطريقة تكرار الحسبة لوصول إلى اقرب إجابة صحيحة.

الجبر هندسة مكتوبة

الهندسة جبر مرسوم


الشبكة الإحداثية

THE COORDINATING GRID

التمثيل الإحداثي للبيانات

يتم تمثيل البيانات بشكلٍ بياني على مخططٍ إحداثي يتألف من محورين متقاطعين محورٌ افقي X axis و محورٌ عمودي y axis .

إن تقاطع هذين المحورين يشكل أربع مناطق أو أربعة أرباع إحداثية quadrants، و كل نقطةٍ إحداثية يمثلها زوجٌ من الأرقام تدعى بالإحداثيات coordinate تحدد موقع تلك النقطة على كلٍ من المحور الأفقي X و المحور العمودي Y .



يتقاطع المحور الأفقي Xمع المحور العمودي Y عند نقطة الصفر او الأصل او المنطلق.

القيم العمودية Y الموجودة فوق الأصل أو فوق نقطة الصفر هي قيمٌ موجبة.

القيم الموجودة ميسرة الأصل او نقطة الصفر هي قيمٌ سلبية .

يتم تمثيل القيم الإحداثية بالشكل **(0,0)** .

إلى يمين الأصل الأفقي origin X او نقطة الصفر تكون القيم موجبة.

النقاط الموجودة تحت الأصل العمودي origin Y تكون القيم سلبية.

يحصر المستقيمين الإحداثيين المتقاطعين بينهما أربع أرباع Quadrants .

تتألف الإحداثية من رقمين اثنين تجمع بينهما فاصلة يدلان على موقع تلك الإحداثية على الشبكة الإحداثية .

دائماً نضع الإحداثية ضمن قوسين.

يشير العدد الأيسر في الإحداثية إلى نقطةٍ تقع على المحور الأفقي X axis .

يشير الرقم الأيمن إلى موقعٌ يقع على امتداد المحور العمودي Y axis .

الرسوم البيانية الخطية Linear graphs

يمكن تمثيل الدالة العملياتية function على الشبكة الإحداثية coordinate grid حيث يتم تمثيل مدخلة الدالة على شكل إحداثية أفقية X coordinate ، بينما يتم تمثيل مخرج الدالة (النتيجة) على شكل إحداثية عمودية y coordinate .

تمثيل الدالة الخطية Linear function

الدالة الخطية هي دالة تكون فيها جميع المتغيرات (الأحرف) مرفوعةً للقوة الأولى (غير مرفوعة لأية قوة عملياً)و يمثل هذه الدالة الخطية خطٌ مستقيم.

و الدالة العملياتية function كما علمنا من قبل هي مُعرف يُعرف لنا العملية او العمليات التي تجري على مدخلةٍ ما لإنتاج مخرجة (نتيجة) معينة.

$$f(x)=4x+2$$

$$f(x)=4\times x+2$$

تبين لنا الدالة العملياتية f العمليات التي تجري على مدخلة معينة (x) و ذلك لإنتاج مخرجةٍ معينة ، فالدالة هنا تضرب المدخلة x بالعدد 4 ثم تضيف إليها العدد 2 .

و لكي نتمكن من تمثيل دالةٍ ما تمثيلاً إحداثياً فإننا نقوم بكتابتها على شكل معادلة بحيث يكون Y هو موضوع تلك المعادلة :

$$f(x)=4x+2$$

$$y=4x+2$$

ما الذي تعنيه المعادلة السابقة؟

إنـها تعني بأن النـاتج العمودي Y ينتج عن ضرب المدخلة X بالعدد 4 ثم إضافة 2 لها.

تذكر بأن النـاتج يكون دائماً عمودياً Y .

فكيف نمثل هذه الدالة بشكلٍ بياني ؟

إننا نسجل في جدولٍ مجموع مدخلات و مخرجات هذه الدالة أي مجموع الحلول المحتملة المنطقية الممكنة و النقاط الإحداثية لكل حلٍ ممكن على الإحداثية مثلاً بالنسبة لمعادلتنا السابقة :

$$y=4x+2$$

يمكن ل X أن تكون مثلاً واحد 1 و عندها فإن النـاتج Y سوف يكون 6 :

$$6=4X+2$$

$$6=4(1)+2$$

$$6=4\times(1)+2$$

إذاً ستكون لدي نقطتين إحداثيتين موجبتين هما (1,6) حيث 1 هي المدخلة و 6 هي الخرج (النتيجة).

المدخلة Input X أما المخرجة فهي Output Y .

X أفقي ، Y عمودي

و من الحلول الممكنة (2,10) :

$10=4\times2+2$

المدخلة 2 و الخرج 10(النتيجة) .

(2) X Input المدخلة أفقية

(10) Y output المخرج (الناتج) عمودي

الإحداثية التي تمثل هذا الحل هي (2,10)

$$10=4\times(2)+2$$

نضع دائماً إحداثية المدخلة(المقدمة) X قبل المخرجة(النتيجة) Y لأن إحداثية الدخل افقية بينما إحداثية الخرج عمودية و كما تعلمون فإننا نضع الإحداثية الأفقية X أولى إلى الجهة اليسرى ثم نضع الإحداثية العمودية ثانياً بعد فاصلة في الجهة اليُمنى)

و هكذا ثم نقوم بتمثيل هذه النقاط على الشبكة الإحداثية .

نقوم بتسجيل ما بين 4 و 5 إحداثيات ما لم يطلب منا غير ذلك.

نستخدم دائماً الإحداثية الأفقية X للمدخلات و الإحداثية العمودية Y للمخرجات .

نضع دائما (المدخلة) X قبل (المخرجة) Y:

(X,Y) ابتداءً من الجهة اليُسرى.

حتى لا تنسى تذكر دائماً بأن الحرف X يسبق الحرف Y في الأبجدية اللاتينية و أن السبب يسبق النتيجة .

لا تنسى أن تصل بين النقاط التي تمثل إحداثيات حل معادلةٍ ما .

تمثيل و حل معادلات الميلان

المعادلة الخطية Equation of line


تقاطع Y Y intercept

Y=mx+b


m الميلان

Y نقطة التقاطع العمودية Y intercept

أي النقطة b




لحل معادلة الميلان نحدد نقطتين على المستقيم الإحداثي ثم نرسم مثلثاً قائماً بينهما ، أما الميلان أو الانحدار فإنه البعد العمودي Y مقسوماً على البعد الأفقي X.




تم تحديد المثلث العلوي القائم الزاوية بنقطتين إحداثيتين هما النقطة الأفقية 6X و النقطة العمودية Y3 .


تقع النقطة الأفقية 6 على المحور الأفقي X ،بينما تقع النقطة العمودية 3 على المحور العمودي.


إذا كان الخط البياني صاعداً نحو الأعلى من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى فإن ميلان الخط يوصف عندها بأنه ميلانٌ إيجابي positive slope .





أما إذا كان الخط البياني ينحدر نحو الأسفل فإن ميلانه يوصف بأنه ميلانٌ سلبي negative slope .


I
V_OC
V
R_static< 0
I_SC



قم بإبدال الميلان للحصول على معادلة خطية (معادلة خط) :

Y=mx+b

m الميلان

Y نقطة التقاطع العمودية   Y intercept

أي النقطة b

عندما تكون قيمة m إيجابية فإن الخط يكون صاعداً من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى ، و عندما تكون قيمة m (الميلان) سلبية فذلك يعني بان الخط ينحدر نحو الأسفل.

يمكن حساب ميلان أي خط من خلال إبدال إحداثيتي النقطتين الأفقية Y و العمودية X برموز معادلة الميلان:

$$\frac{(Y_2 - Y_1)}{(X_2 - X_1)}$$

$$\text{الميلان} = \frac{\text{التغير العمودي}\, y}{\text{التغير الأفقي}\, X}$$

الميلان = $\frac{\text{ناتج طرح النقطتين العموديتين } y}{\text{ناتج طرح النقطتين الأفقيتين } X}$

لحساب الميلان فإننا نقوم بطرح قيمة النقطة العمودية الأولى y_1 من قيمة النقطة العمودية الثانية y_2 ،

ثم نقسم الناتج على ناتج طرح النقطة الأفقية الأولى X_1 من قيمة النقطة الأفقية الثانية X_2 .

حتى لا تنسى فإن النقطة الثانية تكون أبعد من النقطة الأولى و لذلك فإن قيمتها غالباً ما تكون أكبر من قيمة النقطة الأولى أي أننا منطقياً نطرح الرقم الأصغر من الرقم الأكبر .

ما لم يكن الميلان سلبياً

$$\frac{(Y_2 - Y_1)}{(X_2 - x_1)}$$

لحساب الميلان فإننا نحتاج إلى نقطتين إحداثيتين علويتين و نقطتين إحداثيتين سفليتين لأن نقطةً واحدة لا تكفي إلا لتحديد نقطة موجودة على مستقيم الأعداد تماماً و ليس خارجه.


لكتابة إحداثية نقطة فإننا نبدأ أولاً بتحديد النقطة الأفقية X ثم نثبت بعدها النقطة العمودية Y ابتداءً من الجهة اليُسرى.

(X,Y)

تذكر دائماً بان الحرف X يسبق الحرف Y في الأبجدية الإنكليزية.

انتبه جيداً لهذه الحالة :

إذا كانت النقطة الإحداثية الأولى تقع تماماً على النقطة الثامنة 8 على المستقيم العموديY ، فذلك يعني بأنه لا علاقة لها أبداً بالمحور الأفقي X و لذلك فإننا نعبر عنها إحداثياً بالشكل (0,8) و الذي يعني بان هذه النقطة تقع على نقطة الصفر على المحور الأفقي X (نقطة تقاطع المحورين) ، بينما تقع عند النقطة 8 تماماً على المحور العمودي Y .



هنالك خطأ في الرسم بالنسبة للإحداثية (8,0) لأننا نذكر النقطة الأفقية و هي هنا صفر 0 قبل النقطة العمودية و هي هنا 8 و لذلك يتوجب كتابة هذه الإحداثية على الشكل (0,8)

لتحديد موقع إحداثية ابدأ بالرقم الأيسر الأفقي ثم اتجه نحو الرقم الأيمن (العمودي).

جميع النقاط الإحداثية التي تقع تماماً على محورٍ من يكون انتمائها للمستقيم الثاني مساوياً للصفر.


أي نقطة تقع تماماً على المستقيم العمودي يكون انتمائها للمستقيم الأفقي صفر و لذلك فإن اسمها يبدأ بصفر نضعه أولاً من الجهة اليسرى و أي نقطة تقع تماماً على المستقيم الأفقي يكون انتمائها للمستقيم العمودي صفر و يكون وضعها الإحداثي مثلاً :

(3,0) (2,0) (1,0)

حيث يشير العدد الأول إلى موقع تلك النقطة على المستقيم الأفقي ، بينما يشير العدد الثاني (صفر) إلى موقع تلك النقطة على المستقيم العمودي y ، فإذا كانت النقطة تقع مقابل كلاً من النقطة الأفقية 4 و النقطة العمودية الثانية 2 فإن وصف هذه النقطة سيكون (4,2) لأن هذه النقطة الإحداثية تقابل النقطة الأفقية 4 على المحور الأفقي و النقطة العمودية 2 على المحور العمودي .

إذاً فقد اصبحت لدينا نقطتين إحداثيتين (0,8) و (4,2) ، نطبق المعادلة :

$$\text{الميلان} = \frac{\text{ناتج طرح النقطتين العموديتين } y}{\text{ناتج طرح النقطتين الأفقيتين } x}$$



(4,2) ، (0,8)

إحداثية علوية (0,8)

إحداثية سفلية (4,2)

لملئ هذه المعادلة نحسب أولاً مقدار التغير العمودي عن طريق طرح الإحداثيتين العموديتين (الرقم الثاني في كلا الإحداثيتين أي 8 و 2 .


نحسب مقدار التغير الأفقي عن طريق طرح النقطة الأفقية الأولى من النقطة الأفقية الثانية أي :

0-4

معادلة حساب الميلان :

لحساب الميلان فإننا نقوم بطرح قيمة النقطة العمودية الثانية y_2 من قيمة النقطة العمودية الأولى y_1 ثم نقسم الناتج على ناتج طرح النقطة الأفقية الثانية X_2 من قيمة النقطة الأفقية الأولى X_1.

$$\frac{0-8}{4-2} = \frac{-8}{2} = (-4)$$



بما أن الخط البياني ينحدر نحو الأسفل فذلك يعني بان انحداره سلبي (-4)

إذا كانت نُقطةٌ إحداثية ما تقع على أحد المحورين تماماً فذلك يعني بأنها لا تنتمي أبداً للمحور الثاني ، أي أن انتمائها للمحور الثاني صفر ،و لذلك فإن وجود الصفر في أي إحداثية يعني بأن تلك النقطة العمودية تقع مباشرةً على أحد المحورين .

و بما أننا نذكر النقطة الأفقية أولاً ابتداءاً من الجهة اليسرى في الإحداثية فإن الصفر إن كان في الجهة اليمنى فذلك يعني بأن تلك النقطة الإحداثية تقع على المحور الأفقي ، و إذا كان الصفر في الجهة اليسرى فذلك يعني بأن تلك النقطة الإحداثية تقع على المحور العمودي.

لأننا نبدأ العد و القياس و التحديد في الإحداثيات ابتداءً من المحور الأفقي الذي يُذكر أولاً ابتداءاً من الجهة اليُسرى.

فإذا رأيت الإحداثية (0,9) مثلاً فإنني أبدأ العد و التحديد ابتداءاً من الجهة الأفقية اليسرى أي من الصفر فأقول بأن انتماء هذه الإحداثية للمحور الأفقي هو صفر و هذا يعني بأنها تقع مباشرةً على المحور العمودي عند النقطة 9.

وإذا رأيت الإحداثية (1,0) مثلاً فإنني أبدأ التحديد ابتداءاً من الجهة الأفقية اليسرى أي واحد 1 فأقول بأن انتماء هذه الإحداثية للمحور العمودي هو صفر و هذا يعني بأنها تقع مباشرةً على المحور الأفقي عد النقطة 1.

تتألف الإحداثية من مستقيمٍ عمودي Y يتقاطع مع مستقيم أفقي X .

لكل نقطة إحداثية عنوانٌ أفقي تمثله النقطة المقابلة لها على المحور الأفقي X و عنوانٌ عمودي تمثله النقطة المقابلة لها على المحور العمودي Y .

عند عنونة و تحديد أي نقطة فإننا نبدأ دائماً بعنوانها الأفقي أي النقطة المقابلة لها على المحور الأفقي X ثم نذكر عنوانها العمودي أي النقطة المقابلة لها على المحور العمودي Y و يتم ذلك ابتداءً من الجهة اليُسرى.

النقطة اليمنى9 عمودية (0,9)النقطة اليسرى0 أفقية


النقطة العمودية التي تقع تماماً على المحور العمودي يكون عنوانها الأفقي صفر


مثال :

(0.5) , (0,3)



النقطة الإحداثية التي تقع تماماً على المحور الأفقي يكون موقعها العمودي صفر .





يشير العدد الأول (الأيسر) إلى موقع النقطة على المستقيم الأفقي ، أي النقطة المقابلة على المستقيم الأفقي.

إذاً لتحديد موقع نقطة أياً تكن فإننا نحتاج إلى نقطتين أولاهما أفقية Xيسرى و الثانية عمودية يمنى y.


(نذكر النقطة العمودية أولاً في الجهة اليسرى)


ميلان خط هو مقدار التغير العمودي (الفرق بين النقطتين العموديتين أو ناتج طرح نقطتين عموديتين) مقسوماً على معدل التغير الأفقي (الفرق بين النقطتين الأفقيتين او ناتج طرح نقطتين أفقيتين) .

أي أن

ميلان خط هو ناتج طرح النقطة العمودية السفلى من النقطة العمودية العليا مقسوماً على ناتج طرح النقطة الأفقية السفلى من النقطة الأفقية العليا .

إذا كان الميلان سلبياً فذلك يعني بان الخط هابطٌ او نازل أما إذا كان الميلان إيجابياً فذلك يعني بان الخط صاعد.





دائما ابدأ بتسمية النقطة الإحداثية من الخط الأفقي X (السفلي) نحو الخط العمودي Y العلوي.

الخطوط المتوازية و الخطوط المتعامدة

يمكن استخدام الإحداثيات لبيان ما إذا كان مستقيمين على تلك الشبكة الإحداثية متقاطعين أو متوازيين .

إذا كانت درجة ميلان خطين متماثلة فذلك يعني بأن هذين الخطين متوازيين.

إن معادلة ميلان خط في شبكةٍ إحداثية هي :

$Y=mx+b$

حيث m تمثل درجة ميلان الخط .

b تمثل نقطة التقاطع العمودية y intercept

مثال :

إذا كان لدي مستقيم معادلة ميلانه :

$Y=4x+6$

فإن ذلك يعني بأن ميلان هذا الخط يبلغ 4 و أن هذا المستقيم يتقاطع مع المحور العمودي y عند النقطة 6 .

إذاً فإن المهم في مسألة الميلان هو إحداثية المستقيم العمودي y .

يمثل المتغير m ميلان الخط (و هو هنا 4) بينما يمثل المتغير b نقطة التقاطع العمودية Y intercept ، أي عند أي نقطة تقاطع الخط البياني مع المحور العمودي y .

$Y=mx+b$

إن العدد 6 يشير إلى أن هذا الخط البياني قد تقاطع مع المستقيم العمودي عند النقطة 6 و أن إحداثياته العليا هي (0,6).

تذكر دائماً بأننا نذكر أولاً النقطة الأفقية (و هي هنا تساوي صفر) لماذا ؟

لأن هذه النقطة تقع عند النقطة العمودية 6 .


أي نقطة تقع على المحور العمودي مباشرةً فإن عنوانها الأفقي X يكون صفراً0 .

ما يهمنا عند قياس الميلان هو النقطة العمودية Y التي يتقاطع فيها المحور البياني مع المحور العمودي Y .

يمثل m درجة ميلان الخط .

إذا قيل لنا بأن هنالك مستقيمٌ آخر موازي لهذا المستقيم فذلك يعني بأن درجة ميلانه تماثل درجة ميلان هذا المستقيم أي 4 حيث يتوجب على كلا المستقيمين إذا كانا متوازيين أن يكون ميلانهما m بقيمة 4 كذلك.

حتى لا تنسى تذكر بأن الحرف اللاتيني m يوازي الحرف الأول ميم في كلمة (ميلان) .



و **إذا كان لدينا خطٌ آخر يتقاطع مع المحور العمودي y عند النقطة 2 مثلاً فذلك يعني بأن عنوانه الإحداثي هو (0,2) ، أي أنه يتقاطع مع المستقيم الإحداثي الأفقي X عند النقطة صفر) أو أنه يقابل النقطة الأفقية صفر بينما يتقاطع مع المحور العمودي Y عند النقطة 2 .**

إذا وقعت نقطةٌ ما على المحور العمودي تماماً فذلك يعني ضمنياً و افتراضياً بان قيمتها الأفقية (صفر) و لا يمكن لها أن تكون غير ذلك.

نحن نذكر دائماً النقطة الأفقية التي تقع على المحور الأفقي X أولاً (و هي هنا صفر) ، ثم نذكر بعد ذلك النقطة العمودية و هي هنا (0,2) .

إذا قيل لنا بأن المحور الثاني موازي للمحور الأول علمنا بأن درجة ميلانه مساوية لدرجة المحور الأول أي 4 .

فإذا كانت معادلة الميلان العامة للمستقيمات هي :

$$Y=mx+b$$

حيث **b هي النقطة التي يتقاطع فيها الخط البياني مع المحور العمودي .**

و إذا كان **m هي درجة الميلان** فإن معادلة ميلان المستقيم الأول هي :

$$Y=4x+6$$


أي أن ميلانه 4 و أنه يتقاطع مع المحور العمودي y عند النقطة 6 ، فإن معادلة المستقيم الثاني الموازي له هي :


$$Y=4x+2$$

حيث 4 هي درجة الميلان.

فإذا كان لدينا مستقيمين متوازيين فيجب أن يكون ميلانـهما واحداً.

2 هي النقطة التي يتقاطع فيها الخط البياني مع المحور العمودي y (0,2)





الخطوط المتعامدة Perpendicular lines

الخطوط المتعامدة على الشبكة الإحداثية هي الخطوط التي تشكل زاويةً قائمة 90° درجة عندما تتقاطع مع بعضها.

إن ناتج ضرب خطين متعامدين يجب أن تكون قيمته -1 .

أي خطين ناتج ضرب ميلانهما مع بعضهما البعض -1 فيجب أن يكونا متعامدين.

ناتج ضرب ميلان أي خطين متعامدين يجب أن يكون 1 .

$1\times-1=-1$

$0.5 \times -2 =-1$

$0.25 \times-4=-1$

$0.125 \times -8 = -1$

$0.1 \times-10=-1$

$0.2 \times -5=-1$

للحصول على ناتج ضرب يساوي -1 نقسم العدد واحد على أي قيمة إيجابية ثم نضرب الناتج بالقيمة ذاتها و هي سلبية.

$$1\div16=0.0625$$

$$0.0625\times(-16)= (-1)$$

إذا كان لدي خطين على شبكة إحداثية أولهما معادلته :

$$Y=-4x+7$$

فذلك يعني بأن **درجة ميلان هذا الخط تبلغ -4 و أنه يقع على النقطة العمودية السابعة أي أن إحداثيته هي (0,7) حيث أن الرقم الأول صفر 0 يشير إلى موقع تلك النقطة على المستقيم الأفقي X بينما يشير العدد 7 إلى موقع تلك النقطة على المستقيم العمودي Y .**

و إذا كان لدي مستقيمٌ آخر على تلك الشبكة الإحداثية معادلته :

$$Y=0.25X+4$$

فذلك يعني بأن درجة ميلان هذا الخط تبلغ 0.25 و أنه يقاطع المحور العمودي Y عند النقطة العمودية الرابعة ، أي أن عنوانه الإحداثي هو (0,4) ، حيث يشير الصفر 0 إلى أن موقع هذا الخط بالنسبة للمحور الأفقي X هو صفر ، بينما يشير 4 إلى موقع النقطة التي يتقاطع فيها هذا الخط مع المحور العمودي Y .

الآن : **هل هذين المستقيمين متعامدان ؟**

لمعرفة ذلك فإننا نقوم بضرب ميلانهما ببعضهما البعض فنقول :

$$-4\times0.25=(-1)$$

أي أن هذين المستقيمين متعامدان.

إذا طلب مني أن أثبت بأن مستقيمين ما متعامدين Perpendicular فإنني أقوم بضرب درجتي ميلانهما مع بعضها البعض و بمجرد أن أحصل على 1- فذلك إثباتٌ نهائي بأنهما متعامدان (يتقاطعان بزاوية قائمة 90°).

إذاً بينما يكون للخطوط المتوازية درجة الميلان ذاتها فإن الخطوط المتعامدة يكون ناتج ضرب ميلانها ببعض 1- .


1- negative reciprocals.

لا تمتد جميع الخطوط المستقيمة في كلا الاتجاهين إلى ما لا نهاية ذلك أن هنالك خطوطٌ محددة line segment حيث يكون لها نهايتين محدودتين endpoints ، و من الناحية الهندسية إذا علمنا نهايتي قطعة خطية line segment فإن بإمكاننا أن نحسب طولها و منتصفها . midpoint

إذا تخيلنا بأن القطعة الخطية وترٌ لمثلثٍ قائم الزاوية فإن بإمكاننا أن نستخدم نظرية فيثاغورث Pythagorean theorem لحساب طولها .

وتر المثلث hypotenuse القائم الزاوية هو أطول ضلعٍ في المثلث القائم الزاوية كما أنه الضلع المائل الوحيد في المثلث القائم الزاوية و هو الضلع الوحيد المقابل للزاوية القائمة 90° في المثلث القائم الزاوية.

و فقاً لنظرية فيثاغورث فإن مربع وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي طول ضلعيه الآخرين .



$$a^2 + b^2 = c^2$$

و بالتالي فإن **طول وتر مثلث قائم الزاوية يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعي ضلعيه الآخرين ، على اعتبار أن الجذر التربيعي هو القيمة المعاكسة للجذر التربيعي ، أي أن عملية التجذير التربيعي هي العملية المعاكسة لعملية الرفع للقوة الثانية** :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$C = \sqrt{a^2 + b^2}$$

لماذا جردت قياس الوتر c من القوة الثانية و لم أجرد طولي الضلعين الآخرين a^2 $+b^2$ **من القوة الثانية ؟**

لأنني إذا جردتهما من قوتهما ، أي إذا حسبت الجذر التربيعي لمجموع طوليهما (a+b) دون قوة فسوف لن أحصل على مجموع طوليهما دون قوة و إنما فإنني سوف أحصل على رقمٍ آخر لا علاقة له بمجموع طوليهما، و غالباً فإنني سوف أحصل على رقمٍ غير منطقي.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c=\sqrt{a^2 + b^2}$$

إن ناتج عملية الجمع (طول الوتر) مجرداً من القوة التربيعية لا يُساوي مجموع طولي الضلعين الآخرين مجردين من القوة التربيعية .


أي أنه يساوي الجذر التربيعي ليس لمجموع الضلعين الآخرين و إنما لمجموع مربعي طوليهما.

التجذير التربيعي هو العملية المعاكسة للرفع للقوة .

أقوم بتجذير أي قيمة مرفوعة للقوة الثانية تجذيراً تربيعياً حتى أعرف قيمتها الأصلية دون رفعٍ للقوة.

$$10^2=10\times10=100$$

$$\sqrt{100} = 10$$




لدي مثلثٌ قائم الزاوية طول ضلعه الأول 10^2 و طول ضلعه الثاني 4^2 فكم يبلغ طول وتره؟

وفقاً لأطروحة فيثاغورث فإن مربع طول وتر المثلث يساوي مجموع مربعي طول ضلعيه الآخرين أي 4^2+10^2 ، أي أن وتر هذا المثلث يساوي الجذر التربيعي ل 4^2+10^2

$$\sqrt{4^2+10^2}=10+4=14$$

أي أن طول وتر هذا المثلث 14 سنتمتر.



الخط البياني المائل يمثل وتر المثلث القائم الزاوية و الذي قمنا بحساب طوله باستخدام اطروحة فيثاغورث.

المستقيم البياني المائل c يمثل وتر المثلث.

المثلث الوهمي القائم الزاوية الناتج عن الخط الإحداثي له زاوية قائمة 90° درجة تقع عند نقطة الصفر.


زاويتي المثلث الوهمي الأخريين تحددهما نقطة إحداثية تقع على الخط الإحداثي الأفقي X و نقطة إحداثية تقع على المحور العمودي Y ، و كما مر معنا فإن كل نقطة إحداثية لها عنوان أفقي X ، و إذا كانت النقطة الإحداثية تقع على المحور الأفقي X مثلاً فإن عنوانها العمودي يكون صفراً 0 ، أما إذا وقعت على المحور العمودي تماماً فإن عنوانها الأفقي يكون صفراً 0 .

ما هي المحددات العمودية (البداية و النهاية) للضلع الوهمي القائم للمثلث القائم الزاوية؟

بما أن هذا الضلع ضلعٌ عمودي فإنه يقع على المحور العمودي Y(و هو الضلع القائم الذي يتعامد مع قاعدة المثلث مُشكلاً زاوية قائمة) و بالتالي فإن النقطتين التين تحددان طوله (بدايته و نهايته) تقعان على المستقيم العمودي Y و هما بالطبع نقطتين عموديتين ، أما طول هذا الضلع العمودي فإنه الفرق ما بين هاتين النقطتين .

طول الضلع العمودي يساوي :

$$Y_2 - Y_1$$



إن طول قطعة خطية line segment (وتر المثلث الوهمي الذي يصل ما بين نقطة عمودية y و نقطة أفقية X تساوي الجذر التربيعي للفرق ما بين النقطتين الأفقيتين (قاعدة المثلث الوهمي) و الفرق ما بين النقطتين العموديتين(الضلع القائم في المثلث الوهمي) :

$$\sqrt{}(X_2-X_1)^2 + (Y_2-Y_1)^2$$

هذه المعادلة هي المعادلة الموازية لطريقة حساب طول وتر المثلث وفق طريقة فيثاغورث فالفرق بين النقطتين الأفقيتين التين تحددان الخط الأفقي (X_2-X_1) يمثل طول قاعدة المثلث (الضلع الافقي للمثلث القائم الزاوية) و هو مرفوعٌ للقوة الثانية كما هي الحال في أطروحة فيثاغورث (مربع الضلع الأول) .

الفرق ما بين نقطتين عموديتين $(Y_2-Y_1)^2$ تمثلان طول الضلع العمودي (القائم) ، وهي كذلك قيمةٌ مرفوعةٌ للقوة الثانية (كما هي حال أطروحة فيثاغورث)، و كما تذكرون فإن أطروحة فيثاغورث تقول بأن مربع وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مربع مجموع طولي ضلعيه الآخرين.


إن طول وتر المثلث القائم الزاوية (انتبه طول الضلع مجرداً من التربيع و ليس مربع الطول) = يساوي الجذر التربيعي لمجموع ضلعيه الآخرين .

إن هذه المقولة توازي تماماً هذه المعادلة :

$$\sqrt{}(X_2-X_1)^2 +(Y_2-Y_1)2$$

وتر المثلث القائم الزاوية يساوي الجذر التربيعي لمربع طول ضلعه الافقي

(X_2-X_1) **+** زائد الجذر التربيعي لمربع طول ضلعه العمودي (Y_2-Y_1).



Pythagorean theorem




النقطة الوسطى في قطعة خطية Midpoint of a line segment

النقطة الوسطى في قطعة خطية هي النقطة التي تقع في المنتصف تماماً بين نهايتيها (طرفيها) .

يمكن حساب إحداثيات النقطة الوسطى midpoint عن طريق جمع إحداثيات نهايتيها (طرفيها) ثم قسمة الناتج على 2 .

يرمز للنقطة الوسطى بالحرف M .

إن بعد النقطة الوسطى يعادل طول القطعة الخطية تقسيم 2 ، على اعتبار ان النقطة الوسطى تقع في منتصف القطعة الخطية ، أما طول القطعة الخطية فإنه يساوي بداية النقطة الخطية مع نهايتها) سواءً أكانت تلك القطعة الخطية أفقيةً أو عمودية :



النقطة الوسطى تساوي مجموع النقطتين الأفقيتين X_1+X_2 تقسيم 2 (بالنسبة للخط الأفقي) .

النقطة الوسطى تساوي مجموع النقطتين العموديتين Y_1+Y_2 تقسيم 2 (بالنسبة للخط العمودي) .

التجذير التربيعي √ هي العلاقة المعاكسة للرفع للقوة ، و علاقة التجذير التربيعي هي العلاقة المعاكسة علاقات الرفع للقوة الثانية.

التمثيل البياني للمعادلات التربيعية Quadratic graphs

الخط البياني الذي يمثل المعادلة التربيعية لا يكون خطاً مستقيماً و إنما يمثلها خطٌ منحني يدعى بالقطع المكافئ parabola (لا خطٌ مستقيم) .

نصل بين النقاط الإحداثية المختلفة التي تمثل المعادلة التربيعية بخطٍ بياني منحني .


نبدأ برسم الخط البياني المنحني ابتداءً من أعلى الجهة اليسرى .

كل النقاط التي يلامس فيها المنحني المحور الفقي X تمثل جذور الدالة function roots .

نقوم بتثبيت النقاط الإحداثية على الشبكة الإحداثية و بالطبع فإن كل نقطة إحداثية تتألف من إحداثية افقية X (يسرى) و إحداثية عمودية Y يمنى تفصل بينهما فاصلة ، و نضعهما بين قوسين .

مثال :

الإحداثية (6,4) تقع مقابل النقطة الأفقية السادسة التي تقع على المحور الأفقي X ، كما تقع مقابل النقطة العمودية الرابعة .



حل المعادلات باستخدام المخططات البيانية

يمكن استخدام المخططات البيانية في حل المعادلات ذلك أن جميع النقاط الموجودة على امتداد الخط البياني للمعادلة تمثل حلولاً ممكنة للمعادلة .

تحديد الدالة العملياتية $f(x)$

إن التمثيل البياني للدالة $f(x)$ يُظهر المدخل الأفقيX للخرج العمودي Y(النتيجة) .

لتكن لدي المعادلة التالية :


$$f(X)=X+5$$

الإحداثية (4,9) تعني 4 أفقي و 9 عمودية حيث أن النقطة اليسرى 4 تكون دائماً أفقية بينما تكون النقطة اليمنى (هنا 9) دائماً عمودية .

إن الإحداثية (4,9) تعني بأننا إذا مددنا خطاً عمودياً من النقطة الأفقية الرابعة 4 نحو الأعلى ثم مددنا خطاً من النقطة العمودية الخامسة 5 حتى يلتقي بالخط الوهمي الصاعد من النقطة الأفقية الرابعة 4 فإن هذين الخطين سوف يلتقيان عند نقطةٍ تعادل النقطة التاسعة 9 على المحور العمودي Y .


$$f(X)=X+5$$

$$f(9)=4+5$$



$$f(X)=X+5$$

$$f(9)=4+5$$



الدالة (X) هي ناتج المعادلة .

4 هي النقطة الأفقية على المحور الأفقي X .

5 هي النقطة العمودية على المحور العمودي .

حل المعادلة يكون عند النقطة التي تلتقي فيها الخطوط الوهمية من تلك النقاط الثلاثة في الإحداثية :

القيمة الأولى أي القيمة اليسرى هي قيمةٌ أفقية بينما القيمة الثانية (اليمنى) تمثل نقطة عمودية.

حل المعادلات المتناظرة Simultaneous equations باستخدام المخططات البيانية.

حل المعادلات يكون عند النقطة التي تتقاطع فيه الخطوط البيانية .

الخطوط المتوازية لا تتقاطع ابداً و لذلك فإن المعادلات التي تمثلها خطوطٌ بيانية متوازية لا حل لها.

لتكن لدينا المعادلتين المتناظرتين التاليتين :

$$X+Y=10$$

$$3X-Y=18$$

نقوم بإعادة ترتيب هاتين المعادلتين بحيث نجعل من Y موضوعاً لها :

$$X+Y=10 \rightarrow Y=(-X)+10$$

المعادلة الثانية :

$$3X-Y=18 \rightarrow Y=3X-18$$

نجعل من Y موضوعاً أو مجهولاً للمعادلة .

حتى نعرف كيفية إعادة ترتيب العمليات في المعادلة عند إعادة ترتيب عناصرها فإننا نستبدل رموز المعادلة بأعداد بسيطة مثلاً :

$$1+2=3 \rightarrow 3=2-1$$

$$3-2=1 \rightarrow 2=3-1$$

الآن نكتب جدولاً بالحلول الممكنة لكل معادلة :

المعادلة الأولى :

$$X+Y=10$$

احتمالات الحل المنطقية :

$$X=1, Y=9$$

$$X=2, Y=8$$

$$X=3 , Y=7$$

$$3+7=10$$

نضع هذه الاحتمالات على شكل إحداثيات ، حيث تتألف كل إحداثية بالطبع من رقمين تفصل بينهما فاصلة : الرقم اليساري يشير إلى نقطةٍ أفقية تقع على المحور الأفقي X ، بينما يشير الرقم اليميني إلى نقطة عمودية تقع على المحور العمودي Y .

أي ان إحداثيات هذه المعادلة سوف تكون :

$$(1,9)\ ,\ (2,8)\ ,(3,7)$$

الآن نأتي إلى المعادلة الثانية :

$$3X-Y=18 \rightarrow Y=3X-18$$

نضع مجموعات احتمالات الحل المنطقية الممكنة :

$$X=7,\ Y=3\ ,3X=21$$

$$18=21-3$$

$$(3,7)$$

$$(0,-18)$$


(1,-15)

(2 , -12)

(5,-3)

(6,0)

بعد وضع مجموعة الاحتمالات (الحلول الممكنة لكلا المعادلتين المتزامنتين) نقوم بتثبيتها على المخطط البياني بحيث يمثل كل حلٍ محتمل للمعادلة نقطة بيانية تقع على الخط البياني ثم نصل بين النقاط التي تمثل حل المعادلة :


10
9 (1,9)
8 (2,8)
7 (3,7)
6
5
4
3
2
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12 (,2,-12)
-13
-14
-15 (1,-15)

$$X+Y=10$$

$$3X-Y=18$$

هل يمكن حذف أحد المتغيرين (المجهولين) ؟

كما ترون فإن المعادلتين تحويان عنصرين متماثلين مختلفي الشارة :

$$+Y$$

$$-Y$$

و بما أن هذين المتغيرين متماثلين و متعاكسي الشارة فإن بإمكاننا التخلص منهما عن طريق جمع هاتين المعادلتين مع بعضهما البعض (قيمتين متماثلتين متعاكستي الشارة محصلتهما صفر) :

$$X+Y=10+3X-Y=18$$

$$+Y + -Y = 0$$

نتابع إجراء عملية الجمع بين الحدود المتشابهة (الحدود التي متغيرها متماثل):

$$X = 10 + 3X = 18$$

$$X + 3X = 1X + 3X = 4X$$

$$4X = 10 + 18$$

$$10 + 18 = 28$$

لتصبح معادلتنا على الصورة التالية :

$$4X = 28$$

لا يمكن أن نجمع رقمين متغيريهما (الحرفين المرافقين لهما) مختلفين.

لا يمكن أن نجمع رقماً لا يرافقه متغير (حرف) مع متغير(حرف) .

و الآن أصبحت لدينا عملية ضرب $4X$ أي $4 \times X$ و لحل هذه المعادلة فإننا نعكس عملية الضرب محولين إياها إلى عملية قسمة حيث نقسم كلا طرفي عملية الضرب على العامل العددي للمتغير أي العدد المرافق للمتغير X

أي العدد 4 :

$$\frac{4X}{4} = \frac{X}{1}$$

$$\frac{28}{4} = 7$$

$$X = 7$$

$$X + Y = 10$$

$$7 + Y = 10$$

$$Y = 10 - 7$$

$$Y = 3$$

نتأكد من صحة الحل الذي توصلنا إليه عن طريق ابدال المجهولين أينما وردا في هاتين المعادلتين بالحلين الذين توصلنا لهما :

$$X+Y=10$$

$$7+3=10$$


$$3X-Y=18$$

$$3(7)-3=18$$

$$3\times(7)=21-3=18$$

تمثيل حل المعادلة بيانياً (7,3)

لاحظ كيف أن إحداثية الحل تقع مقابل النقطة الأفقية السابعة و النقطة العمودية الثالثة.



نضع الاحتمالات التي توصلنا إليها على المخطط البياني بحيث تمثل كل إحداثية نقطة بيانية ثم نصل بين النقاط التي تمثل حل المعادلة.

إذا كانت المعادلة أو المعادلتين التين نقوم بحلهما خطيتين linear فإن الخط الذي يمثلها سوف يكون خطاً مستقيماً.

حل المعادلتين المتزامنتين يكون في نقطة تقاطع المستقيمين البيانيين.

نقطة تقاطع الخطين الذين يمثلان كلا المعادلتين يمثل حل المعادلة .

النقطة البيانية أو العنوان البياني لنقطة تقاطع الخطين الذين يمثلان المعادلتين يمثلان حل المعادلة .

نثبت احتمالات الحل على شكل نقاطٍ إحداثية على المخطط البياني.

إذا حصلنا على خطين متوازيين يمثلان المعادلتين و ليس خطين متقاطعين فذلك يعني بان المعادلة لا حل لها.

في المعادلات المتزامنة Simultaneous equations عندما تكون إحدى المعادلتين تربيعية quadratic بينما تكون الثانية خطية linear فإن الخطوط البيانية التي تمثل هاتين المعادلتين قد تتقاطع مرةً واحدة أو مرتين و قد لا تتقاطع أبداً ، أما الحلول المحتملة فهي 2,1,0

لحل معادلتين خطيتين تربيعيتين فإننا نقوم بتمثيل هاتين المعادلتين على شبكة بيانية واحدة **، و كما هي العادة فإن النقاط الإحداثية التي تتقاطع عندها الخطوط البيانية التي تمثل هاتين المعادلتين تمثل حلول هاتين المعادلتين.**

التأكد من صحة الحل:

نتأكد من صحة الحل الذي توصلنا إليه عن طريق إبدال المجاهيل في المعادلتين بالحلول الرقمية التي توصلنا لها.

اللامتعادلات Inequalities

انعدام المساواة هو علاقةٌ بين تعبيرين رياضيين و هذه رموز علاقاتها و عملياتها:

يساوي أو أصغر من≥ يساوي أو أكبر من

يساوي أو أكبر من≤ يساوي أو أصغر من

أصغر $>$ أكبر

أكبر $<$أصغر من

لا يساوي ≠

$X \leq 4$

X أصغر من 4 أو تساويها اي أن X يمكن أن تكون 4 أو أي قيمة أدنى من ذلك.

$$X > 5$$

يمكن للمتغير X أن يكون أي قيمة أكبر من 5 و لكن لا يمكن له أن يكون مساوياً للعدد 5.

حل اللامتعادلات

يتم حل اللامتعادلات وفق الطرق التي نتبعها في حل المعادلات كما مرت معنا سابقاً و ذلك عن طريق عزل المتغير (المجهول) ، و كما هي الحال عند حل المعادلات حيثُ نطبق على كل طرفٍ من طرفي اللامتعادلة الخطوات ذاتها التي قمنا بتطبيقها على الطرف الآخر حتى نبقي اللامتعادلة صحيحة و متناسبة .

و لكن في اللامتعادلة عندما نضرب برقمٍ سلبي فإنه يتوجب علينا أن نعكس اتجاه شارة اللامساواة(عدم التساوي) اكتب المعادلة هنا. **.**

في اللامتعادلة عندما نضرب برقمٍ سلبي فإنه يتوجب علينا أن نعكس اتجاه شارة اللامساواة(عدم التساوي)

في اللامتعادلة عندما نضرب برقمٍ سلبي فإنه يتوجب علينا أن نعكس اتجاه شارة اللامساواة(عدم التساوي)

.

لتكن لدينا اللامتعادلة التالية

$$16-3X> 9$$

نقوم بعزل المتغير X و ذلك عن طريق طرح الرقم 16 من كلا طرفي المتعادلة:

$$16-3X-16>9-16$$

طبعاً لا يمكن طرح 3X من 16 .

لماذا؟

لأنه لا يمكن جمع و طرح الحدود غير المتشابهة ، أي الحدود التي لا يكون متغيرها (حرفها) واحداً.

نجري عمليات الطرح المعلقة :

$$16-16=0$$

و بذلك نكون قد نقلنا الرقم 16 لطرف المعادلة الآخر و ذلك لعزل المتغير X في أحد طرفي اللامتعادلة:

لتصبح لامتعادلتنا على الصورة التالية :

$$-3X>9-16$$

كما ترون فإن لدينا عملية طرحٍ معلقة قابلة للتنفيذ :

$$9-16=-7$$

كان لدي 9 دولارات و كانت علي غرامة أو دين مقداره -16 دولار ، دفعت الدولارات التسعة التي بحوزتي فبقي علي دين يساوي -7 دولار.

فتصبح اللامتعادلة على الصورة التالية :

$$-3X > -9$$

أحول القيم السلبية في اللامتعادلة إلى قيمٍ إيجابية عن طريق ضرب اللامتعادلة بناقص واحد (-1) :

$$-3X \times (-1) = 3X$$

$$-9X \times (-1) = 9$$

سالب ×سالب = موجب

عدو(-) عدوك (-) صديقك (+)

$$3X > 9$$

لا ننسى بعد ضرب اللامتعادلة بعددٍ سالب ان نعكس اتجاه شارة اللامساواة.

$$3X > 9$$

$$3X < 9$$

اصبحت لدينا الآن عملية ضرب $3 \times X$ أي $3 \times X$.

لحل اللامتعادلة فإننا نعكس عملية الضرب لتصبح عملية قسمة ، حيث نقسم كلا الطرفين على العامل العددي المرافق للمتغير أي على العدد 3 :

$$\frac{3X}{3} = 1X = X$$

$$3 \div 3 = 1$$

$$\frac{9}{3} = 3$$

إذاً فإن المتغير X أقل من 3 .

جميع الأعداد الأكبر من 3 تصلح لأن تكون حلاً.

اللامتعادلات المركبة Compound Inequalities

يمكن استخدام شارتي عدم تعادل لبيان أكبر و أدنى قيمة تعبيرٍ ما.

$3< 9+2 \leq 12$

التعبير عن علاقات التساوي و عدم التساوي على مستقيم الأعداد :

نضع دائرةً مفرغة O إن لم يكن العدد يمثل حلاً ممكناً ، فإذا قلنا بأن قيمة X مثلاً هي أقل أو أكبر من العدد 7 فإن ذلك يعني بأن المتغير X إما أن يكون اصغر أو أن يكون أكبر من 7 و لكن لا يمكن له أن يساوي 7 ، أي لا يمكن له أن يساوي الحل الممكن و وبذلك فإننا نضع دائرةً مفرغة O.

O 7

بخلاف المعادلات و شارات المساواة فإن شارات عدم التساوي تجمع بين قيمٍ غير متساوية .

حل اللامتعادلة يكون مجموعة أعداد و ليس عدداً واحداً فإذا قلت مثلاً بأن المتغير X هو أقل من 8 فإن جميعَ الأعداد الأقل من 8 هي حلولٌ ممكنة ، و إذا مثلنا ذلك على مستقيم الأعداد فإننا نضع حلقةً أو دائرةً مفرغة بجوار العدد 8 على مستقيم الأعداد :

O 8

لماذا عندما نضرب اللامتعادلة بعددٍ سالب يتوجب علينا أن نقلب الشارة؟

لتكن لدينا اللامتعادلة التالية :

$1> 0$

واحد أكبر من صفر – الصفر أصغر من واحد

لنضرب طرفي المعادلة بعدد سالب 1- بعددٍ سالب :

$0\times-1=0$

كل ما نضربه بصفر ناتجه صفر.

$1\times-1=(-1)$

سالب × موجب=سالب

عدو(-) صديقك (+) = عدوك(-).

كيف تصبح اللامتعادلة الآن ؟

$1> \mathbf{0}$

واحد أكبر من صفر

$\mathbf{-1 < 0}$

الصفر أكبر من ناقص واحد

ناقص واحد (1-) أقل من الصفر.

و هذا حقيقي لأن 1- ناقص واحد يقع تحت الصفر وهو أدنى من صفر.

لاحظ كيف قلبنا شارة أكبر و أصغر عندما ضربنا بعددٍ سالب (1-) .

تمثيل اللامتعادلات الخطية Graphing linear inequalities

في بعض الأحيان قد تحتوي اللامتعادلة على متغيرين (حرفين أو مجهولين) اثنين و لذلك يمكن تمثيلها على المخطط البياني:

حتى يمكن تمثيل معادلة على خطٍ بياني فيجب ان تحتوي على متغيرين اثنين : متغيرٌ أفقي X و متغيرٌ عمودي Y (متغيرٌ افقي X أيسر و متغيرٌ عمودي Y أيمن)

(X,Y)

ذكرت سابقاً بأن **المعادلات المتزامنة هي المعادلات التي تكون قيمة مجهولٍ أو أكثر فيها متماثلة تكون معادلاتٍ تمثلها خطوطٌ بيانية متقاطعة حيث يمثل كل خطٍ معادلة و نقطة تقاطع خطين مع بعضهما البعض تمثل حل كلتا المعادلتين Intersection of line .**

الخطوط المتواصلة solid lines تبين بأن النقاط الإحداثية التي تقع عليها ضمن الحلول الممكنة للمعادلة.

النقاط المتقطعة تبين بأن النقاط البيانية التي تقع عليها ليست من ضمن الحلول الممكنة.

اللامتعادلات التربيعية Quadratic inequalities

اللامتعادلات التربيعية هي اللامتعادلات التي تحتوي على أجزاء مرفوعة للقوة الثانية و هذه تختلف عن اللامتعادلات الخطية linear inequalities من ناحية أن التعابير التربيعية لها جذرين (النقاط التي يتقاطع فيها الخط البياني مع المحور الأفقي) .

ترسيم اللامتعادلات التربيعية Graphing quadratic inequalities

كما أن ترسيم المعادلات التربيعية يساعد على حلها فإن ترسيم اللامتعادلات التربيعية يساعد كذلك على حلها.

بما أن المعادلة تتألف من جزئين متساويين فذلك يعني بأن طرح هذين الجزئين المتساويين من بعضهما البعض أو جمعهما مع بعضهما البعض إذا كانا متعاكسي الشارة يعطي صفراً و لذلك فإن حل المعادلات التربيعية يقوم على جعل تلك المعادلات تتألف من قسمين متساويين أحدهما مساوي للصفر.

لتكن لدينا اللامتعادلة التالية :

$$-X^2+12X-30< 3-X^2+12X-30< 3$$

لا متعادلة تربيعية لأنها تحوي حداً مرفوعاً للقوة الثانية و هو X^2 .

نعيد ترتيب هذه اللامتعادلة بحيث نجعل من قيمة أحد طرفيها صفر 0 .

$$-X^2+12X-3< 3-X^2+12X-30< 3$$

$$-X^2+12X-3<0$$

ماذا فعلت؟

بما أن محصلة اللامتعادلة السابقة أقل من 3 كما يشير الجزء الأخير منها 3 > أي أنها إما أن تكون 2 أو واحد 1 فما الذي يحدث عندما أطرح من هذه اللامتعادلة العدد 3؟

إنها سوف تصبح حتماً أقل من الصفر:

$$-X^2+12X-3<0$$

إذاً فقد طرحت القيمة التي هي أكبر من اللامتعادلة أي 3 من طرف اللامتعادلة الأول و بذلك فقد أصبحت قيمة اللامتعادلة أقل من صفر تماماً كأن اقول بأن :

$$2+3<6$$

أي 2+3 أقل من 6 ، فماذا لو طرحت 6 من 2+3؟

$$2+3-6$$

إن الناتج سوف يكون أقل من صفر .

و هذه الاستراتيجية هي استراتيجية تصفير اللامتعادلة أي جعلها مساويةً للصفر.

الآن بعد أن فهمنا ماذا يعني أسلوب التصفير سوف نحل لا متعادلة تربيعية بشكلٍ كامل:

لتكن لدينا اللامتعادلة التربيعية التالية :

$$-X^2+5X-1 < 3$$

هي لامتعادلة تربيعية لأنها تحتوي عنصراً مرفوعاً للقوة الثانية هو $-X^2$

.

نقوم بإعادة ترتيب عناصر اللامتعادلة بحيث نجعل أحد طرفيها صفراً 0 وذلك باستخدام أسلوب التصفير الذي مر معنا سابقاً ، فإذا كانت قيمة هذه اللامتعادلة ، أو إذا كانت قيمة طرفها الأيسر

أقل من 3 كما يشير حدها الأخير < 3 **، أي أن قيمة طرفها الأيسر تساوي واحد أو اثنين .**

إذاً ماذا لو طرحت العدد 3 من هذه اللامتعادلة؟

$$-X^2+5X-1 < 3$$

$$-X^2+5X-1-3 \rightarrow$$

$$-X^2+5X-1-3$$

$$=$$

$$-X^2+5X-4$$

لماذا ناقص 4 ؟

لأن ناقص 1 ناقص 3 تساوي ناقص 4 :

$$-1-3=-4$$

أي أننا عندما نطرح واحد ثم نطرح ثلاثة فكأننا طرحنا أربعة 4 .

$$-X^2+5X-4<0$$

و عندها فإنها سوف تصبح بالتأكيد أقل من الصفر :

$$-X^2+5X-4<0$$

و بعد ذلك فإننا نستبدل شارة اللاتعادل بشارة مساواة :

$$-X^2+5X-4<0$$

$$-X^2+5X-4=0$$

و بذلك فإننا نكون قد حولنا اللامتعادلة التربيعية إلى معادلة تربيعية .

الان نقوم بتخصيم (تقويس) المعادلة التربيعية :

$(-X+1)\ (X-4)$

نتأكد من صحة عملية التخصيم (التقويس) factoring عن طريق ضرب كل محتويات القوس الأولى بجميع محتويات القوس الثانية :

$$-X \times X = (-^2X)$$

سالب ضرب موجب =سالب

عدو(-) صديقك(+) عدوك (+)

$$-X \times -4 = 4X$$

سالب ضرب سالب=موجب

عدو (-) عدوك (-) صديقك(+)

تختلف عملية الضرب عن عملية الجمع و الطرح حيث يمكن ضرب أي شيء بأي شيء.

$$1\times X=1X=X$$

$$1\times -4=-4$$

موجب ضرب سالب= سالب

صديق (+) عدوك(-) عدوك(-)

الآن نجمع النتائج :

$$-X^2+4X+1X-4$$

لا يمكن جمع المتغير المرفوع لقوة مثل X^2 **مع أي متغيرٍ مماثل ما لم يكن مرفوعاً لقوة و لذلك فإننا نبقيه كما هو .**

$$4X+1X=5X$$

لا يمكن جمع عدد مثل -4 مع متغير (حرف) أو عددٍ مرافقٍ لمتغير .

فيصبح لدينا :

$$-X^2+5X-4$$

إذاً فإن عملية التخصيم(التقويس) Factoring صحيحة.

الان نعود ثانيةً لنتائج عملية التخصيم (التقويس) :

$$(-X+1)\ (X-4)=0$$

$$(-X+1)\times(X-4)=0$$

بالرغم من أن العلاقة بين قوسين هي علاقة ضربٍ افتراضية إياك أن تضع شارة ضرب في الامتحان بين قوسين.

لا يمكن أن يكون ناتج عملية الضرب صفراً إلا إذا كانت قيمة محتويات أحد القوسين صفر لأن كل ما يُضرب بصفر يُعطي صفراً.

إننا نستخدم هذه الحقيقة لتحديد القيمتين الممكنتين للمتغير X :

الاحتمال الأول :

X=1

أي أن X– تساوي 1-

-X+1=0

لماذا ؟

لأن X– تساوي-1

و بالتالي فإن :

-1+1=0

-1 +1=0

قيمتين متماثلتين متعاكستي الشارة ناتج جمعهما الصفر.

الاحتمال الثاني :

$$(X-4)=0$$

أي أن :

$$X=4=+4$$

$$4-4=0$$

$$(X-4)=0$$

لأن X تساوي 4

إذاً فإن هنالك قيمتين ممكنتين للمتغير X و هما 1 و 4 و لذلك سيكون المنحني البياني مساوياً للصفر عندما تكون قيمة المتغير X واحد 1 أو 4 ، و لذلك يتوجب في المنحني ان يتقاطع مع المحور الأفقي X عند :


$$X=1$$

$$X=4$$

إن اللامتعادلة المطلوبة تصبح صحيحةً عندما يهبط المنحني إلى ما دون المحور الأفقي X axis :

$X < 1$

$X > 4$




عندما يكون العامل العددي Coefficient للمتغير المرفوع للقوة الثانية X^2 على شكل قنطرة فذلك يعني بأنه عاملٌ سلبي.

يمكننا حل اللامتعادلة من خلال تمثيلها على مستقيم أعداد ، علماً ان مستقيم الأعداد هو ذاته المحور الأفقي X axis حيث نتبين بأن :


$X < 1$

أو أن :

X>5



النسبة و التناسب Ratio and proportion



تستخدم النسبة لمقارن مقدارين أو اكثر حيث ترينا النسبة بكم أحد المقدارين أكبر من المقدار الآخر و تكتب النسبة على الشكل التالي a:b

تبسيط النسبة :

لتبسيط النسبة فإننا نقسم كلا طرفي النسبة على القاسم المشترك الأكبر highest common factor .

مثال :

يمكن تبسيط النسبة 10:5 عن طريق قسمة كلا طرفيها على قاسمٍ مشتركٍ أكبر و هو هنا العدد 5 :

$10 \div 5=2$

$5\div5=1$

لتصبح هذه النسبة 2:1 ، و و هذه أقصى درجة يمكن تبسيط هذه النسبة إليها.

يتوجب أن تكون نسب الكميات بوحدة قياسٍ واحدة حتى نتمكن من بيان نسبتها إلى بعضها البعض ، و إذا كانت وحدات القياس مختلفة فيتوجب توحيدها وفقاً لوحدة القياس المطلوب إعطاء

النتيجة على أساسها قبل حساب و بيان نسبتها إلى بعضها البعض.

لدينا طنين و نصف برتقال و 1500 كيلو غرام تفاح و فما هي النسبة بينهما؟

قبل حساب النسبة بينهما يتوجب علينا القيام بتحويل الكسور إلى أرقامٍ عشرية و توحيد وحدات القياس.

طنين و نصف أي $2\frac{1}{2}$ و هي تساوي الرقم العشري 2.5 .

الآن نقوم بتحويل وحدات القياس و توحيدها 2.5 طن نقوم بتحويلها إلى كيلو غرام :

$2.5 \times 1000 = 2500kg$

الآن أصبح لدي 1500 و 2500 كيلو غرام نقوم بقسمة هذين الرقمين على قاسمٍ مشتركٍ اكبر ، و أكبر رقم يقبل القسمة التامة على هذين الرقمين هو الرقم 500 :

$1500 \div 500 = 3$

$2500 \div 500 = 5$

إذاً فإن النسبة بين هذين المقدارين هي 3:5 .

مخطط النُسب Ratio Diagram

تشارك مالكي عدة شاحنات على نقل حمولة مقدارها 100 طن و نالوا على ذلك أجراً مقداره 1000$ دولار ، فإذا كانت الشاحنة الأولى قد نقلت 20 طن و الثانية نقلت 40 طن و الثالثة نقلت 15 طن و الرابعة نقلت 25 طن ، و إذا كانت الشركة التي تعهدت تنفيذ عملية النقل قد قسمت اجورهم وفق النسب التالية :

2,4,1.5,2.5

فكم سوف يتقاضى كلٌ منهم؟

كما ترون فإن لدينا الحصص التالية :

$$4+2+1.5+2.5=10$$

عشرة أجزاء .

الآن نقسم الأجر الكلي أي ألف دولار على إجمالي الأجزاء ، أي عشرة اجزاء.

1000$÷10=100$

كل جزءٍ يساوي 100$ دولار .

نرسم مخططاً يبين بان هذه المتناسبة تتألف من عشرة اجزاء و كل جزءٍ منها يساوي 100$ دولار ، حيث نكتب 100$ دولار في كل جزء من أجزاء المخطط العشرة:

100 $	100 $	100 $	100 $	100 $	100 $	100 $	100 $	100 $	100 $

الآن حتى نعرف كم سوف يتقاضى مالك كل شاحنة فإن كل ما علينا القيام به هو أن نضرب كل نسبة من النسب بحصة من الحصص العشرة أي المئة دولار :

4×100$=400$

1.5×100$=150$

2.5×100$=250$

2×100$=200$

و بذلك نكون قد حددنا نصيب مالك كل شاحنة .

نجمع الحصص مع بعضها

$$400+150+250+200=1000\$$$

الحل صحيح لأننا حصلنا على المبلغ الأصلي.

إذا كان هنالك عقارٌ طبي ما يتم تحضيره بمزج مركبين مع بعضهما البعض بنسبة 6:3

فكم نحتاج من هذين المركبين حتى نصنع 1400 ml ميلي من هذا العقار؟

لدينا تسعة اجزاء $6+3=9$

نمثلها بتسعة خانات :

1	2	3	4	5	6	7	8	9

نقسم المقدار المطلوب تحضيره أي 1400 ml على 9 أجزاء :

$1400 \div 9 = 155.5$ ml

أي أن كل جزءٍ يساوي 155.5 ml .

155.5 ml	155.5 ml	**155.5 ml**	155.5 ml	**155.5 ml**	155.5 ml	**155.5 ml**	155.5 ml	**155.5 ml**

الان نضرب نسبة كل مركبٍ من هذين المركبين بالمقدار 155.5 ml:

المركب الأول نسبته 6 :

$6 \times 155.5 = 933$ml

أي اننا سوف نحتاج إلى 933ml ميلي من المركب الأول.

المركب الثاني نسبته 3 :

$3\times155.5=466$ ml

المقدار الذي نحتاجه من المركب الثاني .

الآن نتأكد من صحة العمليات التي قمنا بها من خلال جمع النتيجتين :

$$933+466.5=1399.5\approx1400ml$$

توصلنا إلى الرقم الأصلي الذي بدأنا به ، إذاً فإن العمليات التي قمنا بها صحيحة.

لتجزئة مقدارٍ معين إلى نسبٍ معينة فإنه يتوجب علينا قسمة جزءٍ منه .

التناسب المباشر DIRECT PROPORTION

$\propto$

عندما يتزايد او يتناقص مقداران وفق عاملٍ factor واحد يقال عندها بأن نسبة هذين المقدارين إلى بعضهما البعض قد بقيت كما هي و أنهما متناسبين بشكلٍ مباشر directly proportional .

يعبر عن التناسب المباشر بالرمز $\propto$ و هو يعني عبارة (متناسبٌ مع) is proportional to ، فإذا كنت مثلاً أمزج مقداراً من الإسمنت و الرمل يكفي لبناء منزلٍ واحد فإن بناء منزلين اثنين بالحجم ذاته يتطلب مني أن أمزج كميةً مضاعفة من الإسمنت و الرمل و لكن بالنسبة ذاتها ،و إذا كنت أحضر وجبة طعامٍ تكفي لشخصين و أردت أن أحضر وجبة تكفي لأربعة أشخاص فيتوجب علي أن أضاعف المقادير و لكن بالنسب ذاتها ، **أي أن النسبة ثابتة و لكن الذي يتغير هو المقدار** ،فإذا كانت كمية الإسمنت A و كانت كمية الرمل B فإنني اقول بأن **هنالك تناسبٌ مباشر ما بين A و B .**

$$A \propto B$$

يقال عن مقدارين بانهما متناسبتين تناسباً مباشراً Directly proportional إذا بقيت نسبتهما إلى بعضهما البعض ثابتة بالرغم من تغير هذين المقدارين.

مسألة في التناسب المباشر:

إذا كنت استطيع نسخ 12 صفحة على الكمبيوتر خلال 4 ساعات فكم صفحة أستطيع ان أنسخ في 14 ساعة ؟

هنالك تناسبٌ مباشر ما بين عدد الصفحات التي أستطيع كتابتها و الزمن الذي أستغرقه في عملية النسخ .

أبدأ حل المسألة بالقسمة لأعرف كم من الوقت يستغرق مني كتابة صفحة واحدة :

كما تعلمنا من قبل فإننا في المسائل الرياضية و الفيزيائية نقوم دائماً بتوحيد وحدات القياس وفق وحدة القياس المطلوبة أو وحدة القياس التي تتعامل معها المعادلة .

و لذلك فإنني أقوم بتحويل الساعات إلى دقائق حتى أحصل على النتيجة بشكلٍ أكثر سهولة :

$$4 \times 60 = 240$$

4 ساعات تحوي 240 دقيقة .

الان أقسم 240 دقيقة على عدد الصفحات التي أستطيع نسخها :

$$240 \div 12 = 20$$

اي أن كتابة صفحة واحدة تتطلب مني ثلث ساعة أي 20 دقيقة .

الآن حتى أعرف كم صفحة استطيع أن أنسخ في 14 ساعة فإنني اقوم بتحويل 14 ساعة إلى دقائق عن طريق الضرب بستين 60 :

$$14 \times 60 = 840$$

الآن اقسم 840 دقيقة على 20 :

$$840 \div 20 = 42$$

أي أنني استطيع ان أنسخ 42 صفحة في 14 ساعة .

التناسب العكسي Inverse proportional

عندما تؤدي الزيادة في احد المقدارين إلى إلى تناقص المقدار الآخر فذلك يعني بان هذين المقدارين متناسبين عكسياً Inversely proportional .

عندما يكون مقدارين A ,B متناسبين عكسياً مع بعضهما البعض فإن ناتج ضربهما يكون دائماً واحداً لأن الزيادة في أحدهما يقابلها نقصٌ في الآخر، كما ان أي نقصٍ في أحدهما تقابله زيادة في الآخر.

AB=K

A×B=K

حيث K هو ثابت Constant

فإذا كنا نستطيع إنجاز مقدارٍ ما من العمل باستخدام آليةٍ واحدة بزمنٍ معين فإن بإمكاننا أن ننجز المقدار ذاته من العمل بزمنٍ أقل إذا استخدمنا عدداً اكبر من الآليات.

(المقدارين المتعاكسين هما عدد الآليات و الزمن ، كلما ازداد عدد الاليات نقص الزمن اللازم لإنجاز العمل و العكس صحيح).

يقال عن مقدارين بأنهما متناسبين عكسياً إذا كانت أي زيادة في أحدهما يقابلها نقصٌ في الآخر.

عندما يكون مقدارين A,B متناسبين عكسياً inversely proportional مع بعضهما البعض فإن ناتج ضربهما ببعض A×B يبقى دائماً واحداً لأنه كلما ازداد احدهما نقص الآخر بالمقدار ذاته.

الأسلوب التوحيدي Unitary method

تتمثل إحدى طرق مقارنة الأسعار في إيجاد قيمةٍ واحدة ، و من ثم القيام بضرب هذه القيمة بعدد الوحدات التي تريد شرائها و هذه الطريقة تدعى بالطريقة التوحيدية unitary method ، و تعني الطريقة التوحيدية حساب قيمة الوحدة الواحدة حتى نستطيع أن نتخذ القرار المناسب و ذلك عندما تكون أحجام العبوات مختلفة و أسعارها مختلفة إذا كانت المادة الأساسية واحدة في جميع العبوات.

مسالة

منتج عسلٍ يُباع بثلاثة عبوات :

عبوة 100 غرام بثلاثة جنيهات 3.

عبوة 250 غرام بخمسة جنيهات 5.

عبوة 500 غرام بثمانية جنيهات 8.

فأي عبوةٍ منها هي الأكثر اقتصادية؟

بدايةً نقوم بتحويل السعر من وحدة الجنيه إلى وحدة المليم عن طريق الضرب بمئة :

$$3\times100=300$$

300 مليم

$$5\times100=500$$

500 مليم

$$8\times100=800$$

800مليم

الآن نقسم الثمن (بالمليم) على الوزن (بالغرام):

$$300\div100=3$$

سعر الغرام 3 مليم .

$$500\div250=2$$

سعر الغرام في العبوة الثانية 2 مليم .

$$800\div500=1.6$$

سعر الغرام في العبوة الثالثة 1.6 مليم.

إذاً فإن العبوة التي يبلغ وزنها 800 غرام هي العبوة الأكثر اقتصادية حيث يبلغ سعر الغرام فيها 1.6 مليم.

طريقة التحجيم Scaling Method

تشبه طريقة التحجيم الطريقة التوحيدية و لكنها أسرع .

مسألة توضيحية :

إذا كان سعر كيلو الذهب يبلغ 50000$ دولار فكم يبلغ سعر خاتمٍ يبلغ وزنه 5 غرام؟

كما هي الحال في المسائل الفيزيائية فلا بد من القيام بتوحيد وحدات القياس، أي تحويل الكيلو (كيلو الذهب) إلى غرام حتى يتناسب مع وحة وزن الخاتم التي أعطيت بالغرام:

$$1\times1000=1000g$$

نقسم وزن الخاتم أي 5 غرام على المقدار الكلي للذهب المسعر (الذي نعرف سعره) أي واحد كيلو غرام أي ألف غرام 1000 g غرام.

$$5\div1000=0.005$$

الآن النسبة التي حصلت عليها أي 0.005 (خمسة بالألف) تدعى بعامل الحجم scale factor .

الآن نقسم السعر الكلي أي 50000$ دولار على نسبة القياس :

$$50000\$\times0.005=250\$$$

أي ان سعر هذا الخاتم يبلغ 250$ دولار .

نقوم بتوحيد وحدات القياس في المسألة إذ لا يجوز استخدام وحدتي قياسٍ مختلفتين في مسألةٍ واحدة.

كيلو غرام ← غرام

نقسم الكمية التي نريد معرفة سعرها على الكمية المسعرة فنحصل على عامل القياس scale factor .

$$5 \div 1000 = 0.005$$

نضرب عامل القياس بسعر الكمية المسعرة فنحصل على سعر الجزء.

$$50000\$ \times 0.005 = 250\$$$

إن طريقة النسبة و التناسب هي طريقةٌ هي طريقةٌ لإظهار النسبة بين مقدارين تماماً مثل حال الكسور و الأرقام العشرية، حيث تبين النسبة العلاقة بين جزئين أو بين جزءٍ و كل.

مسألة في النسبة و التناسب

تحتوي مدينة على أحياء منظمة و أحياء عشوائية بنسبة 6:4 اي 6 أحياء منظمة و 4 أحياء عشوائية .

اكتب نسبة الأحياء المنظمة إلى نسبة الأحياء العشوائية أي 6:4 على شكل رقمٍ عشري.

أقوم بجمع النسبتين مع بعضهما البعض :

$$4+6=10$$

أقسم نسبة الأحياء العشوائية أي 4 على عدد أحياء المدينة اي 10 :

$$4 \div 10 = 0.4$$

إذاً فإن **نسبة الأحياء العشوائية إلى أحياء المدينة هي 4 بالعشرة 0.4 .**

إن نسبة المنازل ذات الحدائق بالنسبة للمنازل التي بلا حدائق تبلغ 3:1 أي 3 بلا حديقة و 1 واحد بحديقة ، فإذا كان هنالك في حيٍ ما 3700 منزل ، فكم عدد المنازل التي لها حدائق؟

نجمع النسبتين مع بعضهما البعض :

$$3+1=4$$

نقسم نسبة المنازل ذات الحدائق أي واحد 1 على النسبة الكلية أي 4 :

$$1 \div 4 = 0.25$$

نضرب العدد الكلي للمنازل اي 3700 بهذه النسبة فنحصل على عدد المنازل ذات الحدائق.

$$3700 \times 0.25 = 925$$

925 هو عدد المنازل ذات الحدائق .

فإذا علمنا بأن ما نسبته $\frac{2}{3}$ من المنازل ذات الحدائق يمتلكها أثرياء ، فكم هو عدد المنازل التي يمتلكها أثرياء؟

لمعرفة ذلك نضرب عدد المنازل ذات الحدائق بنسبة الأثرياء الذين يمتلكون حدائق أي $\frac{2}{3}$

$$925 \times \frac{2}{3} = 616$$

$$\frac{925}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{925 \times 2}{1 \times 3} = \frac{1850}{3} = 616$$

حتى نضرب رقماً ما بكسر فإننا نحول ذلك الرقم إلى كسر و ذلك بأن نجعل من ذلك الرقم بسطاً لمقامٍ مقداره 1 و بعد ذلك فإننا نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام.

إذاً فإن **عدد المنازل التي يمتلكها اثرياء تبلغ 616 منزلاً من بين 925 منزل ذو حديقة.**

كيف أضرب رقماً عادياً بكسر؟

إما أن أقسم بسط الكسر على مقامه و أضرب ذلك العدد بالناتج :

$$\frac{2}{3} = 2 \div 3 = 0.6666666667$$

$$0.6666666667 \times 925 = 616$$

الطريقة الثانية تتمثل في تحويل ذلك الرقم إلى كسر و ذلك بأن أجعل من ذلك الرقم بسطاً لمقامٍ مقداره واحد ثم أضرب به الكسر الثاني:

$$\frac{925}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{925 \times 2}{1 \times 3} = \frac{1850}{3} = 616$$

مقارنة النسب

لمقارنة النسبة 16/18 $\frac{16}{18}$ مع النسبة 23/ 20 $\frac{20}{23}$ نقوم باختزال الكسر $\frac{16}{18}$ و ذلك عن طريق القيام بقسمة كلا حديه على 2 :

$$16 \div 2 = 8$$

$18÷2=9$

نقوم بتحويل الكسر إلى رقمٍ عشري عن طريق قسمة البسط على المقام :

$8÷9=0.888888889$

لتحويل الرقم العشري الذي توصلنا إليه إلى نسبةٍ مئوية فإننا نضرب ذلك الرقم العشري بمئة :

$0.888×100=88.8\%$

النسبة الثانية 20/23 عندما نقوم بتحويل هذه النسبة إلى كسر فإنها تصبح $\frac{20}{23}$ **.**

نقوم بتحويل هذا الكسر إلى رقمٍ عشري عن طريق قسمة البسط 20 على المقام 23

$20÷23=0.87$

لتحويل رقمٍ عشري إلى نسبةٍ مئوية فإننا نضرب بمئة :

$0.87×100=87\%$

تحويل النسب المختلفة الصيغ

قبل القيام بمقارنة النسب لا بد أولاً من تحويل تلك النسب إلى الشكل ذاته .

لتحويل نسبة إلى كسر نجعل الأصل أو المقياس مقاماً للكسر .

لتحويل الكسر إلى رقمٍ عشري نقسم البسط على المقام .

لتحويل الرقم العشري الناتج إلى نسبةٍ مئوية فإننا نضرب بمئة.

المعادلات النسبية Proportion equations

يمكن تحويل البيانات التي تبين النسبة بين المتغيرين X و Y إلى معادلات يمكن تمثيلها بشكلٍ بياني مما يمكننا من اكتشاف قيمتها .

Y متناسبٌ تناسباً مباشراً مع X :

$$Y \propto X$$


Y Is directly proportional∝ to X

لتحويل علاقة التناسب السابقة إلى معادلة فإننا نقوم بتحويل علامة التناسب المباشر ∝ إلى ثابت K :

$\propto \rightarrow K$

K=Constant

و بذلك فإن المعادلات التي تتخذ الصيغة Y=KX تشكل خطاً مستقيماً يمر عبر نقطة تقاطع المحور الأفقي مع المحور العمودي و نقطة تقاطع هذين المحورين تدعى بالأصل Origin أو نقطة الصفر 0 و يكون ميلانه ثابت k .



إذا بقيت النسبة بين مقدارين ثابتة بالرغم من تغير هذين المقدارين يقال عندها بأن هذين المقدارين متناسبين مباشرةً مع بعضهما البعض
directly proportional و لذلك فإن معادلتهما :

$$Y=kx$$

إذا بقي ناتج ضرب مقدارين ثابتاً بالرغم من تغير قيمتيهما، يقال عندها بأن هذين المقدارين متناسبين عكسياً inversely proportional و
معادلتهما :

$$Y=\frac{K}{X}$$

لماذا يبقى ناتج ضربهما ببعضهما البعض ثابتاً بالرغم من تغير قيمتيهما؟

لأنه كلما ازداد أحدهما نقص الآخر بالنسبة ذاتها ، و كلما نقص أحدهما ازداد الآخر بالنسبة ذاتها.

التناسب العكسي Inverse proportion


نعتبر بأن Y يتناسب تناسباً عكسياً Inversely proportional مع X بالصيغة :

$$Y \propto 1/X$$

التي تمثل علاقة التناسب المباشر direct proportion ، و هنا فإننا نستبدل رمز التناسب المباشر ∝ بالثابت k و لذلك فإن علاقة التناسب :

$$y \propto \frac{1}{x}$$

تصبح $y = \frac{1}{x}$



كلما ازدادت قيمة X تنقص قيمة Y .


كلما ازدادت قيمة Y تنقص قيمة X .

$$Y \propto \frac{1}{Y} \rightarrow Y = \frac{K}{X}$$

$$Y \propto \frac{1}{X} \rightarrow Y = \frac{K}{X}$$

يبين الشكل السفلي العلاقة ما بين المحور الأفقي X الذي يمثل عملة اليورو و بين المحور العمودي Y الذي يمثل الدولار :

كم يبلغ سعر 125 يورو بعملة الدولار ؟



نختار أي نقطةٍ تتقاطع فيها نقطةٌ أفقية X (يورو) مع نقطةٍ عمودية Y (دولار) ، و لتكن نقطة التقاطع هذه مثلاً (8,7)

X=Y

Y=8

نقوم باستبدال القيم X,Y في المعادلة و ذلك لإيجاد قيمة K :

Y=KX

X=7 , Y=8

لتصبح المعادلة Y=KX

Y=K×X

نستبدل الرموز بالقيم الرقمية المتوفرة :

8=K×7

8=K×7

لحل هذه المعادلة نعكس عملية الضرب لتصبح عملية قسمة :

$$8 \div 7 = 1.14$$

نضرب النسبة 1.14 بمقدار 125$ دولار :

$$1.14 \times 125 = 142.5$$

125 يورو تعادل 142.5 دولار.

إذا كانت النسبة بين مقدارين تبقى ثابتة بالرغم من تغير هذين المقدارين فيقال عندها بأن هذين المقدارين متناسبين مباشرةً directly proportional و

المعادلة الدالة على ذلك هي Y=KX

إذا كان حاصل ضرب مقدارين ثابتاً بالرغم من تغير هذين المقدارين فيقال عندها بأن هذين المقدارين متناسبين عكسياً Inversely proportional .

و معادلة التناسب العكسي هي معادلة قسمة :

$$Y = \frac{K}{x}$$

يمثل الخط المستقيم المائل الذي ينطلق من أصل الإحداثية ، أي من نقطة الصفر أي نقطة تقاطع المحورين يمثل النسبة Y:X

نختار أي نقطةٍ يتقاطع فيها المحور الأفقي X مع المحور العمودي Y .

نستبدل متغيري المعادلة Y و X بالنقطتين الإحداثيتين لنقطة التقاطع.

النقطة اليسرى هي النقطة الأفقية X بينما النقطة اليمنى هي النقطة العمودية Y .



النسبة و التناسب Ratio and Proportion

لحل المشكلات التي تتضمن نسبةً و تناسب فإن ذلك يستدعي منا إجراء عملية رفع مستوى scale up أو خفض مستوى (تقليل المقدار) scale down و ذلك عن طريق إجراء عمليتي الضرب و القسمة .

مثال :

إن نسبة أشجار النخيل المذكرة إلى أشجار النخيل المؤنثة في إحدى المزارع تبلغ 3:9 .

تمت زراعة 35 شجرة نخيل جديدة فانقلبت جراء ذلك النسبة لتصبح 2:10 فكم يبلغ عدد أشجار النخيل المؤنثة في تلك المزرعة؟

حل المسألة :

تتضمن هذه المسألة تغيراً في النسبة changing ratio .

لفهم المسألة نرسم مخططاً يمثل النسبة الأولى (قبل التغيير) و مخططاً ثانياً يمثل النسبة الثانية (بعد التغيير):

النسبة الأولى :

مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مذكر	مذكر	مذكر

يمثل المخطط السابق النسبة الأولى حيث هنالك 3 أشجار نخيل مذكرة لكل 6 أشجار نخيل مؤنثة.

انتبه جيداً إلى أنهم يتحدثون هنا عن نسبة و ليس عن عدد فقد تعني هذه النسبة 3 ملايين شجرة مذكرة لكل 6 ملايين شجرة مؤنثة.

مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مؤنث	مذكر	35

35 هي الأشجار الجديدة التي يبلغ عددها 35 شجرة .

يمثل المخطط الجديد شجرتين مذكرتين مقابل 8 اشجار مؤنثة .

2:10

قمت بتمثيل النسبة الأولى بتسع خانات لأن النسبة هي 3:9 ، بينما قمت بتمثيل النسبة الثانية بعشر خانات لأن النسبة 2:10 .

يمكننا القول بان أشجار النخيل الخمس و الثلاثين الجديدة التي غيرت النسبة قد شكلت خانةً جديدة في الشكل الذي يمثل النسبة.

انتبه جيداً :

بما أن الخمسة و ثلاثين 35 شجرة الجديدة التي غيرت النسبة قد دعتنا لإضافة خانةٍ جديدة فهذا يعني بأن كل خانة من الخانات العشرة تتألف من 32 شجرة .

أي أن الوحدة الواحدة في النسبة الخاصة بتلك المزرعة و التي تحقق تلك النسبة هي 35 شجرة

أي أن كل خانة تحتوي على 35 شجرة نخيل.

35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

كانت النسبة 3:10 و أصبحت 2:10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	1

أي أن الخمسة و الثلاثين شجرة الجديدة قد زادت خانةً في المخطط ، أي أن هذه الخانة تضم 35 شجرة و أن كل خانةٍ أخرى تضم كذلك 35 شجرة ، و لذلك لمعرفة عدد الأشجار المؤنثة فإننا نضرب نسبة الأشجار المؤنثة أي عشرة 10 بعدد اشجار النخيل الجديدة :

10 ×35 =350

عدد الأشجار المؤنثة 350 شجرة .

ملاحظة :

عند تمثيل النسبة 3:6 مثلاً فإننا فنرسم 9 مربعات 6 منها للنسبة 6 و 3 منها للنسبة 3.

و لا نرسم 6 مربعات و نقتطع منها ثلاثة للتعبير عن النسبة الثانية.

3 مقابل 6 و ليست 3 من ستة أي أنها نسبة و ليست كسر .

مسألة ثانية في النسبة و التناسب

يستغرق السفر بين مدينتين ساعتين بسرعة 60 km/h في الساعة.

كم تستغرق هذه الرحلة من الزمن بسرعة 80 km/h كيلو متر في الساعة؟

الحل :

في هذه المسألة العلاقة ما بين زمن الرحلة و السرعة علاقةٌ تناسبٍ عكسي (كلما ازداد الزمن نقصت السرعة و العكس صحيح إذ كلما نقص الزمن ازدادت السرعة) و لذلك فإننا نستخدم في حلها معادلة التناسب العكسي :

$$Y=K/X$$

زمن الرحلة = K / السرعة

$$\text{زمن الرحلة} = \frac{K}{\text{السرعة}}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$2=\frac{K}{60}$$

كما ترون فإن لدينا علاقة قسمة و لحلها نقوم بتحويلها إلى عملية ضرب بحيث يكون المجهول K هو ناتج ضرب المعلومين الآخرين :

$$K=2\times60=120$$

$$K=120$$

لحساب زمن الرحلة نقسم الناتج 120 على السرعة الجديدة أي 80 :

$$120\div80=1.5$$

أي أن الرحلة سوف تستغرق ساعةً و نصف بسرعة 80 kmh كيلو متر في الساعة.

في معادلات التناسب العكسي يُمثل الحرف k ثابت التناسب Constant of Proportionality أو ثابت التغير و هو قيمةٌ ثابتة لا تتغير و تساوي دائماً ناتج ضرب المتغيرين xy= xk ببعضهما البعض.

مهما تغيرت قيم المتغيرين X و Y فإن ناتج ضربهما ببعضهما البعض يظل ثابتاً لا يتغير .

إذا ازداد أحد المُتغيرين ينقص الأخر بنسبةٍ تحافظ على ثبات المُتغير K .

في مسألتنا السابقة فإن المُتغيرين الاثنين الذين بينهما علاقة تناسبٍ عكسي هما السرعة و الزمن ذلك أنه كلما ازدادت السرعة نقص الزمن (اللازم للوصول إلى وجهة معينة) و العكس صحيح إذ أنه كلما انخفضت السرعة ازداد الزمن اللازم للوصول إلى وجهةٍ معينة بينما يبقى ثابت التغير K ثابتاً على حاله.

أسهم التوجه – الموجهات- المتجهات VECTORS

تصنف معظم المقاييس إما بأنها مقاييس كمية Scalar quantities او مقادير توجيهية vector quantities ، المقاييس الكمية لها حجمٌ و مقدار بينما المقاييس الجهوية لها حجمٌ و اتجاه ، فالإزاحة displacement مثلاً هي مقدارٌ موجه لأن لها جهة و حجم magnitude .

المتجهات vectors عبارة عن أسهم موجهة تشير إلى المسافة و الاتجاه بين نقطتين و يتم التعبير عنها بسهمٍ فوق اسمي هذين النقطتين :

$$\overrightarrow{AB}$$

كما يمكن التعبير عن المتجهات على شكل متجه عمودي Column vector :

$$\binom{3}{2}$$

إن الأرقام السلبية تعني التحرك من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى ← على امتداد المحور الأفقي X axis .

طرح المتجهات Subtracting vectors

لطرحِ متجهٍ من متجهٍ آخر يتوجب علينا التحرك رجوعاً على امتداد المتجه الثاني (باتجاهٍ معاكس) **A-B** تعني التحرك على امتداد A ثم العودة على امتداد B و كأننا نقول :

$$A+(-B)$$

لإجراء عملية طرح باستخدام العمود التوجيهي Column vector فإننا نطرح اولاً الصف العلوي ، ثم نطرح بعد ذلك الصف السفلي .

بخلاف عملية جمع المتجهات لا يمكننا في عملية طرح المتجهات أن نعكس ترتيب عملية الطرح :

$A-B \neq B-A$

$A+B=B+A$

عملية طرح المتجهات :

$$\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\13\end{pmatrix}$$

$5-3=3$

$7-(-6)=7+6=13$

النتيجة:

$7-(-6)=7+6=13$

إذا تلاقت شارتي سالب بشكل مباشر دون حائل فإنهما تتحولان إلى شارة موجب(شارة جمع) و تتحول عملية الطرح إلى عملية جمع.

$$5-(-5)= 5+5=10$$

$$3-(-7)=3+7=10$$

قراءة المُتجهات

$$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

بما أن العدد السلبي -3 قد ورد أولاً (في أعلى العمود التوجيهي) فإنه يشير إلى النقطة الأفقية X ، و بما أنه عددٌ سلبيٌ أفقي فإنه يعني بأنه يتوجب عند رسم المتجه و تحديد موقعه أن نتحرك بمقدار ثلاثة خانات نحو الجهة اليسرى ، أما العدد السلبي السفلي -2 فإنه يشير إلى التحرك بمقدار 3 ثلاثة خانات نحو الأسفل ↓ لأنه عددٌ سلبي عمودي (حركة سلبية عمودية أي حركة نحو الأسفل .

نحن نذكر دائماً النقطة الأفقية أولاً فنضعها في الأعلى أو في الجهة اليُسرى.

$$\overrightarrow{GH} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

العدد العلوي السلبي -5 يشير إلى النقطة الأفقية الموجودة على المحور الأفقي ، أي أنه يشير إلى حركة سلبية أفقية بمقدار خمس 5 خانات ، و كون هذا العدد عددٌ سلبي أفقي فذلك يعني بان التحرك سيكون من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى(حركة أفقية سلبية) .


العدد السفلي 6 يشير إلى الإحداثية العمودية Y ، و بما أنه عددٌ موجب عمودي فإنه يشير إلى التحرك نحو الأعلى بمقدر 6 ستة خانات ↑.

المتجهات المتساوية و المتجهات المتعاكسة

يوصف متجهين Vectors بأنهما متساويين إذا كانا يشيران إلى التحرك بالمقدار ذاته (عدد الخانات ذاتها) حتى و إن كانت في مواقع مختلفة على الشبكة الإحداثية .

يوصف متجهين بأنهما متساويين إذا كانت أرقامهما (عدد الخانات التي يشيران إليها) متماثلة.

تعني الأرقام السلبية التحرك من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى ← على المحور الأفقي X axis أو التحرك من الأعلى إلى الأسفل ↓ على المحور العمودي Y axis .




$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{GH} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$



$$\overrightarrow{AB} = \binom{2}{3}$$

$$\overrightarrow{CD} = \binom{2}{-3}$$

$$\overrightarrow{EF} = \binom{-2}{-3}$$

$$\overrightarrow{GH} = \binom{-2}{3}$$

المقادير الموجهة vector quantities لها حجمُ و مقدار و اتجاه أما المقادير الكمية scalar quantities فلها حجمٌ فقط.


يتم تمثيل المتجهات على شكل أسهمٍ موجهة .

يمكن تمثيل المتجهات بأشكال مختلفة :

$$\binom{3}{2}$$

$$\begin{matrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{matrix}$$

$$\overrightarrow{AB}$$



حتى نتمكن من فهم المتوجهات و التعامل معها فإن علينا أن نتصور المتوجهات على شكل أسهمٍ على شبكة إحداثية ، و قد يكون اتجاه ذلك المتوجه(السهم) إيجابياً أي موافقاً لاتجاه الأعداد الإيجابية اي متجهاً نحو الأعلى أو نحو الجهة اليمنى، و قد يكون اتجاهه سلبياً (متوافقاً مع الأعداد السلبية) ، أي متجهاً نحو الأسفل أو نحو الجهة اليسرى.

إن العاملين الأكثر أهميةً في المتوجهات هما الحجم (المقدار) و الاتجاه .

لا يعتبر الموقع الإحداثي للمتوجه أمراً ذو أهمية حيث يُمكن لمتوجهٍ أن يكون مساوياً لمتوجه آخر في الشبكة الإحداثية إذا كان عدد الخانات التي يشغلانها متماثلاً بغض النظر عن موقعيهما.

يُمكن للأعداد في أعمدة التوجه column vectors أن تكون إيجابيةً أو سلبية اعتماداً على اتجاه المتوجه أي الجهة التي يشير إليها المتوجه(السهم) .

Direction of vectors اتجاه المتوجهات

يمكن للأعداد في عمود التوجه أن تكون إيجابيةً او سلبية.

عمود التوجه يكون بهذا الشكل :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

كيفية التعبير عن حركة المتوجه بالأرقام ؟

تشير الأعداد العمودية الموجبة إلى حركةٍ نحو الأعلى ، بينما تشير الأعداد العمودية السلبية إلى حركةٍ نحو الأسفل على امتداد المحور العمودي y .


تشير الأعداد الأفقية الموجبة إلى حركةٍ نحو الجهة اليمنى ، بينما تشير الأعداد السلبية الأفقية إلى تحركٍ نحو الجهة اليسرى .

تذكر دائماَ بأننا نذكر النقطة أو الموقع الأفقي أولاً ثم نذكر النقطة العمودية ثانياً.

و في أعمدة التوجه فإننا نعبر عن المتوجه رقمياً بعددين علوي و سفلي حيث يشير العدد العلوي إلى النقطة الإحداثية على المحور الأفقي X ، و على سبيل المثال فإن عمود التوجه

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$


يشير إلى حركة بمقدار 4 أربع خانات نحو الجهة اليمنى(لأنه عددٌ افقي موجب) على المحور الأفقي X ، بينما يشير العدد 6 إلى حركة بمقدار 6 خانات نحو الجهة العليا (لأنه عددٌ عمودي موجب).



أما عمود التوجه :

$$\begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}$$

فإنه يشير إلى حركة بمقدار 5 خانات نحو الجهة اليسرى على المحور الأفقي X (لأنها عددٌ سلبي أفقي) ، و حركة بمقدار 8 خانات نحو الأسفل على المحور العمودي Y (لأنها عددٌ سلبيٌ عمودي).



نضع أعداد التوجه بين قوسين.

نذكر النقطة الإحداثية الأفقية أولاً في الأعلى ، ثم نذكر النقطة الإحداثية العمودية التي تشير إلى الحركة أو الموضع على المحور العمودي ثانياً في الأسفل.

نذكر النقطة الإحداثية الأفقية X أولاً ثم نذكر النقطة الإحداثية العمودية Y ثانياً.

تشير الأعداد الموجبة الخاصة بالنقطة الإحداثية الأفقية X التي تذكر دائماً أولاً (في الأعلى أو في الجهة اليُسرى) إلى حركةٍ نحو الجهة اليُمنى →.

تشير الأعداد الموجبة الخاصة بالنقطة الإحداثية العمودية Y التي نذكرها ثانياً (في الأسفل أو في الجهة اليُمنى) إلى حركة باتجاه الأعلى ↑.

تشير النقاط الإحداثية السلبية الأفقية X التي نذكرها اولاً بالطبع إلى حركة نحو الجهة اليسرى ← على المحور الأفقي.

تشير النقاط الإحداثية السلبية العمودية Y التي نذكرها ثانياً إلى حركةٍ نحو الأسفل ↓ على المحور العمودي.

يشكل المتجه (السهم) وتراً لمثلثٍ وهمي قائم الزاوية .

وتر المثلث القائم الزاوية هو :

الضلع المقابل للزاوية القائمة 90°.


أطول ضلعٍ في المثلث القائم الزاوية (لأنه يقابل أكبر زاوية في المثلث القائم و هي الزاوية القائمة 90° درجة).

الضلع الوحيد المائل في المثلث القائم الزاوية.

و بالتالي فإن بإمكاننا ان نستخدم نظرية فيثاغورث Pythagorean theorem لحساب أبعاد هذا المثلث الوهمي و التي تقول : **مربع طول الوتر في مثلثٍ قائم الزاوية يساوي مجموع مرعي ضلعيه الآخرين .**

نستخدم أطروحة فيثاغورث لحساب طول المتجه (السهم) vector .

يقال عن متجهين vectors بأنهما متساويين إذا كانت وحداتهما الأفقية و العمودية متساوية حتى و إن كانت موقعيها على الشبكة الإحداثية مختلفين .



a = b

a = −c

تسمية المتجه *vector*

تتم تسمية المتجه بحرفين اثنين حيث يشير الحرف الأول (سواءٍ أكان في الأيسر أو الأعلى) إلى النقطة الأفقية ، بينما يشير الحرف الثاني (سواء أكان في الجهة اليمنى أو في الأسفل) إلى النقطة العمودية ، و يوضع هذين الحرفين تحت سهمٍ صغير :

$$\overrightarrow{AB}$$

أما عنوان المتجه فهو عبارة عن رقمين إحداثيين .

$$\overrightarrow{AB}=\binom{4}{5}$$

على الأغلب لا تكون هنالك علاقة ما بين عنوان المتجه و الموقع الحرفي الإحداثي و لكن المهم في المسألة هو عدد الخانات أي المربعات على الشبكة الإحداثية ، و على سبيل المثال :

$$\overrightarrow{AB}=\binom{4}{5}$$


تشير الإحداثية العلوية 4 إلى أن المتجه يتجه نحو الجهة اليمنى (عدد إيجابي أفقي بمقدار 4 أربع خانات ، بينما يشير العدد السفلي (العمودي) الموجب 5 إلى أن المتجه يتجه نحو الأعلى (عدد موجب) بمقدار 5 خانات.

$$\overrightarrow{CD}=\binom{3}{-4}$$

يشير العدد العلوي 3 إلى أن المتجه يتجه بشكلٍ أفقي(النقطة الأولى دائماً افقية) نحو الجهة اليمنى (لأن 3 عددٌ موجب) أي حركة نحو الجهة اليمنى ، بينما يشير العدد السفلي السلبي 4 -

إلى الاتجاه نحو الأسفل (كونه عددٌ سلبي) بمقدار 4 خانات.

نقوم بالقياس الأفقي)(نعد الخانات) من أول نقطة في المتجه إلى آخر نقطة بشكلٍ أفقي .



القياس العمودي (اي عد الخانات) يكون من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة.

نقوم بالقياس من الخارج أي نقوم بعد الخانات (المربعات) من الجهة الخارجية.

تذكر دائماً بان كل إحداثيتين تخصان متجهاً (سهماً واحداً) كما في المثال السابق (14,6) فالرقم الأيسر 14 يشير إلى أن المتجه يبلغ طوله الأفقي 14 خانة (مربع) و بما أن الرقم 14 هو رقمٌ إيجابي فذلك يعني بأن المتجه يتجه إلى الجهة اليمنى .

أما الرقم الأيمن 6 فهو يشير إلى أن ارتفاع المتجه العمودي يبلغ 6 خانات (مربعات) و بما ان العدد 6 عدد موجب فذلك يعني بأن المتجه (السهم) صاعدٌ نحو الأعلى بمقدار 6 خانات.

حتى لا يختلط عليك الأمر قم بالقياس من الخارج .

تأكد من صحة القياس و صحة عملية رسم المتجه عن طريق مد نهايتي المتجه بخطين وهميين (متقطعين) مستقيمين إلى ان يلتقي الخطان بزاويةٍ قائمة .

دائماً اعتمد على القياس من خارج المثلث الوهمي حتى لا تختلط عليك الأمور.

ضرب المتجهات *Multiplying vectors*

يمكن لنا أن نضرب المتجهات (الأسهم) بأعداد لزيادة أطوالها أو لتقصيرها .

إذا ضربنا المتجه بعددٍ موجب + فإن اتجاه المتجه يبقى على حاله ، أما إذا ضربنا المتجه بعددٍ سلبي فإن اتجاهه ينعكس.

هنالك طريقتين يمكن استخدامهما لضرب المتجهات إما عن طريق القيام برسمهما أو عن طريق كتابتهما على شكل أعمدة توجه column vectors مثلاً :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

لضرب المتجهات عن طريق الرسم نقوم برسم متجهٍ جديد موازي للمتجه الأصلي و لكنه أطول أو أقصر منه و ذلك تبعاً لعامل الضرب (العدد) الذي ضربنا به ذلك المتجه ، و على سبيل المثال فإن الضرب بالعدد 2 يُضاعف طول المتجه (سهم التوجه) .

ندعوا المتجه الجديد بتسمية المضاعف العددي scalar multiple .

المتجهات التي تكون مضاعفاتٍ عددية تكون متوازيةً مع بعضها البعض :

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \times 2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$4\times2=8$

$3\times2=6$

عندما نضرب بعددٍ موجب يبقى اتجاه المتوجه على حاله دون تغيير .

و لكن عندما نضرب المتجه بعددٍ سلبي فإن اتجاهه ينعكس:

$$\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}\times -2=\begin{pmatrix}-8\\-6\end{pmatrix}$$

موجب × سالب = سالب

صديق (+) عدوك (-) = عدوك (-)

عندما نضرب المتجه بعددٍ موجب فإنه يتمدد (يتضاعف حجمه) غير أن اتجاهه يبقى على حاله دون تغيير .

أما إذا ضربنا المتجه بعددٍ سلبي فإن المتجه يتمدد كذلك غير أن اتجاهه ينعكس.

إذا التقت المتجهات و أشارت إلى اتجاهٍ واحد أو اتجاهاتٍ متعاكسة فيجب ان تكون تلك المتجهات مضاعفاتٌ عددية scalar multiples لبعضها البعض .

مسألة في المُتجهات :

متجه $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ إحداثياته $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

متجه $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -8 \\ -10 \end{pmatrix}$ إحداثياته $\begin{pmatrix} -8 \\ -10 \end{pmatrix}$

أثبت بأن النقاط A,B,C السابقة الذكر تقع على خطٍ مستقيم.

الحل:

نبحث عن مضاعف multiple .

نقوم بتوحيد بيانات المتجهين الرقمية عن طريق تحويل أحدهما إلى الآخر و ذلك عن طريق ضرب أحدهما بمضاعفٍ مناسب ، و هذا المضاعف المناسب هنا هو العدد السلبي (-2) :


$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \times -2 = \begin{pmatrix} -8 \\ -10 \end{pmatrix}$$


موجب × سالب = سالب

صديق (+) عدوك (-) = عدوك (-)

تمكنا عن طريق استخدام المضاعف السلبي -2 من تحويل المتجه الأول ليصبح مماثلاً للمتجه الثاني و ذلك عن طريق قيامنا بضرب إحداثيات المتجه الأول بالعدد السالب -2 .

إن كلا هذين المتجهين هما مضاعفين عدديين scalar multiples ، كما أن هنالك نقطةٌ مشتركة A و لذلك فإن النقاط A,B,C متناسقة (تقع على خطٍ واحد) Collinear .



Graph of Vectors AB and AC
$\vec{AB} = (4, 5)$
$\vec{AC} = (-8, -10)$
x
y


Graph of Vectors AB and AC
$\vec{AB} = (4, 5)$
$\vec{AC} = (-8, -10)$
عمودي
5
(4,5)
(-8,-10)
عمودي
-10
-8
4
أفقـــي
4
-8
أفقـــي
x

هندسة المتجهات Vector and Geometry


يطلق في الهندسة على تغيير الحجم و الموقع و الدوران و التحول الذي يخضع له شكلٌ معين مصطلح (التحويل) Transformation ، أما النقل translation فإنه يعني إزاحة شكلٍ ما إلى موقعٍ جديد دون تغيير حجمه أو شكله أو موقعه ، أما الشكل المنقول translated object فيدعى بالصورة.

يتم تمثيل عملية النقل هذه على شكل متجهات.



يتم توصيف حركة كائنٍ ما أو شكلٍ ما على الشبكة الإحداثية بناءً على موقع تلك النقطة ذاتها من ذلك الشكل قبل النقل و أين أصبحت بعد أن تم نقل الشكل ، و بالنظر إلى موقع تلك النقطة من ذلك الشكل و موقعها الإحداثي ، و لتكن النقطة A مثلاً فإننا نقول بأن ذلك الشكل قد تحرك بمقدار 9 وحداتٍ مثلاً ، أي أنه قد تحرك تسع خانات(مربعات) باتجاهٍ أفقي نحو الجهة اليمنى التي يمثلها عددٌ موجب، و لذلك نعبر عن حركة هذا الشكل بأن مقدارها 9 خانات نحو الجهة اليُمنى :


$(X+9)$ خانات حركة أفقية نحو الميمنة(حركة أفقية موجبة)




كما نقول بأن هذا الشكل قد تحرك أو تم تحريكه بشكلٍ عمودي Y بمقدار 4 خانات نحو الأسفل ، حيث نعبر عن التحرك نحو الأسفل برقمٍ سلبي :

اكتب المعادلة هنا.

$(Y-4)$ = تحرك نحو الأسفل (على المحور العمودي Y) بمقدار 4 خانات و هي حركة سلبية لأنها نحو الأسفل و لذلك فقد عبرت عنها بقيمةٍ سلبية -4.






ليصبح عنوان الحركة الأولى التي تحركها هذا المثلث :

(X+9,y-4)

حركة نحو الجهة اليمنى (حركة أفقية موجبة) بمقدار 9 خانات ثم حركة عمودية نحو الأسفل (حركة سلبية) بمقدار 4 خانات.


ثم إن هذا المثلث قد تم تحريكه ثانيةً بمقدار 8 خانات نحو الجهة اليمنى ، أي أنه قد تحرك حركةً أفقية على المحور الأفقي X و هي حركةٌ موجبة + لأنها حركةٌ نحو الجهة اليمنى و نعبر عن هذه الحركة بالشكل :

$(X+8)$ حركة أفقية نحو الجهة اليمنى (حركة موجبة) بمقدار 8 خانات نعبر عنها بعددٍ موجب $+8$.



كما أن هذا الشكل قد تحرك بمقدار خانة واحدة نحو الأعلى، أي أنه قد تحرك حركةً عمودية إيجابية (لأنها حركة نحو الأعلى) على المحور العمودي y ، أي أن هذا الشكل قد تحرك بمقدار خانة واحدة أو مربع واحد و هي حركة إيجابية (صاعدة) و لذلك فإننا نعبر عنها بقيمةٍ موجبة مناسبة هي 1+

(Y+1)حركة صاعدة (موجبة)نحو الأعلى على المحور العمودي Y بمقدار خانةٍ واحدة.



و بالتالي يصبح توصيف الحركة الجديدة :

(X+8,Y+1)

حركة موجبة (نحو الجهة اليمنى) بمقدار 8 خانات ثم حركة موجبة (نحو الأعلى) بمقدار خانةٍ واحدة.

نقوم بتوصيف كل تحركٍ جديد بالنسبة للوضع الذي سبقه مباشرةً فقط و ليس بالنسبة للوضع الأصلي الأول للشكل.

حتى لا تختلط عليك الأمور **قم بتوصيف حركة الشكل بالنسبة لجزءٍ واحدٍ من زواياه مثلاً الزاوية A** (كما في مثالنا السابق).

نبدأ بعد الخانات بعد زاوية الخانة التي الشكل موجودٌ عليها الآن.

لا يشمل عد الخانات الخانة التي كان الشكل يتمركز عليها قبل تحركه و لكنه يشمل الخانة التي توقف عندها الشكل عندما بلغ موضعه الجديد.

مثال 2

تحرك هذا المستطيل وفق الإحداثيات التالية :

$$(X-7,Y-3)$$

أي أنه قد تحرك أولاً حركةً أفقية على المحور الأفقي X بمقدار 7 سبع خانات نحو الجهة اليسرى أي أنها حركةٌ سلبية -7 .

$$X-7:$$

X أي أنـها حركة أفقية

- (ناقص) لأنـها حركةٌ سلبية أي نحو الجهة اليسرى.

7 لأنـها حركة بمقدار 7 خانات .

كما أنه قد تحرك بمقدار ثلاثة 3 خانات عمودية Y نحو الأسفل (حركة سلبية) .

3-Y


Y لأنها حركة عمودية –


- **(ناقص) لأنها حركة سلبية نحو الأسفل.**

3 **لأنها حركة بمقدار 3 خانات.**

و بذلك فإن حركة هذا الشكل توصف إحداثياً بالصورة التالية :

$$(X-7,Y-3)$$


A
D
الخانــة الــتي يقــف عليهــا الشــكل
لا يشــملها العــد
-1
-2
-3
1
2
3
4
5
6
7
B
C
A′
D′
B′
C′
الخانـة الـتي يقـف عليهـا الشـكل


اتجــاه حركــة المســتطيل
اتجــاه حركــة المســتطيل
A
D
الخانــة الــتي يقــف عليهــا الشــكل
لا يشــملها العــد
-1
-2
-3
1
2
3
4
5
6
7
B
C
A′
D′
B′
C′
الخانـة الـتي يقـف عليهـا الشـكل

يتم التعبير عن عملية النقل translation بالصيغة :

$$(X+a,Y+b)$$

من الممكن طبعاً استبدال شارة الموجب + بشارة سالب إذا كانت الحركة سلبية نحو الجهة اليسرى أو نحو الأسفل كما مر معنا سابقاً.

يدعى الشكل المنقول بالصورة .



Reflections المنعكسات

إن كلاً من الشكل الأصلي و صورته المرآتية أي صورته المنعكسة يكونان متطابقين congruent أي أن شكلهما و حجمها يكون واحداً ، غير أن الصورة المنعكسة تكون مقلوبةً و معكوسة .


لتعريف صورة منعكسة على شبكة إحداثية فإننا نستخدم معادلة خط المرآة أو معادلة خط الانعكاس the equation of the mirror line .

كل نقطة على الصورة المنعكسة يكون بعدها عن خط الانعكاس mirror line مساوياً تماماً للبعد بين النقطة المماثلة لها على الجسم الأصلي و خط الانعكاس.


إذاً فإن المبدأ الأساسي في تشكيل الصور المرآتية أو الصور المنعكسة هو **أن كل نقطة على الصورة المنعكسة يكون بعدها مماثلاً لبعد النقطة المماثلة لها في الصورة الأصلية عن خط الانعكاس**، و لذلك **غالباً ما تتم تسمية النقطة الموجودة على الصورة الأصلية و النقطة المماثلة أو الموازية لها الموجودة على الصورة المنعكسة بأسماء متشابهة ، حيث تدعى نقطة على الصورة الأصلية بالاسم a مثلاً بينما تدعى النقطة الموازية لها على صورةٍ منعكسة باسم ä مثلاً** .

لإنشاء الانعكاس فإننا نبدأ أولاً برسم خط الانعكاس mirror line .

نقوم بتسمية رؤؤوس vertices (زوايا) الشكل الذي نريد عكسه.




نرسم خطاً يمتد من كل رأس (زاوية) من زوايا الشكل بزاوية قائمة 90° إلى خط الانعكاس mirror line و ما بعدها.



قم بقياس المسافة ما بين كل رأس (زاوية) و بين خط الانعكاس على امتداد الخط.

انتبه إلى بعد كل زاوية من زوايا الشكل عن خط الانعكاس و احرص على أن يكون بعد النقاط المماثلة الموجودة على صورة ذلك الشكل عن خط الانعكاس مماثلاً.

تتمثل الخطوة الأخيرة في وصل النقاط لإكمال الشكل المنعكس.



التدوير Rotation

يمكن تدوير جسمٍ ما حول نقطةٍ ثابتة تدعى بمحور الدوران أو مركز الدوران center of rotation .

تبقى الأجسام متطابقة بعد تدويرها ، أي أنه لا يطرأ اي تغييرٍ على حجمها أو شكلها .

توصيف الدوران :

حتى نقوم بتوصف عملية التدوير فإن الأمر يتطلب منا أن نأخذ ثلاثة عوامل بعين الاعتبار و هي :

زاوية الدوران .

الاتجاه.


موقع مركز الدوران.

إيجاد مركز و زاوية الدوران :


لإيجاد مركز و زاوية الدوران :

نرسم خطاً مستقيماً من نقطة ما في الشكل إلى النقطة المماثلة لها في الصورة.


a ، ä .



و في منتصف ذلك الخط نرسم خطاً آخر يتعامد معه بزاويةٍ قائمة 90° درجة .




نصل زاوية اخرى من زوايا الشكل بزاويةٍ مقابلةٍ لها من صورته :



كما نرسم كذلك خطاً آخر في منتصفه متعامدٍ معه بزاوية قائمة 90° بالطبع .

إن مركز الدوران center of rotation يقع في النقطة التي يلتقي فيها الخطين المتعامدين .



النقطة الثابتة التي يدور حولها جسمٌ ما تدعى بمحور الدوران Center of rotation .

تبقى الأجسام متطابقة بعد تدويرها (لا تتغير أشكالها).

لتوصيف حركة الدوران فإننا نحتاج لمعرفة ثلاثة اشياء و هي : زاوية الدوران و اتجاه الدوران و محور الدوران.


تأسيس الحركة الدورانية *Construction rotations*

يعني تأسيس الحركة الدورانية تدوير شكلٍ ما حول محور دوران بزاويةٍ معينة ثم رسم الشكل الجديد أو صورة الشكل الجديد .

محور الإحداثية أو أصلها هو نقطة تقاطع المحور الأفقي مع المحور العمودي و عنوانه (0,0)

لتحريك شكلٍ ما حول محورٍ أو أصل الإحداثية (0,0) فإننا نركز إبرة الفرجار (البرجل)

على الأصل أو المركز (0,0) ثم نرسم قوساً يمتد من كل زاوية من زوايا الشكل إلى المحور الأفقي وفق اتجاه دوران عقارب الساعة أو بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة .





لاحظ كيف أننا ركزنا إبرة الفرجار (البرجل) عند مركز الإحداثية أي عند تقاطع المحورين الأفقي و العمودي ثم قمنا برسم أقواسٍ تمتد من كل زاويةٍ من زوايا المثلث إلى المحور الأفقي.




لتدوير الشكل بزاويةٍ معينة فإننا نضع مركز المنقلة protractor فوق مركز الدوران الذي سبق لنا أن ركزنا إبرة الفرجار عليه لرسم الأقواس ، ثم نحدد الزاوية التي نريد تدوير الشكل إليها و لتكن مثلاً 45° درجة من كل زاوية من زوايا الشكل .

نحدد نقاط تقاطع زوايا الشكل مع القوس مع مراعاة جهة الدوران و ما إذا كانت متوافقة مع دوران عقارب الساعة أو بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة .





تأسيس حركة دورانية تعني تدوير شكلٍ بزاوية معينة حول مركز دوران center of rotation .



التمديد dilation

يعني التمديد تغيير موضع و حجم الشكل دون تغيير قياس زواياه أو النسب بين أضلاعه .

يتم إنشاء التمديد باستخدام نقطةٍ ثابتة تدعى بمحور أو مركز التمديد center of delation

لتوصيف عملية التمديد فإننا نحتاج إلى عاملين اثنين و هما :


موضع أو مركز التمدد center of dilation

عامل قياس scale factor

مركز التمدد : مركز التمدد هو المركز الذي ينطلق منه خطٌ وهمي يمر عبر مركز الجسم قبل و بعد تمدده ، أي أنه خط التناظر الذي يُنصف الجسم قبل و بعد تمدده .

يقع مركز التمدد عند نقطةٍ إحداثية لها عنوانٌ أفقي و عمودي .

عنوان مركز التمدد الإحداثي هو موضع تقاطع نقطة إحداثية أفقية تقع على المحور X مع نقطةٍ عمودية تقع على المحور العمودي Y .



يمكن حساب عامل قياس التمدد scale factor of dilation ببساطة عن طريق قسمة طول أحد أضلاع الشكل الجديد على طول أحد أضلاع الشكل القديم(قبل تمدده).

$$\text{Scale factor} = \frac{new\ length}{Old\ length}$$


$$\text{عامل القياس} = \frac{\text{الطول الجديد}}{\text{الطول القديم}}$$

تأسيس التمدد *constructing* dilation

يمكننا إنشاء التمدد من خلال رسم خطوطٍ مستقيمة تمتد من مركز التمدد center of dilation


إلى كل زاوية من زوايا الشكل.

يمكننا إنشاء التمدد من خلال رسم خطوطٍ مستقيمة تمتد من مركز التمدد عبر كل زاوية من زوايا الشكل.



لكل تمدد مركز تمدد يقع عند نقطةٍ ما في الشبكة الإحداثية .

مركز التمدد عبارة عن نقطة لها عنوانٌ إحداثي هو عبارة عن موقع التقاء نقطة أفقية مع نقطة عمودية .



أول رقمٍ في العنوان الإحداثي يمثل النقطة الأفقية بينما يمثل ثاني رقم النقطة العمودية و تفصل بين النقطتين الإحداثيتين فاصلة .

تنطلق من نقطة التمدد أو مركز التمدد خطوطٌ مستقيمة بعدد زوايا الشكل تصل إلى زوايا الشكل قبل تمدده ثم تتسع و تستمر لتصل إلى زوايا الشكل بعد تمدده.

يمثل عامل القياس أو عامل التمدد scale factor نسبة أو مقدار تمدد ذلك الشكل.

نرسم خطوطاً مستقيمة تمتد من مركز التمدد لتصل إلى جميع زوايا الشكل.

لحساب بعد الشكل بعد تمدده نقيس المسافة ما بين مركز التمدد *center of dilation* و كل زاوية من زوايا الشكل الأصلي .

إذا ضربنا المسافة ما بين مركز التمدد و زوايا الشكل الأصلي قبل تمدده بعامل التمدد فإننا نحصل على بعد كل زاوية جديدة من زواياه بعد تمدده عن مركز التمدد .

نضع نقاط علام عند مواقع زوايا الشكل الجديد (بعد تمدده) و نصل بين نقاط العلام لنرسم الشكل.

يغير التمدد من حجم و موقع الأشكال.


لتوصيف عملية التمدد فإننا نحتاج إلى مركز تمدد و عامل تمدد .

عامل التمدد (عامل القياس scale factor) يساوي الطول الجديد تقسيم الطول القديم .

Scale factor= new length÷old length

التمدد الكسري و السلبي Fractional and Negative Dilation


كما مر معنا سابقاً فإن **التمدد الإيجابي الاعتيادي يجعل الأشكال أكبر حجماً ، أما التمدد الكسري فإنه يقلص الأشكال ، بينما التمدد السلبي يقلب الأشكال رأساً على عقب من خلال عكسها .**



التمدد الكسري

عوامل التمدد *scale factor* التي تقع ما بين صفر و واحد *(0-1)* تجعل الأشكال أصغر حجماً ، فعند اعتماد عامل تمدد يبلغ نصف *0.5* أي $\frac{1}{2}$ مثلاً فإن كل ضلعٍ من أضلاع الشكل الجديد يُصبح بنصف طول الطول الأصلي.

و يمكن لنا أن نعكس التمدد من الشكل الأصغر نحو الشكل الأكبر و عندها فإننا نقلب عامل التمدد ليصبح 2 بدلاً من نصف $\frac{1}{2}$.



الصورة أصغر من الأصل بثلاث مرات
مركز التمدد
عامل التمدد ثلث
y
12
8
4
x
–4
0
4
8
12
16
20
A
B
C
A′
B′
C′

قياس المساحة و الحجم


إذا قمنا بتمديد شكلٍ ما بعامل تمدد يبلغ 2 فإن طوله و عرضه يتضاعفان غير أن مساحته السطحية *surface area* و حجمه يزدادان بدرجةٍ أكبر.

مثال :

إذا كان لدينا مربعٌ طول ضلعه مترٌ واحد *1m* و قمنا بتمديده بعامل تمدد مقداره 3 فإن طوله و عرضه يزدادان بمقدار *3X* .

ماذا يعني هذا ؟

إن هذا يعني بأنه إذا كان طوله مترٌ واحد فسوف يصبح طوله ثلاثة أمتار ، و إذا كان عرضه مترٌ واحد فسوف يُصبح ثلاثة أمتار.




فإذا كان لدينا مكعبً طول ضلعه مترٌ واحد *1m* فإن حجمه يبلغ بالطبع $1m^3$ (متر مكعب) ، فإذا قمنا بتمديد

هذا المكعب بعامل تمدد مقداره 3 فإن حجم المكعب الجديد سوف يُصبح :

$3\times3\times3=27m3$


متر مكعب و بعد أن كانت مساحته $1\times1m$ **فإنها سوف تصبح** $3\times3m$ **متر ، أي أن مساحته سوف تزداد بعامل تمددٍ يبلغ** $3\times3=9m$ **.**

إذا ازداد عرض أو طول شكلٍ ما بعامل تمدده مقداره X **فإن مساحته تزداد بعامل تمددٍ مقداره** $X2$ **، أي أن مقدار زيادة المساحة يساوي دائماً مربع عامل التمدد .**



إذا ازداد طول و عرض شكلٍ ما بعامل تمدد مقداره X فإن مساحته سوف تزداد بعامل تمدد يساوي مربع عامل التمدد اي X^2 أي $X \times X$.

إذا ازداد طول و عرض شكلٍ ما بعامل تمدد مقداره X فإن حجمه سوف يزداد بعامل تمدد يساوي مكعب عامل التمدد اي X^3 أي $X \times X \times X$.



تزداد المساحة بشكلٍ تربيعي (مربع عامل التمدد) بينما يزداد الحجم بشكلٍ تكعيبي (مكعب عامل التمدد) .


مربعٌ طول ضلعه 1 سنتمتر ، فإذا كان عامل التمدد 4 فإن مساحته تزداد بمعدل X^2 أي 4^2.

أي $4 \times 4 = 16$

أي ان هذا المربع سوف يُصبح عبارة عن 16 مربعاً طول كلٍّ منها 1 سنتمتر و عرضه 1 سنتمتر بالطبع أي أن هذا المربع سوف يصبح مربعاً طول ضلعه 4 سنتمتر و سوف تصبح مساحته :

$4\times4=16\ cm^2$

16 سنتمتر مربع ، أي ستكون هنالك 4 مربعات طولية و 4 مربعات عرضية :



و إذا ازداد طول أو عرض شكلٍ ما بعامل تمدد مقداره X فإن حجمه سوف يزداد بعامل تمددٍ يبلغ X^3 .

فإذا كان عامل التمدد 4 فإن حجم هذا المكعب سوف يزداد بمقدار 4^3 أي $4\times4\times4$

$$4^3=4\times4\times4=64$$

أي أن هذا المكعب سوف يصبح 64 مكعب مماثل للمكعب الأول.

مسألة

قالبي حلوى يبلغ عرض القالب الأول 20 سنتمتر بينما يبلغ عرض القالب الثاني 40 سنتمتر و يبلغ سعره ضعف سعر القالب الأول ،فإذا كان ارتفاع القالبين واحداً فأيهما أكثر اقتصادية؟

نقوم بحساب عامل تمدد العرض :

Scale factor=$\frac{width\ of\ 1}{width\ of\ 2}$

عامل التمدد = $\frac{\text{عرض القالب الأول}}{\text{عرض القالب الثاني}}$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة:

عامل التمدد = $\frac{40}{20}$

$\frac{40}{20}=2$

أي أن عامل تمدد العرض يبلغ 2 .

الأن نقوم بحساب عامل تمدد المساحة:

عامل تمدد المساحة يساوي مربع عامل تمدد العرض .

Area scale factor=square of the width scale factor

$2^2=4$

أي أن قطعة الحلوى الكبيرة تحوي أربعة أضعاف الكمية الموجودة في قطعة الحلوى الصغيرة و لكن بنصف ثمنها فقط.

أي أنه عندما ازداد عرض قطعة الحلوى مرة واحدة، أي عندما تضاعف عرض قطعة الحلوى فإن مساحتها قد تضاعفت 4 مرات.

أي أنه بينما تضاعف سعر قطعة الحلوى عندما تضاعف عرضها مرة واحدة فإن مساحتها قد تضاعفت 4 مرات بينما لم يتضاعف سعرها إلا مرتين .

إذا أصبح الشيء بضعف حجمه $2X$ نقول بأنه قد تضاعف مرة واحدة :

الأصل+الضعف

عبارة "تضاعف مرتين" تعني أن الحجم قد أصبح 3 أضعاف الحجم الأصلي :

الأصل + الضعف + الضعف.

إذا أصبح الشيء 4 أضعاف حجمه الأصلي، فهذا يعني أنه قد تضاعف ثلاث مرات

الأصل+الضعف+الضعف+الضعف


حل مسائل الانعكاس

بدايةً أرسم خط الانعكاس the mirror line حسب الإحداثية المعطاة لي فإذا قيل لي بأن عنوان خط الانعكاس هو $X=-3$ فذلك يعني بأنه خطٌ وهمي يتعامد مع النقطة الأفقية 3- .

و إذا كان :


$X=-1$

فذلك يعني بأنه خطٌ وهمي يتعامد مع النقطة الأفقية 1- الموجودة على المحور الأفقي X .




إن بعد كلٍ من الشكل و صورته عن خط الانعكاس يجب أن يكون واحداً .

و كذلك فإن ارتفاع الشكل عن المحور الأفقي يجب أن يكون مماثلاً لارتفاع صورته عن الخط الأفقي.




إن بعد كلٍ من الشكل و صورته عن خط الانعكاس يجب أن يكون واحداً .

إن ارتفاع الشكل عن المحور الأفقي يجب أن يكون مماثلاً لارتفاع صورته عن المحور الأفقي.




كل زاوية من زوايا الشكل الأصلي يجب أن يكون بعدها عن خط الانعكاس مساوياً لبعد كل زاوية من زوايا صورة ذلك الشكل (المنعكسة) عن خط الانعكاس.

انعكس الشكل A عند النقطة الأفقية -1 الواقعة على المحور الأفقي $X=-1$ ، و هذا العنوان يشير إلى أن النقطة التي ينطلق منها خط الانعكاس تقع على المحور الأفقي X عند النقطة السلبية -1:



و هذا الانعكاس قد أدى إلى تشكل الشكل *B* الذي كل زاويةٍ من زواياه تبعد عن خط الانعكاس بالقدر ذاته عن الزاوية المماثلة لها في الشكل الأساسي عن خط الانعكاس.




الشكل *C* بدوره قد انعكس عند النقطة صفر 0 على المحور العمودي *Y=0* ، أي أنه قد انعكس عند المحور الأفقي *X* الذي سوف نعتبره كخط انعكاس لتشكيل الشكل *C* ، و الذي كل زاويةٍ من زواياه تبعد بالقدر ذاته الذي تبعده زوايا الشكل *B* عن خط الانعكاس و الذي هو الخط الأفقي *X* .

و كما تلاحظون فإن الشكل المنعكس C هو عبارة عن تدوير للشكل A بزاوية $180°$ درجة باتجاه يوافق دوران عقارب الساعة أو بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

الشكل C هو عبارة عن صورة مقلوبة مطابقة للشكل B ، بينما هو صورة مقلوبة و معكوسة عن الشكل A بزاوية $180°$ درجة بدورانٍ حول محور دوران يمر عبر نقطةٍ إحداثية لها عنوانٌ أفقي X و عنوانٌ عمودي Y .


محور الدوران يصل بين أقرب زاويتين من كلا الشكلين.




محور الدوران هو الخط المائل الذي يصل بين زاويتي الشكلين.

بعد الشكلين ، أو بعد الشكل و صورته عن خط الانعكاس الذي يمر عبر نقطةٍ أفقية و لتكن مثلاً -2 يجب أن يكون واحداً.

بعد الشكلين A و B عن خط الانعكاس يجب ان يكون واحداً (بعد عمودي)




و كذلك فإن بعد الشكل A عن المحور الأفقي يجب أن يكون كذلك مساوياً لبعد الشكل B عن المحور الأفقي (خانة واحدة مثلاً) :




البعد بين جميع زوايا الشكل A و خط الانعكاس يماثل بعد جميع زوايا الشكل B عن خط الانعكاس ، بمعنى أن بعد كل زاوية عن خط الانعكاس يكون مماثلاً لبعد الزاوية الموازية لها عن خط الانعكاس.


و الآن إذا اهملنا الموقع العمودي $Y=0$ ، أي إذا اعتبرنا المحور الأفقي X خط انعكاس ما بين الشكل B و الشكل C الذي يقع تحته فيجب أن يكون البعد ما بين الشكلين A و B و خط الانعكاس الأفقي واحداً.



و كما ترون فإن الشكل C قد تشكل من الشكل الأول A بعد تدويره بزاوية دوران مقدارها $180°$ درجة عبر محور دوران يمر عبر نقطة خط الانعكاس الأول ذاتها.



يمر محور الدوران بين الشكلين A و B عبر النقطة السلبية الأفقية -1 التي يتقاطع فيها خط الانعكاس مع المحور الأفقي .



محور الدوران هو الخط المائل الذي يصل بين زاويتي الشكلين B و C.

التوجه و الملاحة *Bearings*



التوجه و الملاحة *Bearings*

زاوية التوجه *bearing* هي زاويةٌ يتم قياسها وفق اتجاه دوران عقارب الساعة *clockwise* ابتداءً من الجهة الشمالية ، و تستخدم زوايا التوجه من قبل الطيارين و البحارة و الرحالة و المغامرين و الجنود لتحديد اتجاه الرحلة بين نقطتين.

مخططات التوجه *Bearing diagrams*

هنالك دائماً في مخططات التوجه خطين مستقيمين : خطٌ شمالي يوضع عند بداية الرحلة و خطٌ آخر يُظهر خط سير الرحلة ، أما زاوية التوجه *bearing* فهي الزاوية المحصورة بين هذين الخطين الموافقة لاتجاه دوران عقارب الساعة .

إن زاوية التوجه ليست الزاوية الصغرى المحصورة بين خطي التوجه إذ عادةً ما تكون زاوية التوجه أكبر من نصف دورة *half-turn* أي أنها عادةً ما تكون أكبر من 180° درجة .

تتألف إحداثيات التوجه *bearing* دائماً من ثلاثة أرقام .

انتبه جيداً حتى لا تخسر علامات لسببٍ تافه :




تتألف إحداثيات التوجه *bearing* دائماً من ثلاثة أرقام .

حتى إن كانت بيانات التوجه تتألف من رقمين فقط مثلاً 90° درجة فإننا نضع صفراً قبلها لتصبح ثلاثة أعداد فتصبح (090°).


نستخدم مخططات التوجه لتحديد اتجاه الرحلة بين نقطتين .

تقاس زاوية التوجه دائماً وفق اتجاه دوران عقارب الساعة ابتداءً من الجهة الشمالية .




انتبه جيداً :

إذا تجاوزت زاوية التوجه 180° درجة (أي الخط المستقيم) فإننا نقيسها من الخارج و ليس من الداخل.



تتألف الزاوية الخطية من زاويتين قائمتين و يبلغ قياسها 180° درجة و هي تشكل خطاً مستقيماً.



يكون التوجه دائماً موافقاً لاتجاه دوران عقارب الساعة (من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى أي أنه دوران موجب +)

حتى لا تنسى جهة دوران عقارب الساعة تذكر دائماً بانه دورانٌ موجب + من الجهة اليسرى نحو الجهة اليمنى (*من الساعة* 12 *إلى الساعة 1*).

إذا كانت زاوية التوجه اكبر من 180° درجة فإننا نقيسها من الخارج و ليس من الداخل.

إن خط الشمال N هو دائماً الخط القياسي .

مسألة في التوجه و الملاحة الجوية

تحركت طائرة بزاوية 300° درجة لمسافة 600 كيلو متر ثم غيرت اتجاهها حيث تحركت بزاوية 090° درجة لمسافة 400 كيلو متر ثم عادت إلى قاعدتها أو النقطة التي انطلقت منها .

المطلوب:

حدد و ارسم مسار الرحلة الجوية لهذه الطائرة باستخدام مخططٍ مقياسه الرسومي يبلغ

$1cm=100km$ ، أي 1 سنتمتر لكل 100 كيلو متر .

استخدم المقياس لاستكمال العناصر الناقصة من بيانات الرحلة .


خطوات الحل :

الخطوة الأولى التي يتوجب القيام بها تتمثل في تحديد خط الشمال و رسمه على المخطط :

المرحلة الأولى من الرحلة :

نحدد نقطة البداية و نرسم خط الشمال *North line* ثم نثبت منقلة (مقياس زوايا *protractor*) على نقطة الانطلاق و نحدد باستخدامها موقع ال 300° درجة .


نرسم خطاً يمثل المرحلة الأولى من الرحلة و التي تبلغ مسافتها 600 كيلو متر .



كل ١ ســـــنتمتر يعـــادل ١٠٠ كيلومـــــتر

المرحلة الثانية من الرحلة :


نرسم خط شمالٍ جديد ثم نستخدم المنقلة لتحديد الزاوية الملاحية 090° درجة كما نرسم خطاً بناءً على تلك الزاوية يمثل خط سير الرحلة و يبلغ طوله 4 سنتيمتر و ذلك لأن طول المرحلة الثانية يبلغ 400 كيلو متر.




كل ١ ســـــنتمتر يعـــادل ١٠٠ كيلومـــــتر

الآن :


نكمل المثلث و نقيس الزاوية الجديدة التي تشكلت عندما قمنا بتشكيل المثلث الجديد لتحديد التوجه النهائي كما نقيس طول الخط الذي أكملنا به المثلث و نحول السنتمترات إلى كيلومترات لمعرفة اجمالي الرحلة.



لا ننسى أن نرسم خط شمالٍ جديد بعد إكمال مثلث الرحلة و لا ننسى أن نقيس الزاوية التي تشكلت بعد إكمال المثلث من الخارج و ليس من الداخل.



الشـــمال
N
4 ســــــنتمتر
اتجـــاه المرحـــلة الثانيـــة
90
الشـــمال
N
6
ســـــنتمتر
اتجـــاه المرحـــلة الأولـــى
300
درجة
القيـــاس مـــن الخـــارج
لأن الزاويـــة اكـــبر مـــن ١٨٠




الشـــمال
N
4 ســــــنتمتر
خط
N الشـــمال
الجديـــد
90
الزاويـــة الجديـــدة
الشـــمال
N
المثلـــث
6
ســـــنتمتر
اتجـــاه المرحـــلة الأولـــى
300
درجة
القيـــاس مـــن الخـــارج
لأن الزاويـــة اكـــبر مـــن ١٨٠

تنصيف الزوايا Bisecting an angle


لتنصيف زاوية :

نضع إبرة الفرجار على على رأس الزاوية o ثم نرسم قوساً يتقاطع مع ضلعي الزاوية في نقطتين A و B.



الان نثبت إبرة الفرجار في إحدى نقطتي تقاطع القوس مع ضلع الزاوية و لتكن النقطة A مثلاً و نرسم قوساً ، ثم نثبت إبرة الفرجار عند نقطة تقاطع القوس مع ضلع الزاوية الثاني و لتكن النقطة B و نرسم قوساً أخرى تقاطع القوس الأولى عند النقطة P .

الآن نستخدم مسطرة لرسم خطٍ منصف للزاوية يمتد ما بين نقطة تقاطع القوسين Pو مركز الزاوية O.



رسم زاوية قياسها °60 درجة دون منقلة

تقوم هذه الفكرة على مبدأ أن الزاوية في المثلث المتساوي الساقين Equilateral يبلغ قياسها °60 درجة:


60°+60°+60°=180°

و بمجرد أن نرسم زاوية قياسها °60 درجة فإن بإمكاننا أن ننصفها بالطريقة التي تقدم ذكرها.

رسم زاوية قياسها °60 درجة دون منقلة :

نرسم خطاً مستقيماً .


نثبت إبرة الفرجار على ذلك الخط المستقيم و نرسم قوساً تتقاطع مع ذلك الخط المستقيم :



نحافظ على اتساع الفرجار ذاته و نثبت إبرة الفرجار عند نقطة تقاطع القوس مع الخط المستقيم و نرسم قوساً ثانية تقاطع القوس الأولى:



نرسم خطاً يمتد ما بين أول نقطة و نقطة تقاطع القوسين :



و بذلك نحصل على زاوية قياسها 60° درجة .

الأشكال المتطابقة congruent shapes هي الأشكال التي لها الشكل و الحجم ذاته .

الأشكال المتطابقة لها الزوايا الداخلية ذاتها كما أن أطوال اضلاعها متماثلة غير أنه يمكن لها أن تظهر بشكلٍ معكوسٍ أو مقلوب بزاويةٍ ما.

المثلثات المتطابقة Congruent triangles


توصف المثلثات التي لها الأحجام و الأشكال ذاتها بأنها مثلثاتٌ متطابقة.

يمكننا إثبات أن مثلثين ما هما متطابقين دون معرفة أبعادهما و مقاييسهما إذا حقق هذين المثلثين الشروط الخمسة التالية :

S,S,S = Side,side,side

ضلع+ضلع+ضلع


إذا كانت أطوال أضلاعهما كلها متماثلة ، ذلك أنه إذا كانت أطوال اضلاعهما متماثلة فذلك يعني بأن زواياهما هي كذلك متماثلة حتماً.




زاويتين و ضلعٌ غير محصورٍ بينهما

AAS =Angle,Angle,Side

زاوية+زاوية+ضلع غير محصور بينهما






إذا كانت لدينا زاويتين في مثلث تماثلان في القياس زاويتين في مثلثٍ آخر و كان لدينا كذلك في ذلك المثلث ضلعٌ غير محصورٍ

بين هاتين الزاويتين يماثل في قياسه ضلعاً في المثلث الآخر فذلك يعني بأن هذين المثلثين متطابقين.

ضلع +زاوية (محصورة بينهما)+ضلع

Side,angle,side (SAS)

إذا كان لدينا في أحد المثلثين ضلعين و الزاوية المحصورة بينهما (الزاوية الضمنية) the included angle تماثل و تساوي ضلعين و زاوية محصورة بينهما في مثلثٍ آخر فذلك يعني بأن المثلثين متطابقين.




$$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$$

Angle,side,angle


زاوية+ضلع(محصور بينهما)+زاوية


إذا كان لدينا زاويتين و الضلع المحصور بينهما تساوي زاويتين و ضلعٌ محصورٌ بينهما في مثلثٍ آخر فذلك يعني بأن المثلثين متطابقين.



وتر و ساق

إذا كان وتر و ساق مثلثٍ قائم الزاوية يطابقان وتراً و ساقاً في مثلثٍ آخر قائم الزاوية فذلك يعني بأن هذين المثلثين متطابقين.





المثلث القائم الزاوية right triangle هو مثلثٌ يحوي زاوية قائمة يبلغ قياسها 90° درجة.

وتر المثلث hypotenuse هو أطول ضلعٍ في المثلث القائم الزاوية كما أنه الضلع الوحيد المائل فيه.

يكون مثلثين متطابقين :

إذا كانت أضلاعهما الثلاثة النظيرة لبعضها البعض متساوية في الطول.

Side,Side,Side (SSS)

إذا كانت هنالك زاويتين و ضلعٌ غير محصورٍ بينهما تماثل زاويتين نظيرتين و ضلعٌ غير محصورٍ بينهما في مثلثٍ آخر.

Angle,Angle,Angle (AAS)

إذا كان لدينا ضلعين و الزاوية المحصورة بينهما تماثل ضلعين و الزاوية المحصورة بينهما في مثلثٍ آخر:

Angle,Side,Angle (ASA).

إذا كان لدينا وترٌ و ساق في مثلث تماثل وتراً و ساقاً في مثلثٍ آخر فالمثلثين متطابقين.

الاختلاف ما بين المثلثات المتطابقة و المثلثات المثلثات المتشابهة

عندما يوصف مثلثين بأنهما متشابهان (و ليس متطابقين) فذلك يعني بأن شكلهما واحد و لكنه لايعني بالضرورة أن تكون أطوال أضلاعهما متساوية، فالمثلثات المتشابهة تكون ذات زوايا متطابقة متماثلة أما أطوال أضلاعها فإنها تكون متناسبة (و لكنها قد لا تكون متماثلة) .

يمكن إثبات أن مثلثين ما متشابهين إذا انطبقت عليهما إحدى هذه القواعد الأربعة :

إذا كانت جميع زوايا المثلثين متطابقة (متماثلة) فذلك يعني بأن هذين المثلثين متشابهين (بغض النظر عن طول أضلاعهما).

لا يشترط في المثلثين المتشابهين أن تكون أطوال أضلاعهما مُتماثلةً.

إذا كانت جميع زوايا المُثلثين متطابقة فذلك لا يضمن أن أطوال أضلاعهما متساوية كذلك ، أما إذا كانت جميع أطوال أضلاع المُثلثين مُتساوية في الطول فذلك يعني بأن زواياهما كذلك متطابقة و متماثلة في القياس و ذلك وفقاً لقاعدة


(ضلع-ضلع-ضلع) SSS (Side-Side-Side) التي مرت معنا سابقاً.

إذا كانت هنالك زاويتين متماثلتين في كلا المثلثين فالمثلثين متشابهين بغض النظر عن قياس الزواية الثالثة ذلك أن قياس الزاوية الثالثة هو تحصيل حاصل فإذا كانت هنالك زاويتين في المثلث الأول تطابقان زاويتين في المثلث الثاني فالزاوية الثالثة في كلا المثلثين يجب أن تكون متماثلة لأن مجموع قياس زوايا أي مثلث يجب أن يكون 180° درجة فقياس الزاوية الثالثة المجهولة يساوي 180° درجة ناقص مجموع قياس الزاويتين الأخريين.

فإذا كانت لدي زاويتين في المثلث الأول تماثلان في قياسهما زاويتين في المثلث الثاني فالزاوية الثالثة في المثلث الأول يجب أن تماثل قياس الزاوية الثالثة في المثلث الثاني حُكماً.

إذا كان لدينا مثلثٌ قياس زاويتين فيه يماثل قياس زاويتين في مثلثٍ ثاني فإن قياس الزاوية الثالثة فيه لا يُمكن أن يكون مختلفاً عن قياس الزاوية الثالثة في المثلث الثاني.

إذا كانت أطوال أضلاع المثلث الأول الثلاثة متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث الثاني الثلاثة فالمثلثين متشابهين .



GHI ~ JKL by **SSS**

لدينا في الشكل السابق الأضلاع الثلاثة في المثلث الأول تتناسب مع الأضلاع النظيرة لها في المثلث الثاني حيث تبلغ النسبة بينهما $\frac{1}{2}$:


16-8

12-6

12-6

إذا كانت النسبة بين ضلعين في مثلثٍ قائم الزاوية تماثل النسبة بين ضلعين في مثلثٍ آخر قائم الزاوية فالمثلثين متشابهين.

يُبين الشكل السُفلي ما هو المعني بكلمة تناسب فقاعدة المثلث الأيمن يبلغ طولها 4 بينما قاعدة المثلث الأيسر يبلغ طولها 8 ، أي أن قاعدة المثلث الأيمن تساوي نصف طول قاعدة المثلث الأيسر.



كما أن طول الضلع الأيسر في المثلث الأيمن يبلغ 3.5, بينما يبلغ طول الضلع الأيسر في المثلث الأيسر 7 ، أي أن طول الضلع الأيسر في المثلث الأيمن يُساوي نصف طول الضلع الأيسر في المثلث الأيسر.

أي أن النسبة بين الأضلاع المتناظرة في هذين المثلثين تبلغ $\frac{1}{2}$ أي أنهما متناسبين.


إذا كان لدينا ضلعين في المثلث الأول متناسبين مع ضلعين مناظرين في المثلث الثاني و كان هذين الضلعين يحصران بينهما زاويةً متطابقة مع زاوية مناظرة لها في المثلث الثاني فالمثلثين متشابهين.

لدينا في الشكل السفلي ضلعين في المثلث الأول متناسبين مع ضلعين مناظرين لهما في المثلث الثاني حيث تبلغ النسبة بينهما $\frac{1}{2}$:

10 - 5

8 - 4

و هذه الأضلاع الأربعة المتناظرة في كلا المثلثين تحصر بينهما زاويتين متطابقتين يبلغ قياسيهما   80° درجة.




لاحظ كيف يكون أطوال الأضلاع المتناظرة متناسباً في المثلثات المتشابهة.


إذا كانت النسبة بين ضلعين في مثلثٍ قائم الزاوية تماثل النسبة بين ضلعين في مثلثٍ آخر قائم الزاوية فالمثلثين متشابهين .

مسألة في التناسب :


شجرة يبلغ طول ظلها 10 أمتار و يبلغ ارتفاعها 6 أمتار ، و شجرةٌ ثانية يبلغ طول ظلها 15 متر فكم يبلغ ارتفاعها ؟


تخيل المسألة :





لحل هذه المسألة فإننا نتخيل بأن هاتين الشجرتين مع ظليهما عبارة عن مثلثين قائمي الزاوية متشابهين (متناسبين) أي أن أضلاعهما متناسبة الطول (و ليست متساوية) .





كما تلاحظون ففي كل شجرة نجد بأن نسبة الظل إلى الارتفاع تبلغ :

10:6

15:h

h تعني الارتفاع و هي قيمةٌ مجهولة.

10:6=15:h

$$\frac{15}{h}=\frac{10}{6}$$

h=

إذا كانت الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار يبلغ طول ظلها 10 أمتار فكم يبلغ ارتفاع h شجرة يبلغ طول ظلها 15 متراً؟

نقيم متناسبة لحل المسألة :


$$\mathbf{h}=\frac{15\times 10}{6}=\frac{150}{6}=25$$

و لذلك فإن طول هذه الشجرة يبلغ 25 متر.

إذا توفر لدينا قياس زاويتين من زوايا المثلث فإن بإمكاننا معرفة قيمة الزاوية الثالثة عن طريق طرح مجموع الزاويتين من 180° .

لإثبات تطابق مثلثين فإننا نحتاج إلى معرفة طول ضلعٍ واحدٍ على الأقل في كل مثلث.

مسألة في التناسب :



في المثلث ESP المستقيم IT موازي للضلع SP .

المطلوب : كم يبلغ طول الضلع EY ؟

المثلث الأصغر EIT مشابهٌ للمثلث الكبر ESP لأن زواياهما متماثلة ، و لذلك فإن كلا المثلثين متناسبين Proportional ، و هذا يعني بأن أضلاعهما هي كذلك متناسبة ، أي أن بإمكاننا أن ننشئ متناسبة (علاقة تناسب) بين المثلث الأصغر و المثلث الأكبر.

$$\frac{4}{6} = \frac{4+y}{14}$$


على اعتبار أن (4+y) هما جزئين يمثلان ضلعاً واحداً من أضلاع المثلث الأكبر:

$$\frac{4}{6} = \frac{4+y}{14}$$

$$\frac{4 \times 14}{6} = \frac{56}{6} - 4 = 5.3\ cm$$

لماذا طرحنا العدد 4 من النتيجة؟

لأن المطلوب منا هو إيجاد طول y و بما أن الضلع EP يتألف من قسمين أحدهما Y و الثاني طوله 4 سنتمتر فإن طول الضلع Y يساوي Y+4 - 4 أي EP ناقص 4 .



نتأكد من صحة العملية التي قمنا بها :

تناسب المثلث الأصغر :

$$\frac{4}{6} = 4 \div 6 = 0.67$$

تناسب المثلث الأكبر :

$$\frac{4 + 5.3}{14} = 0.67$$

النتيجتين شبه متماثلتين (إذا أهملنا الكسور العشرية اللانهائية) .

إذا كانت لدينا مثل هذه العلاقة(علاقة تناسب المثلث الأصغر مع المثلث الأكبر) :

$$\frac{4}{6} = \frac{4 + y}{14}$$

فإن مجهولها Y يساوي بسط الكسر الأول 4 ضرب مقام الكسر الثاني 14 مقسوماً على مقام الكسر الأول 6 ناقص العدد المجموع مع المجهول أي 4 .

$$\frac{4 \times 14}{6} = \frac{56}{6} - 4 = 5.3\ cm$$

إذا كانت لدينا مثل هذه المتناسبة :

$$\frac{4}{6} = \frac{4 + y}{14}$$

فإن مجهول هذه العلاقة Y يساوي بسط الكسر الأول 4 ضرب مقام الكسر الثاني 14 مقسوماً على مقام الكسر الأول 6 ناقص العدد المجموع مع المجهول Y أي العدد 4.

$$\frac{A}{B} = \frac{C + X}{D}$$

$$X = \frac{D \times A}{B} - C$$

علاقة رقمية تمكننا من تذكر هذه العلاقة


$$\frac{5}{10} = \frac{20 + X}{100}$$

$$X = \frac{100 \times 5}{10} = \frac{500}{10} - 20 = 30$$

$$X=30$$

قواعد هندسية ذهبية


جميع الزوايا التي يتم تشكيلها بين نهايتي قطر الدائرة و أي نقطةٍ على محيط الدائرة لا يمكن ان تكون إلا زوايا قائمة 90° بالطبع .



جميع الزوايا التي تتشكل ما بين نهايتي قطر الدائرة و اي نقطةٍ على محيط الدائرة يجب أن تكون زوايا قائمة اي أن قياسها 90° درجة .


إثبات القاعدة :

حاول أن ترسم زاوية غير قائمة ما بين طرفي قطر دائرة و أي نقطةٍ على محيطها.




الشكل الرباعي الدائري cyclic quadrilateral

الشكل الرباعي الدائري شكلٌ رباعي الأضلاع يُمكن أن يوضع ضمن دائرة بحيث تمس زواياه الأربعة محيط الدائرة .




في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين يجب أن يكون قياسهما 180° درجة .

أي زاويتين متقابلتين قطرياً في شكلٍ رباعي دائري يجب أن يكون قياسهما 180° درجة.




الزاويتين A و C قياسهما 180° درجة.



الزاويتين B و دلتا Δ قياسهما 180° درجة.

الزاوية التي يشكلها قوسٌ عند مركز الدائرة يبلغ قياسها ضعف قياس الزاوية التي يشكلها ذلك القوس على محيط الدائرة.




القوس arc هو جزءٌ من محيط الدائرة .


الوتر Chord مستقيمٌ يصل بين نهايتي قوس و هو لا يمر بمركز الدائرة.


الوتر مستقيمٌ يصل بين نقطتين على محيط الدائرة دون أن يمر بمركز الدائرة و هو يقسم الدائرة إلى قطاعات segments.

قطر الدائرة مستقيمٌ يصل بين نقطتين على محيط الدائرة و يمر بمركز الدائرة.



جميع الزوايا التي يُشكلها الوتر في القطاع الدائري ذاته تكون متساوية في القياس – جميع الزوايا التي تتشكل بين وترين في القطاع ذاته و على القوس ذاتها تكون متساويةً في القياس.






المماس tangent هو خطٌ مستقيم يمس الدائرة عند نقطةٍ واحدة تقع على محيطها .

المماس tangent و نصف القطر radius :

المستقيم المماس لدائرة يكون دائماً متعامداً مع نصف القطر.



يكون المستقيم المماس tangent دائماً متعامداً بزاويةٍ قائمة 90° درجة مع نصف القطر radius الذي يلاقيه عند محيط الدائرة.

يشكل المستقيم المماس tangent دائماً زاويةً قائمة 90° right angle مع نصف القطر.


نظرية القطعة البديلة Alternate segment theorem

الوتر chord خطٌّ مستقيم بين نقطتين على محيط الدائرة لا يمر عبر مركز الدائرة .

أي خطٌّ مستقيم يمتد بين نقطتين على محيط الدائرة دون أن يمر بمركز الدائرة هو وتر.


الزاوية التي يُشكلها وترٌ chord و مماس tangent في أحد قطاعي الدائرة تطابق و تماثل الزاوية التي يُشكلها وترٌ في القطاع الثاني من الدائرة.

الزاوية التي يُشكلها وترٌ و مماس في أحد قطاعي الدائرة تطابق و تماثل الزاوية التي يُشكلها وترٌ في القطاع الثاني من الدائرة.




بشكل أكثر وضوحاً :


الزاوية المحصورة ما بين المستقيم المماس و وتر تساوي الزاوية المحصورة بين الوترين الآخرين في الدائرة.




الزاوية b المحصورة ما بين المستقيم المماس و الوتر 1 تساوي الزاوية a المحصورة بين الوترين الآخرين 2 و 3 في الدائرة.

المستقيمان المماسان Tangent الذين ينطلقان من النقطة ذاتها خارج الدائرة يكون طولهما واحداً.








ينطلق المستقيمات المماسان للدائرة AB و AC من نقطة واحدة هي النقطة A و يمسا الدائرة عند النقطتين B و C و لذلك فإنهما مستقيمان متساويان.

منصف الوتر (وتر الدائرة chord)

عندما ينصف خطٌّ متعامد وتر الزاوية إلى نصفين متساويين فلا بد عندها لذلك المنصف المتعامد perpendicular bisector من أن يصل إلى مركز الدائرة:

إذا مددنا أي مستقيم يتعامد مع وتر دائرة بزاوية 90° درجة و يقسمه إلى قسمين متساويين فلابد لذلك المستقيم من أن يصل إلى مركز الدائرة.




القياسات و النسب المثلثية Trigonometry

نظرية فيثاغورث The Pythagorean Theorem

تصف هذه النظرية العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث الثلاثة القائم الزاوية right triangle فإذا علمنا طول ضلعين من أضلاع مثلثٍ قائم الزاوية أصبح بإمكاننا معرفة طول الضلع الثالث باستخدام هذه النظرية .

و وفقاً لنظرية فيثاغورث فإننا :




مجموع مربعي الضلعين القصيرين في مثلثٍ قائم الزاوية يساوي مربع وتر ذلك المثلث .

و تر المثلث القائم الزاوية hypotenuse هو :

الضلع المائل الوحيد في المثلث القائم الزاوية.

الضلع المقابل للزاوية القائمة 90° درجة.

أطول ضلعٍ في المثلث القائم الزاوية.



يُستخدم الشكل لإثبات صحة نظرية فيثاغورث حيث تمثل مساحة كل مربعٍ من مربعاته مربع ضلعٍ من أضلاع المثلث القائم الزاوية و كما ترون فإن لدينا ثلاثة أضلاع :

ضلعٌ طوله 3 سنتمتر و مربع طوله يبلغ :

$$3^3=3\times3=9 \text{ cm}$$

و قد مثلنا مربع طول هذا الضلع بمربعٍ تبلغ مساحته 9 سنتمترمربع .

ضلعٌ طوله 4 سنتمتر و مربع طوله يبلغ :


$$4^3=4\times4=16 \text{ cm}$$

و قد مثلنا مربع هذا الضلع بمربع تبلغ مساحته 16 سنتمتر مربع.

ضلعٌ طوله 5 سنتمتر و مربع طوله يبلغ :

$$5^3=5\times5=25\ \text{cm}$$

و قد مثلنا مربع هذا الضلع بمربع تبلغ مساحته 25 سنتمتر مربع.



ما هو أطول ضلعٍ في هذا المثلث؟ و ما هو الضلع الوحيد المائل فيه؟ و ما هو الضلع المقابل للزاوية القائمة 90° درجة ؟ أي، أيٌّ من هذه الأضلاع هو وتر هذا المثلث القائم الزاوية؟

إن الضلع الذي يبلغ طوله 5 سنتمتر هو وتر هذا المثلث القائم الزاوية.

$$9+16=25$$


و لذلك فإن طول وتر هذا المثلث يساوي مجموع الجذرين التربيعيين لكلا الضلعين الآخرين:

$$\sqrt{25}=\sqrt{16}+\sqrt{9}$$


أي أن :

$$5=4+3$$

إذاً فإن نظرية فيثاغورث صحيحة لأن الأعداد التي توصلنا لها هي بالفعل أطوال أضلاع هذا المُثلث .



وتر المثلث hypotenuse




مربع طول وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي ضلعيه الآخرين:

$$a^2+b^2=c^2$$


$$3^2+4^2=5^2$$

$$9+16=25$$



إذا علمنا طول ضلعين من أضلاع مثلثٍ قائم الزاوية فإن بإمكاننا باستخدام نظرية فيثاغورث في حساب طول الضلع الثالث.

ليكن لدينا المثلث التالي القائم الزاوية :



كم يبلغ طول الضلع B ؟

وفقاً لنظرية فيثاغورث فإن :

مجموع مربعي ضلعي مثلث قائم الزاوية يُساوي مربع الوتر:

مجموع مربعي ضلعي مُثلث قائم الزاوية A^2+B^2 يُساوي مربع طول الوتر C^2 .

$$A^2+B^2=C^2$$

مربع طول الضلع المجهول B^2 يساوي ناتج طرح مربع الضلع الثالث A^2 من النتيجة (مربع الوتر) C^2 .

لماذا ؟

لأن عملية الطرح هي العملية المعاكسة لعملية الجمع.

$$B^2=C^2-A^2$$

و لكن تذكر دائماً بأن ما نحصل عليه عند تطبيق نظرية فيثاغورث هو مربع طول الوتر و ليس طول الوتر أو مربع طول أي ضلعٍ آخرو ليس طوله و لذلك حتى نحصل على طول الوتر من مربع طول الوتر ، أو طول اي ضلعٍ آخر مجهول من مربعه فإنني نجري عمليةً معاكسة لعملية التربيع و هي عملية التجذير التربيعي √ على الطول المطلوب المرفوع للقوة الثانية:

$$X^2 \neq \sqrt{X}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$11.4^2-9^2=B^2$$

$$130-81=B^2$$

$$130-81=49$$

$$B=\sqrt{49}=7$$

$$B=7\ cm$$

كيف فعلت ذلك ؟

$$A+B=C$$

$$B=C-A$$

تذكر بشكلٍ رقمي :


$$50+25=75$$

$$25=75-50$$


في عملية الجمع فإن أي عنصرٍ مجهول في عملية الجمع (باستثناء ناتج عملية الجمع) يساوي ناتج عملية الجمع ناقص العنصر أو العناصر الأخرى المعلومة.

النسب و القياسات المثلثية Trigonometry

نعني بالقياسات و النسب المثلثية استخدام النسب الثابتة بين أضلاع المثلث القائم الزاوية لإيجاد طول ضلعٍ مجهول أو إيجاد قياس زاوية مجهولة و تعتمد طريقة القياس هذه على تخيل وجود مثلثٍ وهمي قائم الزاوية في الواقع المحيط بنا حتى نتمكن من تطبيق النسب و القياسات المثلثية على أرض الواقع وذلك لإيجاد قياسٍ ما مجهول كما تبين الصورة السفلية حيث تخيلت بأن حبل مرساة السفينة هو وتر مثلثٍ قائم الزاوية و تخيلت بأن قاع البحر هو قاعدة المثلث أو الضلع المجاور للزاوية ،كما تخيلت بأن المسافة العمودية ما بين قاع البحر و نهاية حبل المرساة هو الضلع القائم في المثلث أي الضلع الذي يشكل الزاوية القائمة في المثلث بتعامده مع قاعدة المثلث و هذا الضلع هو الضلع المقابل للزاوية الحرجة.



و في الشكل السفلي تخيلت بأن الشجرة هي الضلع القائم في المثلث بينما الظل الذي تلقيه الشجرة على الأرض هو قاعدة المثلث (الضلع المجاور للزاوية الحرجة) أما البعد الوهمي ما بين أعلى نقطة في الشجرة و آخر نقطة في ظل الشجرة فهو وتر المثلث.



و بذلك يصبح بإمكاننا أن نستخدم النسب و القياسات المثلثية في حساب ارتفاع الشجرة مثلاً أو حساب قياس الزاوية الحرجة او الوتر الوهمي او أي قياسٍ مجهولٍ آخر.

تقوم القياسات المثلثية على مبدأ أن هنالك نسبٌ ثابتة بين أطوال أضلاع المثلث القائم الزاوية و قياس زواياه و أنه يستحيل وجود مثلثٍ قائم الزاوية لا يخضع لهذه النسب تماماً كما أن هنالك نسبةٌ ثابتة ما بين قطر الدائرة و محيطها.

و على سبيل المثال:

إذا كان قياس الزاوية الحرجة (زاوية الوتر) في مثلثٍ قائم الزاوية 37° درجة فإن ارتفاع ذلك المثلث يجب أن يبلغ ثلاثة أرباع قاعدته و هذه النسبة تدعى بالظل tangent و هي قيمةٌ يمكن حسابها على الآلة الحاسبة عن طريق استخدام زر حساب الظل tan ثم إدخال قيمة الزاوية و بذلك فإننا نحصل على ظل تلك الزاوية اي النسبة بين الضلعين المقابل و المجاور (الشجرة و ظلها).

و إذا اعتبرنا بان الشجرة هي الضلع القائم في المثلث القائم (الضلع الذي يشكل الزاوية القائمة 90° درجة و هو الضلع المقابل للزاوية الحرجة) و إذا اعتبرنا بأن ظل الشجرة على الأرض هو قاعدة المثلث و هو الضلع المجاور للزاوية الحرجة فإن :

الظل = الشجرة \ ظلها

$$\text{الظل}\ \tan = \frac{\text{الشجرة}}{\text{ظلها}}$$




$$\text{الظل}\ \tan = \frac{\text{ارتفاع الشجرة}}{\text{ظلها على الأرض}}$$

الظل tan = الضلع القائم / قاعدة المثلث

الظل tan = الضلع القائم في المثلث (الذي يشكل زاوية قائمة) \قاعدة المثلث.

شجرة ارتفاعها مجهول طول ظلها على الأرض 12 متر ، و الزاوية التي تشكلها قمتها مع نهاية ظلها تبلغ 33° درجة ، فكم يبلغ ارتفاعها (طول الضلع القائم في المثلث) .



بدايةً نقوم بحساب ظل tan زاوية هذه الشجرة أي النسبة بين الضلع المقابل للزاوية الحرجة 33° (الضع القائم – الشجرة) و الضلع المجاور للزاوية الحرجة (ظل الشجرة- قاعدة المثلث) و لذلك فإننا نستخدم خاصية حساب الظل tan في الالة الحاسبة :

Tan 33°=0.650

إذاً فإن ظل الزاوية °33 درجة أي النسبة بين الضلعين بالنسبة لزاوية هذا قياسها يبلغ 0.650

الآن لحساب ارتفاع الشجرة فإننا نضرب ظل الزاوية °33 درجة بطول ظل الشجرة (الضلع المجاور للزاوية الحرجة) أي 12 متر :

0.560×12=7.8m

إذاً فإن ارتفاع هذه الشجرة (الضلع القائم أو الضلع المقابل للزاوية الحرجة) يبلغ 7.8 متر. .

للتوصل إلى ارتفاع الشجرة (الضلع المقابل للزاوية الحرجة – الضلع القائم) قمت بضرب ظل الزاوية °33 درجة tan 33° بطول ظل الشجرة (قاعدة المثلث- الضلع المجاور للزاوية الحرجة) .

التاكد من صحة العملية التي قمت بها .

إن ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة) اي 7.80 m متر تقسيم طول ظل الشجرة اي 12 متر يعطي نسبة الظل أي 0.65 أي أن العملية التي قمت بها صحيحة.

تذكر بأن نسبة الظل tan هي النسبة بين طول الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة و قاعدة المثلث اي الضلع المجاور للزاوية الحرجة.

إذا قسمنا ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل للزاوية) على طول ظلها (قاعدة المثلث – الضلع المجاور للزاوية) فإننا نحصل على ظل الزاوية المتعلقة بهذين الضلعين اي ظل الزاوية °33 درجة.

إذا ضربنا نسبة الظل هذه بطول ظل الشجرة (طول قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة) فإننا نحصل على ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل للزاوية).

لا يقتصر استخدام نسبة الظل على قياس ارتفاع الأشجار فالشجرة و ظلها هي مجرد رمز لأي مثلثٍ قائم نجده في الواقع أو نتخيل وجوده .

ارتفاع الشجرة = طول الضلع القائم المقابل للزاوية .

ظل الشجرة = قاعدة المثلث أي الضلع المجاور للزاوية.

ارتفاع الشجرة (الضلع القائم لمقابل للزاوية) \ ظل الشجرة (قاعدة المثلث، الضلع المجاور للزاوية) = ظل الزاوية الحرجة (و هي هنا 33° درجة) tan 33°.

نسبة الظل tan × طول ظل الشجرة= ارتفاع الشجرة (طول الضلع المقابل للزاوية 33°).

لإجراء حسابات الظل tan فإننا نحتاج لمعرفة قياس ضلعين من أضلاع المثلث القائم الزاوية.


يمكننا التوصل إلى ظل الزاوية tan عن طريق قسمة الضلع القائم المقابل للزاوية على قاعدة المثلث (الضلع المجاور للزاوية).

يُمكننا حساب نسبة الظل عن طريق قسمة ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل للزاوية) على ظل الشجرة (قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة).

الظل tan نسبة بين طول ضلعين يمكن للألة الحاسبة أن تحسبها اعتماداً على قياس الزاوية المتعلقة بهذين الضلعين (القائم المقابل للزاوية و قاعدة المثلث المجاورة للزاوية)

tan ظل الزاوية ← نسبة الظل (النسبة بين الضلعين)

يمكننا حساب نسبة الظل tan عن طريق قسمة ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة) على ظل الشجرة (قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة).



وإذا ضربنا نسبة الظل tan بطول الضلع المعلوم (ارتفاع الشجرة أي الضلع القائم المقابل للزاوية) أو ظل الشجرة (قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة) فإننا نحصل على طول

الضلع المجهول سواءً أكان ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل) أو ظل الشجرة (قاعدة المثلث المجاورة للزاوية) .

الجيب (ساين) Sine


الجيب هو النسبة ما بين ارتفاع الشجرة (الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة) و بين الخط الوهمي الواصل ما بين قمة الشجرة و نهاية ظلها المُلقى على اللأرض (وتر المثلث).

يمثل ارتفاع الشجرة الضلع القائم الذي يشكل مع قاعدة المثلث زاويةً قائمة 90° ، كما أنه الضلع المقابل للزاوية الحرجة .

أما خط النظر الوهمي (وتر المثلث الوهمي) فهو الخط الوهمي الذي يمتد من قمة الشجرة إلى نهاية ظل الشجرة الملقى على الأرض (قاعدة المثلث) .

و كما مر معنا فإن **الظل tan (ظل الزاوية a) يساوي ارتفاع الشجرة \ ظل الشجرة**

أي الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة مقسوماً على قاعدة المثلث المجاورة adjacent للزاوية الحرجة.




جيب الزاوية sine و اختصاره على الالة الحاسبة sin و هو يساوي الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة مقسوماً على الوتر ، أي أنه يساوي ارتفاع الشجرة مقسوماً على طول الخط الوهمي الممتد ما بين قمة الشجرة و نهاية ظلها الملقى على الأرض.

$$\text{Sine } a = \frac{\text{Opposite}}{\text{hypotenuse}}$$

جيب الزاوية = الضلع القائم المقابل للزاوية / الوتر

جيب الزاوية = ارتفاع الشجرة / الخط الوهمي الممتد من أعلى الشجرة إلى نهاية ظلها

نســبة الجيــب



التجيب Cosine كوساين

تجيب الزاوية Cosine و اختصاره على الالة الحاسبة cos و هو يساوي قاعدة المثلث أي الضلع المجاور للزاوية الحرجة مقسوماً على الوتر ، أي انه يساوي ظل الشجرة مقسوماً على طول الخط الوهمي الممتد ما بين قمة الشجرة و نهاية ظلها الملقى على الأرض.

$$\text{Cosine a} = \frac{adjacent}{\text{hypotenuse}}$$

تجيب الزاوية = القاعدة المجاورة للزاوية / الوتر

تجيب الزاوية = ظل الشجرة / الخط الوهمي الممتد من أعلى الشجرة إلى نهاية ظلها

الظل

$$\text{tan a} = \frac{opposite}{\text{adjacent}}$$

ظل الزاوية = الضلع القائم المقابل للزاوية / القاعدة المجاورة للزاوية

ظل الزاوية = الشجرة / ظل الشجرة



لن تنسى ابداً النسب المثلثية و لن تخلط بينها

سوف نبدأ بنسبة الظل

الظل

$$\tan a = \frac{opposite}{adjacent}$$

ظل الزاوية = الضلع القائم المقابل للزاوية / القاعدة المجاورة للزاوية

ظل الزاوية = الشجرة / ظل الشجرة

كما ترون فإن :

نسبة الظل لا تحوي على وتر

بسط نسبة الظل أي الضلع القائم المقابل للزاوية هو بسط نسبة الجيب .

مقام نسبة الظل أي (القاعدة المجاورة للزاوية) هو بسط نسبة التجيب.

مقام كلٌ من الجيب و التجيب هو الوتر.

حتى لا تنسى نسبة الظل:

بسط نسبة الظل أي أعلى نسبة الظل هو ارتفاع الشجرة.


مقام نسبة الظل أي أسفل الكسر هو ظل الشجرة الملقى على الأرض.

نسبة الظل لا تحوي على خط نظر وهمي ما بين أعلى الشجرة و آخر ظلها الملقى على الأرض.

بسط نسبة الظل (أعلاها) أي الشجرة أو ارتفاع الشجرة هو بسط نسبة الجيب .

مقام نسبة الظل أي أدناها أي (ظل الشجرة الملقى على الأرض) هو بسط نسبة التجيب.

مقام كلٌ من الجيب و التجيب هو الوتر.



$$\text{Sine a} = \frac{\textbf{Opposite}}{\textbf{hypotenuse}}$$

$$\textbf{جيب الزاوية} = \frac{\text{الضلع القائم المقابل للزاوية}}{\text{الوتر}}$$

$$\textbf{جيب الزاوية} = \frac{\text{ارتفاع الشجرة}}{\text{الخط الوهمي الممتد من أعلى الشجرة إلى نهاية ظلها}}$$

التجيب:

$$\text{Cosine a} = \frac{\textbf{\textit{adjacent}}}{\textbf{hypotenuse}}$$

$$\textbf{تجيب الزاوية} = \frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{الوتر}}$$

$$\textbf{تجيب الزاوية} = \frac{\text{ظل الشجرة}}{\text{الخط الوهمي الممتد من أعلى الشجرة إلى نهاية ظلها}}$$



يجب أن يكون جيب الزاوية sine دائماً أقل من واحد 1 (أو واحد) .

يجب أن يكون تجيب الزاوية cosine دائماً أقل من واحد 1(أو واحد).

لماذا؟

كما مر معنا فإن :

مقام كلٌ من الجيب و التجيب هو الوتر.

أي أننا في كلا هاتين النسبتين نقسم طول أحد ضلعي المثلث على الوتر و كما مر معنا سابقاً فإن الوتر هو أطول أضلاع المثلث القائم اي أننا في كل من الجيب و التجيب نقسم مقداراً ما على مقدارٍ هو بالتأكيد أكبر منه أي أننا نقسم رقماً على رقمٍ أكبر منه و في هذه الحالة يجب حتماً أن تكون النتيجة أقل من العدد واحد 1 أو مُساوية له في بعض الحالات.

و لكن هنالك حالات يكون فيها الجيب و التجيب مساويين للعدد واحد 1 :

$$\text{Sine}\ (90°)=1$$

جيب الزاوية 90° درجة يساوي واحد 1 .

$$\text{Cos}\ (0°)=1$$

تجيب الزاوية صفر درجة يُساوي واحد 1 .

تتراوح قيمتي الجيب و التجيب ما بين القيمة السلبية ناقص واحد -1

و القيمة الموجبة زائد واحد +1 .

بينما يُمكن لظل الزاوية Tangent أن تكون أي قيمة لأنها لا تتضمن قسمة عدد على عددٍ أكبر منه لأن مقام نسبة الظل ليس الوتر الذي هو بالطبع أطول أضلاع المثلث القائم الزاوية بل إن مقام نسبة الظل هو الضلع المجاور للزاوية الحرجة (ظل الشجرة).

مثال :

$$\text{Tan}(60°)\approx 1.73$$

حساب النسب المثلثية على الآلة الحاسبة

نضغط زر حساب النسبة المثلثية المطلوب حسابها (ظل ، جيب ، تجيب).

Sin,cos,tan

ندخل قياس الزاوية المطلوب حساب ظلها أو جيبها أو تجيبها.

نضغط زر المساواة.

النسب المثلثية هي نسبٌ ثابتة في المثلث القائم الزاوية بين أضلاعه المختلفة.

إذا قسمنا طول ضلعين على بعضهما البعض كما مر معنا سابقاً فإننا نحصل على النسبة المثلثية المتعلقة بهما.

لكل زاويةٍ في مثلثٍ قائم الزاوية كذلك نسبة مثلثية تبين لنا العلاقة و النسبة بين ضلعين في مثلثٍ قائم الزاوية وفق النسب المثلثية التي مرت معنا إذ لا يُمكن لزاويةٍ في مثلثٍ قائم الزاوية أن تتشكل بهذا القياس الذي هي عليه إلا إذا كانت النسبة بين طولي ضلعيها نسبة معينة و لذلك فإننا عندما نحسب ظل او جيب أو تجيب زاوية معينة فإننا في الحقيقة نحسب النسبة بين طولي الضلعين المتعلقين بتلك الزاوية وفق النسب المثلثية التي مرت معنا سابقاً.


تستخدم النسب المثلثية السابقة في حساب طول ضلعٍ مجهول أو قياس زاوية مجهولة في مثلثٍ قائم الزاوية مع ضرورة الانتباه إلى استخدام النسب المثلثية الصحيحة .

إن اختيار النسبة المثلثية الصحيحة (ظل، جيب، تجيب) التي يتوجب استخدامها في حل معضلةٍ ما يعني أن نختار نسبة مثلثية تحوي كلاً من البيانات المعلومة و البيانات المجهولة المطلوب حسابها.

مثال تطبيقي :

كم يبلغ طول الضلع المجاور Adjacent (للزاوية الحرجة) في المثلث القائم الزاوية أدناه إذا كان طول الوتر 10 سنتمتر و إذا كان قياس الزاوية الحرجة 35° درجة؟

رسم توضيحي لم يتم ضبط قياساته.



لاختيار النسبة المثلثية المناسبة التي يتوجب استخدامها فإن علينا اختيار نسبة مثلثية تحوي كلاً من البيانات المعلومة (طول الوتر و قياس الزاوية الحرجة) و البيانات المجهولة المطلوب إيجادها (طول قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة 35°) .


كما ترون فإن المسألة تتضمن ضلعاً معلوماً (وتر(hypotenuse) قياسه 10 سنتمتر و ضلعٌ مجهول مطلوبٌ معرفة قياسه و هو الضلع المجاور Adjacent (الضلع المجاور و الملاصق للزاوية الحرجة) ، فما هي النسبة المثلثية التي تحوي ضلعاً مجاوراً و ملاصقاً للزاوية الحرجة و وتر؟

إنها بالطبع نسبة التجيب .

$$\text{Cosine a} = \frac{adjacent}{hypotenuse}$$

$$\text{تجيب الزاوية} = \frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{الوتر}}$$

$$\text{تجيب الزاوية} = \frac{\text{ظل الشجرة}}{\text{الخط الوهمي الممتد من أعلى الشجرة إلى نهاية ظلها}}$$



ظل الشجرة الملقى على الأرض يمثله الضلع المجاور للزاوية الحرجة.

$$\text{Cosine a} = \frac{adjacent}{hypotenuse}$$

تجيب الزاوية = $\frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{الوتر}}$

نعيد ترتيب معادلة حساب التجيب بحيث نجعل المجهول المطلوب حسابه (قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة adj) هو موضوع المعادلة و ناتجها لتصبح صيغة حساب التجيب على الصورة التالية :

$$\text{Cosine a} = \frac{\textit{adjacent}}{\text{hypotenuse}}$$

تجيب الزاوية = $\frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{الوتر}}$

Adjacent= cos a ×hypotenuse

قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة = تجيب الزاوية × طول الوتر

كيف تمكنت من قلب الصيغة بهذا الشكل :

تذكر دائماً هذه العملية البسيطة و سوف تساعدك في فهم طريقة قلب النسب في الرياضيات و الفيزياء :

$$50 = \frac{100}{2}$$

$$100 = 50 \times 2$$

$$\text{Cosine a} = \frac{\textit{adjacent}}{\textbf{hypotenuse}}$$

تجيب الزاوية = القاعدة المجاورة للزاوية / الوتر

$$50 = \frac{100}{2}$$

$$\text{Cosine a } 50 = \frac{\textit{adjacent } 100}{\textbf{hypotenuse } 2}$$

$$\text{Adjacent } 100 = \cos a \ 50 \times \text{hypotenuse } 2$$

$$\text{Adjacent} = \cos a \times \text{hypotenuse}$$

قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة = تجيب الزاوية × طول الوتر

إذاً لحل المسألة فإننا نحتاج لحساب تجيب الزاوية الحرجة ، انتبه جيداً إلى أن 35° هو قياس الزاوية و ليس تجيبها.

لمعرفة تجيب الزاوية نضغط زر حساب التجيب cos و ندخل قياس الزاوية :

Cos 35° =0.8191520443

الأن بعد أن علمنا تجيب الزاوية فإننا نستبدل رموز صيغة حساب التجيب بالقيم الرقمية :

Adjacent= cos a ×hypotenuse

قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة = تجيب الزاوية × طول الوتر

Adjacent= cos 35° ×10=8.19 cm

إذاً فإن طول قاعدة المثلث المجاورة و الملاصقة للزاوية الحرجة يبلغ 8.19 cm سنتمتر.

بدلاً من إدخال قيمة تجيب الزاوية 0.8191520443 يمكننا أن ندخل للحاسبة (تجيب الزاوية 35°) cos 35 و عندها ستفهم الحاسبة ما نريده و سيكون الأمر أكثر سهولة و أكثر دقة و سرعة.


و هذا الأمر ينطبق بالطبع على جميع النسب المثلثية.

استخدام النسب المثلثية لإيجاد قياس زاوية
لمعرفة قياس زاوية مجهولة في مثلثٍ قائم الزاوية

لمعرفة قياس زاوية مجهولة في مثلثٍ قائم الزاوية فإننا نحتاج لمعرفة طول ضلعين و ذلك عن طريق حساب نسبتهما المثلثية اي نسبتهما إلى بعضهما البعض و بعد ذلك فإننا نستخدم الحاسبة لتحويل النسبة المثلثية تلك إلى قياس زاوية.

مثال :

ما هو قياس الزاوية الحرجة a في المثلث أدناه ؟



لدينا ضلعين معلومين و هما الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة ، و لدينا ضلعٌ معلومٌ آخر و هو قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة و طوله 6 سنتمتر، و المطلوب حساب الزاوية a .

بما أن لدي ضلعين معلومين هما الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة و القاعدة المجاورة للزاوية الحرجة فإنني استخدم نسبة الظل tan ، أي ظل الزاوية a .

$$\tan a = \frac{\textit{opposite}}{\text{adjacent}}$$

$$\text{ظل الزاوية} = \frac{\text{الضلع القائم المقابل للزاوية}}{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}$$

$$\text{ظل الزاوية} = \frac{\text{ارتفاع الشجرة}}{\text{ظل الشجرة}}$$

و بالتالي فإن ظل الزاوية a يساوي :

$$\frac{6}{12} = 0.5$$

ماذا أفعل بنسبة الظل هذه؟

إنني سوف أستخدم نسبة الظل العكسي inverse tangent لإيجاد قياس الزاوية الحرجة .

زر إيجاد الظل العكسي في الحاسبة هو الزر $\tan^{-1}$ أي زر الظل المرفوع للقوة السلبية الأولى :

$$\tan^{-1} 0.5 = 26.6°$$

إذاً فإن قياس الزاوية a يبلغ 26.6° درجة .

الآن ماذا لو قمنا بقسمة الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة على قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة (نسبة الظل) ؟

$$\tan a = \frac{opposite}{adjacent}$$

$$\tan a = \frac{6}{12} = 6 \div 12 = 0.5$$

$\tan 26.6 = 0.5$

كما ترون فإن النتيجة واحدة.

إذاً

إذا قسمنا طول ضلعين على بعضهما البعض فإن الناتج يكون نسبة مثلثية حسب الضلعين الذين قسمناهما على بعضهما البعض و هي هنا نسبة الظل :

$6 \div 1 = 0.5$

تقوم وظيفة الظل العكسي $\tan^{-1}$ بتحويل النسبة المثلثية بين ضلعين إلى قياس زاوية.

$\tan^{-1}(0.5) = 26.6°$

لتحويل قياس زاوية إلى نسبة مثلثية فإننا نستخدم وظيفة حساب النسب المثلثية.

ظل الزاوية 26.6° درجة تساوي :

$$\text{Tan } 26.6 = 0.5$$

هنالك جيب عكسي $\sin^{-1}$ (inverse sine) و تجيبٌ عكسي $\cos^{-1}$ (inverse cosine) و ظلٌ عكسي $\tan^{-1}$ (inverse tan) و هي تستخدم لحساب قياس الزاوية اعتماداً على النسبة بين الضلعين المتعلقين بها أي النسبة المثلثية .

تقوم النسب المثلثية العكسية المرفوعة للقوة السلبية الأولى بتحويل النسبة المثلثية بين ضلعين إلى قياس زاوية بالدرجة.

تقوم أزرار النسب المثلثية بتحويل قياس الزاوية إلى نسبة مثلثية بين الضلعين المتعلقين بتلك الزاوية.

لإيجاد أزرار النسب المثلثية العكسية في حاسبات الهواتف الذكية و الكمبيوترات فإننا نستخدم زر التبديل للوظائف العكسية Inv و هو اختصار كلمة inverse

(عكسي) أو زر التبديل للمستوى الثاني 2nd .

يمكن معرفة طول ضلعٍ مجهول باستخدام النسب المثلثية بالاعتماد على طول ضلعٍ وقياس زاوية معلومين .

يمكننا معرفة قياس زاوية مجهولة في مثلثٍ قائم الزاوية إذا علمنا طول ضلعين فيه.

تستخدم الوظائف العكسية (عكس الظل، عكس الجيب، عكس التجيب) جيب عكسي $\sin^{-1}$ و تجيبٌ عكسي cos-1 ، و ظلٌ عكسي tan-1 لإيجاد القيم المعاكسة للنسب المثلثية أي قلب النسبة المثلثية إلى قياس زاوية.

تقوم أزرار حساب النسب المثلثية بتحويل قياس الزاوية إلى نسبٍ بين ضلعين بينما تقوم النسب المثلثية العكسية -1 بتحويل النسبة المثلثية إلى قياس زاوية.


قسمة ضلعي مثلث قائم تعطي نسبة مثلثية حسب هذين الضلعين.

يقوم زر حساب النسبة المثلثية العكسية المرفوع للقوة السلبية ناقص واحد -1 بتحويل النسبة المثلثية إلى قياس زاوية أي أنه يقوم بتحويل النسبة المثلثية إلى درجة.

يقوم زر حساب النسبة المثلثية بتحويل قياس زاوية إلى نسبة مثلثية :

Tan 26.6°=0.5

يمكننا استخدام نظرية فيثاغورث مربع طول الوتر=مجموع مربعي طولي ضلعيه الآخرين و النسب المثلثية الأخرى في حساب قياسات زوايا و أضلاع المثلثات المتساوية الساقين كذلك على اعتبار أن المثلث المتساوي الساقين يتألف من مثلثين قائمي الزاوية.




حيث يُمكننا أن ننظر إلى المثلث المتساوي الساقين على أنه عبارة عن مثلثين قائمي الزاوية ، و على سبيل المثال فإن ارتفاع h المثلث المتساوي الساقين يساوي مربع طول الوتر a^2 ناقص مربع طول القاعدة c^2 أو ما يماثلها في المثلث الثاني

لماذا؟

لأنه حسب فيثاغورث فإن مربع طول وتر مثلث قائم الزاوية a^2 يساوي مجموع مربعي طول ضلعيه الآخرين b^2+c^2 :

$$a^2=b^2+c^2$$




لاحظ أن ارتفاع المثلث المتساوي الساقين هو ذاته الضلع القائم في المثلثين القائمي الزاوية الذين يشكلان المثلث المتساوي الساقين.

الضلع القائم هو الضلع العمودي الذي يُشكل مع القاعدة زاوية قائمة °90 درجة .

لتحويل رقمٍ مرفوعٍ للقوة الثانية إلى رقمٍ اعتيادي غير مرفوعٍ لقوة فإننا نجري عمليةً معاكسة لعملية التربيع (الرفع للقوة الثانية) و هي عملية التجذير التربيعي.

في القياسات المثلثية نستخدم الأحرف اللاتينية الصغرى lower case للإشارة إلى اضلاع المثلث بينما نستخدم الأحرف الكبرى uppercase للإشارة إلى الزوايا المقابلة لتلك الأضلاع .


في القياسات المثلثية نستخدم الأحرف اللاتينية الصغرى للإشارة إلى أضلاع المثلث بينما نستخدم الأحرف الكبرى للإشارة إلى الزوايا المقابلة لتلك الأضلاع .




$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\frac{a}{\text{جيب}A} = \frac{b}{\text{جيب}B} = \frac{c}{\text{جيب}C}$$

$\frac{c}{\text{جيب } C}$ تساوي $\frac{b}{\text{جيب } B}$ تساوي $\frac{a}{\text{جيب } A}$





كم يبلغ طول الضلع a؟

نحن نعرف بأن قياس الزاوية A يبلغ 37° درجة و أن قياس الزاوية B يبلغ 80° درجة و أن طول الضلع b يبلغ 13 سنتمتر و لذلك فإننا نستخدم المتناسبة السابقة :

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

نحتاج لاستخدام أول نسبتين فقط من هذه المتناسبة :

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

نعيد ترتيب المتناسبة السابقة بحيث نجعل من المطلوب المجهول a نتيجةً لها و ذلك بأن نضرب بشكلٍ قطري (مائل) الحدين الآخرين و نقسمهما على الحد الثالث:

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

$$a=\frac{b\times \sin A}{\sin B}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$B=13$

$Sin\ A=\sin 37°=0.601$

Sin B=sin 80°=0.98


$$a=\frac{13\times 0.601}{0.98}=7.9$$

حتى لا تنسى :

في متناسبة جيب النسب المثلثية : نقسم كل ضلعٍ من أضلاع المثلث أياً كان نوعه على جيب الزاوية المقابلة له.


نستخدم من المتناسبة السابقة ما يناسبنا من قيم ، أي المتناسبة التي تحوي القيم المتوفرة و القيم المطلوب إيجادها و نستبعد النسبة التي لا تهمنا من هذه النسب الثلاثة أي أننا نستخدم نسبتين كسريتين من ثلاثة نسب و في النهاية فإننا نحصل على متناسبةٍ تحوي 4 أطراف أحدها مجهول.

نبدأ المتناسبة ابتداءً من الزاوية اليسرى A فالزاوية العليا B فالزاوية اليمنى C



نبدأ المتناسبة ابتداءً من الزاوية اليسرى A فالزاوية العليا B فالزاوية اليمنى C

نجعل من العنصر المجهول المطلوب إيجاده ناتجاً للمتناسبة فتتبقى لدينا أربعة حدود ، نضرب القيمتين المعلومتين المتقابلتين قطرياً (بزاوية مائلة) ببعضهما البعض ثم نقسم على القيمة الثالثة المعلومة .




كل ضلعٍ من أضلاع المثلث أياً كان نوعه يتناسب مع جيب الزاويةٍ المقابلة له.



إن حقيقة أن كل ضلعٍ من أضلاع المثلث يتناسب مع جيب الزاوية المقابلة له تنطبق علًى كل مثلث أياً كان نوعه.

حساب الزاوية المجهولة

إذا علمنا قياس ضلعين و زاوية غير محصورة بينهما فإننا نستخدم نسبة الجيب *sin* لحساب الزاوية المجهولة.



ما هو قياس الزاوية C ؟

لحل هذه المسألة فإننا نستخدم الأجزاء التي تهمنا من المتناسبة السابقة :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

نحتاج لاستخدام ثاني نسبتين فقط من هذه المتناسبة :

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

لماذا؟

لأنـهما تضمان كلاً من القيم المعلومة و القيمة المجهولة التي طُلب منا القيام بحسابها.

$$\frac{b}{sin\ B} = \frac{c}{\sin C}$$

نعيد ترتيب المتناسبة السابقة بحيث نجعل من المطلوب المجهول أي قياس الزاوية C نتيجةً لها و ذلك بأن نضرب بشكلٍ قطري (مائل) الحدين الآخرين المعلومين اي C و sin B نقسمهما على الحد الثالث المعلوم b:

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Sin B=sin 100°=0.98

$$sin\ C = \frac{\sin B \times C}{b}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$\sin C = \frac{8 \times 0.98}{10} = 0.79$$


انتبه جيداً إلى أن *0.79* هو جيب الزاوية *C* و ليس قياس الزاوية *C* بينما المطلوب هو قياس الزاوية بالدرجة و ليس جيبها .

لإيجاد قياس زاوية اعتماداً على جيبها فإننا نستخدم الخاصية المعاكسة لخاصية الجيب اي الجيب المرفوع للقوة السلبية الأولى $\sin^{-1}$


sin-1

$$\sin^{-1} 0.79 = \operatorname{asin} 0.79 = 52°$$

إذاً فإن قياس الزاوية C يبلغ 52° درجة .



نبدأ المتناسبة ابتداءً من الزاوية اليسرى A فالزاوية العليا B فالزاوية اليمنى C



إذاً لا يقتصر استخدام نسبة الجيب على المثلثات القائمة أي المثلثات التي تحوي زاويةً قائمة 90° درجة.

مساحة المثلث

الطريقة السائدة لحساب مساحة المثلث تتمثل في ضرب طول قاعدته بارتفاعه و قسمة الناتج على 2 .

غير أنه يمكننا استخدام النسب المثلثية إيجاد مساحة مثلث .

لإيجاد مساحة مثلث باستخدام النسب المثلثية يتوجب علينا أن نعرف طول ضلعين من أضلاعه و قياس زاويةٍ محصورةٍ بينهما .


الصيغة التالية تصلح لمعرفة مساحة أي مثلثٍ نعرف طول ضلعين من أضلاعه و قياس الزاوية المحصورة بينهما:


$$area = \frac{1}{2}\, ab \sin C$$

$$area = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin C$$


مساحة المثلث = نصف ضرب ناتج ضرب ضلعين من أضلاعه بجيب الزاوية المحصورة بينهما.

مساحة المثلث = نصف $\frac{1}{2}$ ضرب ناتج ضرب ضلعين من أضلاعه $a \times b$ بجيب الزاوية المحصورة بينهما $\sin C$.





ما هي مساحة المثلث ABC ؟



ما هي مساحة المثلث ABC ؟

مساحة المثلث = نصف $\frac{1}{2}$ ضرب ناتج ضرب ضلعين من أضلاعه a×b بجيب الزاوية المحصورة بينهما sin C .

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$area = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 \times \sin A$$

Sin 70=0.939

$$area = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 \times 0.939 = 45\ cm^2$$

مساحة هذا المثلث تبلغ 45 سنتمتر مربع.

في حال لم يكن المثلث قائم الزاوية و كان علينا أن نستخدم نظرية فيثاغورث أو النسب المثلثية فإننا نقوم بقسمة هذا المثلث إلى مثلثين قائمي الزاوية و عندها سوف يكون بإمكاننا أن نستخدم النسب المثلثية و نظرية فيثاغورث.

دائماً عندما يُطلب منا حساب قياس طول شيءٍ ما أو حساب قياس زواياه فإننا نتخيل ذلك الشيء أو ذلك الموقع كمثلثٍ قائم الزاوية .

و إذا طُلب مني أن أحسب طول وتر مثلثٍ قائم الزاوية أو أي ضلعٍ مجهول في مثلثٍ قائم الزاوية فإنني أستخدم نظرية فيثاغورث :

مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طول ضلعي المثلث الآخرين، **فإذا كنت أعلم طول ضلعين من أضلاع مثلثٍ قائم الزاوية و أردت أن أحسب طول وتره فإنني أقوم بتربيع طول هذين الضلعين ، أي أنني أقوم برفعهما للقوة الثانية .**

فإذا كان طول الضلع الأول 20 سنتمتر مثلاً و كان طول الضلع الثاني 30 سنتمتر مثلاً فإن طول وتر هذا المثلث يساوي :


$$20^2+30^2=1300$$

و لكن علينا الانتباه إلى أن **النتيجة في مثل هذه الحالة تمثل مربع طول الوتر و ليس طول الوتر.**

لحساب طول الوتر و ليس مربعه فإنني أجري عمليةً معاكسة لعملية الرفع للقوة الثانية و هي عملية التجذير التربيعي و التي هي عملية تجريدٍ للرقم من القوة الثانية المرفوع إليها :

$$\sqrt{1300} = 36$$


إذاً فإن طول وتر هذا المثلث يبلغ 36 سنتمتر .




$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$30^2 + 40^2 = c^2$$
$$900 + 1{,}600 = c^2$$
$$2{,}500 = c^2$$
$$50 = c$$

لا يقتصر استخدام نظرية فيثاغورث على حساب طول الوتر إذ أن بإمكاننا استخدامها لحساب مربع طول أي ضلعٍ مجهول من أضلاع مثلثٍ قائم الزاوية إذا علمنا طول الضلعين الآخرين لأن صيغة فيثاغورث هي عملية جمعٍ عادية يمكننا قلبها إلى عملية طرح إذا كان ناتجها معلوماً فنطرح عنصراً معلوماً من النتيجة فنحصل على مربع طول العنصر المجهول.

إذا كان لدينا مثلثٌ غير قائم الزاوية و و أردنا استخدام نظرية فيثاغورث أو النسب المثلثية فإننا نقسم ذلك المثلث إلى مثلثين قائمي الزاوية .




AT TA'MIM
Bayjī
Tozkhurmato
Tikrit
SALAH AD DIN
Buhayrat ath Tharthār
Buhayrat al Qādisīyah
Al Ḩaqlānīyah
Sāmarrā'
Balad
Buhayrat Diyālā
Khānaqīn
Jalūlā'
Qasr-e Shirin
Pol-e Zahab
Al Manşūrīyah
Al Khāliş
Ba'qūbah
DIYALA
Mandalī
Euphrates
Tigris
At Tājī
Al Ḩabbānīyah
Ar Ramādī
Al Fallūjah
BAGHDAD
Buhayrat al Habbānīyah
Salmān Pāk
Badrah
Al Iskandarīyah
Al Musayyib
BABIL
Buhayrat ar Razāzah
Al Hindīyah
Karbalā'
Al Ḩillah
WASIT
An Nu'manīyah
Al Kūt
Nahr Diyālā
Aq Su
Nahr Rukhānah
Nahr al 'Uzaym
Buhayrat Darbandikhan
Halabj
Khurm



دهوك
الموصل
اربيل
السليمانية
كركوك
تكريت
سامراء
بعقوبة
بغداد
الرمادي
الكوت
الحلة
كربلاء
العمارة
النجف
الناصرية
السماوة
البصرة
العراق
المثلث السني
مثلث الموت

مثلث برمودا





ENCLOSURE #1 SMALL AREA CHART SHOWING OVER WATER DAY NAVIGATION PROBLEM




إذا كان لدينا مثلثٌ غير قائم الزاوية و و أردنا استخدام نظرية فيثاغورث أو النسب المثلثية فإننا نقسم ذلك المثلث إلى مثلثين قائمي الزاوية .

°

كم يبلغ طول المنحدر t في الشكل أدناه ؟

يمثل المنحدر t وتر مثلثٍ قائم الزاوية (مجهول) ، بينما لدينا الارتفاع a المقابل للزاوية الحرجة A و الذي يشكل في المثلث القائم الزاوية الضلع القائم (الذي يشكل زاوية قائمة 90°) المقابل للزاوية الحرجة A .

لحل هذه المسألة فإنني أختار نسبةً مثلثية تتضمن قيمةً معلومة : الضلع القائم المقابل للزاوية الحرجة A ، و قيمةً مجهولة مطلوب إيجادها و هي وتر المثلث الذي يمثل المنحدر ، و لذلك فإنني سوف استخدم نسبة الجيب sin :



$$\text{Sine a} = \frac{\text{Opposite}}{\text{hypotenuse}}$$

جيب الزاوية = $\frac{\text{الضلع القائم المقابل للزاوية}}{\text{الوتر}}$

جيب الزاوية = $\frac{\text{ارتفاع الشجرة}}{\text{الخط الوهمي الممتد من أعلى الشجرة إلى نهاية ظلها}}$

أعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$\text{Sine } 42° = \frac{40}{\text{hypotenuse}}$$

حتى أتمكن من حل هذه النسبة أقوم بعزل المجهول في خانة النتيجة لأنه لا فائدة من القسمة على قيمةٍ مجهولة فأحصل على النسبة التالية :

$$\text{hypotenuse} = \frac{40}{\text{Sine } 42°}$$

$$\text{الوتر} = \frac{40}{\text{جيب الزاوية}\,42°}$$

$$\text{Sin } 42° = 0.67$$

$$\frac{40}{\text{جيب الزاوية}\,42°} = 59 \text{ m}$$

إذاً فإن طول وتر المثلث أو طول المنحدر يبلغ 59 متر.

كيف قلبت النسبة السابقة بذلك الشكل و ضمنت بأن علاقتها المنطقية لن تتخلخل جراء ذلك القلب؟

$$\text{Sine } 42° = \frac{40}{\text{hypotenuse}}$$

دوماً أقوم بإنشاء ميزان رقمي لكل علاقة يُبين لي كيف يُمكنني أن أقلب العلاقة دون أن يختل بنائها المنطقي.

الميزان الرقمي للعلاقة السابقة :

$$50 = \frac{100}{2}$$

$$\text{Sine } 42°(50) = \frac{40(100)}{\text{hypotenuse}(2)}$$

$$\text{hypotenuse}(2) = \frac{40(100)}{\text{Sine } 42°\ (50)}$$

$$2 = \frac{100}{50}$$

$$\text{hypotenuse }(50) = \frac{40}{\text{Sine } 42°}$$

$$\text{hypotenuse} = \frac{40}{\text{Sine } 42°}$$

أتمنى أن تكون فكرة الميزان الرقمي قد وضحت لكم فهي على بساطتها شديدة الخطورة و الأهمية في الرياضيات و الفيزياء لأنها تُمكننا من معرفة كيفية قلب المعادلات دون أ يختل بناؤها المنطقي.

زاوية و خط النظر

خط النظر الأفقي horizontal line of sight

خط نظر المراقب الأفقي the observer's horizontal line of sight


The angle of depression زاوية الانخفاض :

هي الزاوية المحصورة ما بين خط نظر المراقب الأفقي و بين جسمٍ منظورٍ أو نقطة منظورة في الأسفل .

Angle of elevation زاوية الارتفاع : هي زاوية الرؤية العلوية ما بين المشاهد و جسمٌ علوي.

فإذا كان لدينا شخصٌ يقف على مرتفع فإن الخط الأفقي الذي يمتد أمامه هو خط النظر الأفقي

Horizontal line of sight



خط النظر بالنسبة لشخصٍ ينظر للشجرة من الأسفل.

لاحظ كيف **يشكل خط النظر وتراً لمثلثٍ قائم الزاوية بينما تشكل الشجرة الضلع القائم المتعامد مع قاعدة المثلث و المقابل للزاوية الحرجة.**




FIGURE 3.




FIGURE 3.


الزاوية التي تقع فوق خط النظر الأفقي تدعى بزاوية الارتفاع Angle of elevation ، أما الزاوية التي تقع تحت خط النظر فتدعى بزاوية الانخفاض   angle of depression .

زاوية الارتفاع هي الزاوية المحصورة ما بين خط النظر الأفقي و بين الجسم الذي نراه في الأعلى ، أما زاوية الانخفاض فهي الزاوية المحصورة ما بين خط النظر الأفقي و الجسم الذي نراه في الأسفل.

نتخيل بأن كلاً من خط النظر الصاعد و الهابط عبارة عن ضلعي مثلث ، أما خط النظر الأفقي فهو عبارةٌ عن خطٍ يقسم المثلث إلى مثلثين قائمي الزاوية ، و بالتالي فإن كلاً من خط النظر الصاعد و خط النظر الهابط عبارة عن وتري مثلثين قائمي الزاوية و وبذلك يصبح بإمكاننا استخدام النسب المثلثية لتحديد طولي هذين الوترين ، أي تحديد المسافة بيننا و بين شيءٍ نراه في الأعلى (طائرة مثلاً أو طائر) و شيءُ نراه في الأسفل .


كم يبعد الجسم الذي نراه في الأعلى (المسافة هي وتر المثلث العلوي) إذا كانت زاوية الارتفاع 30° درجة ، و كم يبعد الجسم في الأسفل إذا كانت زاوية الانخفاض 40° درجة ، و ذلك إذا كان خط النظر الأفقي (قاعدة المثلث و الضلع المجاور للزاوية الحرجة) يبلغ طوله 75 متر .

في مسائل النسب المثلثية ليس ضرورياً أن يكون هنالك مثلثٌ حقيقي ، فنحن نتخيل وجود مثلثٍ خيالي imagined triangle و نطبق النسب المثلثية على ذلك المثلث الافتراضي ، كما هي الحال في الشجرة و ظلها التي مرت معنا سابقاً .



و إذا تخيلنا بأن بأن خطي النظر العلوي و السفلي يشكلان وترين لمثلثين قائمي الزاوية يُصبح بإمكاننا استخدام النسب المثلثية لإيجاد البعد ما بين المراقب و الجسمين الذين يرصدهما في الأعلى و الأسفل.

كم يبعد الجسم الذي يراه المراقب في الأعلى و الجسم الذي يراه في الأسفل عن المشاهد أو المراقب إذا كانت المسافة الأفقية ما بين المراقب و النقطة الأفقية التي تقع مباشرةً ما بين الجسم الذي يراه في الأعلى و الجسم الذي يراه في الأسفل 300 متر؟



نحن نعلم طول الضلع المجاور للزاوية الحرجة و الذي يبلغ 300 متر و المطلوب منا هو حساب طول خطي النظر العلوي و السفلي (الوترين) فما هي النسبة المثلثية المناسبة ؟

لدينا في هذه المسألة ضلعٌ مجاورٌ للزاوية الحرجة و وتر (مجاورٌ معلوم و وترٌ مجهول) .

إن النسبة المثلثية المناسبة هي التي تتضمن هذين الضلعين و التي هي بالطبع نسبة التجيب cos و هي تتضمن نسبة الضلع المجاور للزاوية على الوتر .

نعيد ترتيب معادلة حساب التجيب بحيث نجعل المجهول المطلوب حسابه (أي وتر المثلث) هو موضوع المعادلة و ناتجها لتصبح صيغة حساب التجيب على الصورة التالية :

$$\text{Cosine a } 50 = \frac{\textit{adjacent } 100}{\text{hypotenuse } 2}$$

تجيب الزاوية = $\frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{الوتر}}$

$$\text{Hypotenuse } 2 = \frac{\boldsymbol{adjacent}\ 100}{\cos a\ 50}$$

الوتر = $\frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{تجيب الزاوية}}$

كيف قلبت المتناسبة بهذه الصورة ؟

فقط تذكر دائماً كيفية قلب المتناسبات مع الحفاظ على صحتها بتذكر الميزان الرقمي :

$$50 = \frac{100}{2} \rightarrow 2 = \frac{100}{50}$$

نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة:

$$\text{hypotenuse} = \frac{300}{\cos 30}$$

الوتر = $\frac{300}{\text{تجيب الزاوية } 30}$

$$\frac{300}{\cos 30} = 346$$

إذاً فإن طول الوتر يبلغ 346 متر .

للتأكد من صحة العملية التي قمت بها بعد أن أصبح طول الوتر معلوماً بالنسبة لي أي 346 فإنني أطبق نسبة التجيب :

$$\text{Cosine a} = \frac{adjacent}{\text{hypotenuse}}$$

$$\text{تجيب الزاوية} = \frac{\text{القاعدة المجاورة للزاوية}}{\text{الوتر}}$$


أي يجب أن أقسم طول قاعدة المثلث المجاورة للزاوية الحرجة 300 متر على طول الوتر أي 346 متر فإذا حصلت على تجيب الزاوية 30° درجة فذلك يعني بأن العملية التي قمت بها صحيحة :

300÷346=0.86705202312138728323699421965318

تجيب cos الزاوية 30° درجة هو :

Cos 30° =0.86602540378443864676372317075294

العملية صحيحة.




أطروحة فيثاغورث و الأشكال الثلاثية الأبعاد

تمكننا أطروحة فيثاغورث من معرفة طول أي ضلعٍ من أضلاع مثلثٍ قائم الزاوية (مثلث يحوي زاوية قياسها 90° درجة) إذا عرفنا طول ضلعيه الآخرين ، كما تنطبق هذه النظرية كذلك على الأشكال الثلاثية الأبعاد .

مثال :

متوازي المستطيلات rectangular prism شكلٌ ثلاثي الأبعاد ذو وجوه أو أسطح مستطيلة الشكل (كما هي حال الصناديق الكرتونية مثلاً)

كم يبلغ طول المستقيم القطري d diagonal line في متوازي المستطيلات أدناه؟




$e=10$

$p=6$

$s=4$

لمعرفة ذلك فإننا نكمل قطر متوازي المستطيلات إلى مثلثٍ قائم الزاوية اعتماداً على أضلاع أو حروف متوازي المستطيلات ذاك و بذلك فإن قطر متوازي المستطيلات هذا يُصبح وتراً لمثلثٍ قائم الزاوية:



الآن نستخدم نظرية فيثاغورث لحساب طول الضلع i :

$$d^2=i^2+s^2$$

مربع طول وتر المثلث القائم الزاوية d^2 يساوي مجموع مربع طولي


ضلعيه الآخرين i^2+s^2 .

لماذا s^2 مع أنه ليس ضلعاً من أضلاع المثلث الافتراضي

الذي قمنا بإنشائه ؟

لأن s^2 هو الضلع الموازي و المساوي لضلع المثلث القائم حيث أن كلا

هذين الضلعين يمثلان ارتفاع متوازي المستطيلات المجسم و كما تعامون فإن الارتفاعات في المكعبات و متوازيات المستطيلات تكون كلها متساوية.



بدايةًً نقوم بحساب طول قاعدة المثلث العلوي الأول أي i و الذي هو كذلك وتر المثلث السفلي الثاني و لحساب طول الضلع i فإننا نستخدم نظرية فيثاغورث:

$$d^2=i^2+s^2$$

$$d^2=10^2+6^2=$$


$$100+36=136$$

الرقم 136 الذي حصلنا عليه يمثل مربع الطول و ليس الطول و حتى نحصل على طول الضلع نقوم بتجذير الرقم 136 تجذيراً تربيعياً ذلك أن عملية التجذير التربيعي هي العملية المعاكسة لعملية التربيع أي الرفع للقوة الثانية و هي العملية التي تجرد الرقم من قوته الثانية المرفوع إليها.

$$\sqrt{136} = 11.7$$

حتى نتمكن من معرفة طول وتر المثلث العلوي أي الضلع d فلا بد لنا من معرفة طولي ضلعيه الآخرين I,s و بالطبع فإن ارتفاع المثلث العلوي هو ذاته ارتفاع متوازي المستطيلات و بالتالي فإن طوله يبلغ 4cm .


أما i فإنها تمثل قاعدة المثلث العلوي 1 و في الوقت ذاته تشكل وتراً للمثلث السفلي المجهول 2.



بينما ضلعيه الآخرين معلومين حيث يبلغ طول قاعدته e 10 سنتمتر بينما يبلغ طول ضلعه القائم أي الضلع p الذي يشكل زاويةً قائمة مع القاعدة i 6 سنتمتر ، و بما أن المثلث السفلي 2 هو مثلثٌ قائم الزاوية فإننا نستخدم نظرية فيثاغورث لمعرفة طول وتره i الذي توصلنا إلى انه يبلغ 11.7 سنتمتر.

و بعد أن تمكنا من من حساب طول وتر المثلث السفلي i و الذي هو كذلك قاعدة المثلث العلوي 1 ، و بعد أن علمنا بأن الضلع القائم بزاوية 90° درجة أي الضلع f و الذي هو كذلك ارتفاع متوازي المستطيلات يبلغ طوله 4 سنتمتر أصبح بإمكاننا حساب طول وتر المثلث العلوي باستخدام نظرية فيثاغورث :

$$d^2=i^2+s^2$$




نعوض بالقيم الرقمية المتوفرة :

D2=11.72+42=136+16=152

152 هو مربع طول الوتر و ليس طول الوتر، و لمعرفة طول الوتر فإننا نجري عملية معاكسة لعملية التربيع أي الرفع للقوة الثانية ، أي أننا نقوم بتجذيره تجذيراً تربيعياً :

$$\sqrt{152} = 12.3 \text{ cm}$$

إذاً فإن طول وتر d المثلث العلوي 1 يبلغ 12.3 cm سنتمتر.



إن طول وتر i المثلث السفلي 2 يساوي الجذر التربيعي للضلعين الآخرين :

وتر المثلث السفلي i يساوي

$$i=\sqrt{e^2+p^2}$$

$$i=\sqrt{10^2+6^2}$$

أما طول وتر المثلث العلوي d فإنه يساوي :

$$d=\sqrt{e^2+p^2+s^2}$$


$$d=\sqrt{10^2+6^2+4^2}$$

لماذا؟

لأن الجذر التربيعي لكلٍ من $\sqrt{e^2+p^2}$ يُشكل وتر المثلث السفلي i و الذي هو في الوقت ذاته قاعدة المثلث العلوي 1 ، أما S^2 فهو الضلع القائم الذي يُشكل زاويةً مقدارها °90 درجة مع قاعدة المثلث .

أي أن $\sqrt{e^2 + p^2}$ يمثل طول قاعدة المثلث العلوي و التي هي كذلك وتر المثلث السفلي و الذي يساوي مربع طول ضلعيه الآخرين e . p

أما وتر المثلث العلوي فهو يساوي مربع طول الضلعين الآخرين و الذي يمثل قاعدته + الضلع القائم لأننا نحتاج إلى طول ضلعين حتى نتمكن من معرفة طول الوتر:



طول وتر المثلث العلوي d يساوي :

$$d = \sqrt{e^2 + p^2 + s^2}$$

أو

$$d = \sqrt{e^2 + p^2 + f^2}$$

أي :

$$d=\sqrt{10^2+6^2+4^2}$$

لماذا ؟

لأن مربع طول الوتر d يساوي مربع طول الضلعين الآخرين أي مربع f و i .

على اعتبار أن i=f كما تقدم .

و لكن i التي تمثل قاعدة المثلث 1 هي كذلك تمثل وتر المثلث السفلي 2 أي أن مربعها يساوي مربع طول الضلعين الآخرين في المثلث السفلي 2 أي أنها تساوي :

$$i=\sqrt{e^2+p^2}$$

و بالتالي فإن

$$d=\sqrt{e^2+p^2+f^2}$$


على اعتبار أن :

$$i=\sqrt{e^2+p^2}$$

و يتبقى مربع الضلع الثاني f الذي يساوي s .


بكلماتٍ أخرى :

إن وتر المثلث السفلي الثاني B يساوي مربع طول ضلعيه الآخرين P,E.



$$B^2 = P^2 + E^2$$

وتر المثلث الثاني أي الوتر B هو قاعدة المثلث الأول 1 .



وتر المثلث العلوي A الأول يساوي مربع ضلعيه الآخرين أي أنه يساوي مربع F و مربع B و كما مر معنا سابقاً فإن B التي هي قاعدة المثلث العلوي هي كذلك وتر المثلث السفلي أي أنها تساوي مجموع مربعي ضلعيه الآخرين E ,P و بالتالي فإن وتر المثلث العلوي A يساوي مجموع مربعي الضلعين E ,P الذين يشكلان سوياً مربع وتر المثلث السفلي B و الذي يشكل ضلعاً واحداً من أضلاع المثلث العلوي و بالتالي فإن وتر المثلث العلوي A يساوي مربع B

مربع الضلعين الذين يساويان B أي مجموع مربعي الضلعين E ,P + زائد مربع ضلع ثاني من المربع العلوي أي الضلع F او S لأنه مساوي له لا فرق .

إذاً يمكننا تطبيق القياسات و النسب المثلثية على الأشكال الثلاثية الأبعاد كما يُمكننا تطبيقها على الأشكال الثنائية الأبعاد.

حساب الاحتمالات

تعنى الفرصة في الرياضيات بالاحتمال حيث يتم التعبير عنها بقيمٍ رقمية تقع ما بين صفر 0 و واحد 1 :

$0 \to 1$

قياس الاحتمالات :

يمكن التعبير عن الاحتمالات على شكل كسرٍ أو رقمٍ عشري أو نسبة .

عندما تتخذ الاحتمالية قيمة الصفر فذلك يعني بأنها مستحيلة الحدوث ، أما عندما تكون قيمتها واحد 1 فذلك يعني بأنها مؤكدة الحدوث .

مقياس الاحتمالات Probability Scale :

صفر = مستحيل الحدوث (غير ممكن) 0%.

$\frac{1}{4}$ربع = **مستبعد الحدوث 25% أي 0.25 .**

$\frac{1}{2}$نصف = **قد يحدث و قد لا يحدث 50 % أي 0.5 .**

$\frac{3}{4}$ثلاثة ارباع = **ممكن الحدوث(محتملٌ جداً) 75 % أي 0.75 .**

1واحد = مؤكد الحدوث(100 %) .

لاحظ بأن جميل الاحتمالات على هذا المقياس تتراوح ما بين صفر 0 و واحد 1.

الاحتمالية هي دائماً رقمٌ يقع ما بين صفر و واحد ، حيث تشير القيمة صفر إلى الاستحالة أي استحالة حدوث أمرٍ ما بينما تشير القيمة واحد 1 إلى أن هذا الأمر مؤكد الحدوث.

يُمكن التعبير عن الاحتمالية بكسرٍ أو رقمٍ عشريٍ أو نسبة.

$\frac{1}{2}$ **= مستبعد الحدوث 25% أي 0.25 (نصف)**

معادلة حساب الاحتمالات

احتمال حدوث أمرٍ ما = عدد احتمالات وقوع الأمر المطلوب منا توقع حدوثه أو المرغوب بحدوثه أو الذي يُخشى من وقوعه مقسوماً على إجمالي عدد الاحتمالات الممكنة الحدوث جميعها .

مثال :

إذا كانت لدى شخصٍ ما قسيمة واحدة تمكنه من دخول سحبٍ لربح سيارة مثلاً و كان هنالك مليون قسيمة سحبٍ أخرى مماثلة فإن فرصة هذا الشخص في الربح هي واحد على مليون $\frac{1}{\text{مليون}}$

أما إذا كانت لديه 5 قسائم لدخول السحب فإن فرصته في الربح تصبح 5 على مليون $\frac{5}{\text{مليون}}$.



في إحدى جلسات توزيع الأراضي السكنية على عديمي الأملاك و العاطلين عن العمل كانت هنالك عشرة آلاف قطعة أرض معدة للتخصيص و من بينها كانت هنالك 300 قطعة أرض تقع كلٌّ منها على شارعين و 400 قطعة أرض تقع في مواقع استراتيجية متميزة و تحقيقاً لمبدأ العدالة تم تخصيص تلك الأراضي في قرعةٍ علنية ، فما هو احتمال أن يحصل الشخص على قطعة أرضٍ سكنية بموقعٍ متميز ؟

نطبق معادلة حساب الاحتمالات :

احتمال حدوث أمرٍ مطلوبٌ منا حساب احتمالات حدوثه أو أمرٍ مرغوبٌ في حدوثه أو أمرٌ يُخشى حدوثه مقسوماً على إجمالي عدد الاحتمالات الكلية .

الاحتمالات المرغوب بحدوثها أي الحصول على قطعة أرضٍ سكنية بموقعٍ استراتيجي تساوي :

700=300+400 مقسوماً على إجمالي الاحتمالات و هو عشرة آلاف :

$$\frac{300+400}{1000} = \frac{700}{1000} = 0.07$$

7 بالمئة .

إذا كان هنالك احتمالين لا يُمكن وقوعهما سوياً فإن هذين الاحتمالين يوصفان بأنهما متنافيين Mutually exclusive مثل أن نرمي بقطعة نقود و نحصل على وجهي العملة (ملك و كتابة) في الوقت ذاته؟

إذا كان هنالك حدثين أو احتمالين لا يُمكن وقوعهما سوياً فإن هذين الاحتمالين يوصفان بأنهما احتمالين متنافيين Mutually exclusive مثل أن نرمي بقطعة نقود و نحصل على ملك و كتابة في الوقت ذاته .

إن احتمال وقوع حدثين متنافيين يبلغ واحداً 1.

شخصٌ في جيوبه **10 قطع** عملة (بانكنوت) و هي 4 دولارات $ و 3 يورو€ و ريالين 2 و جنيه واحد .

بمعنى أنه إذا أخرج ذلك الشخص من جيبه قطعة نقدية واحدة فإنها إما أن تكون دولار أو يورو أو ريال أو جنيه ، أي أن هذه العملات تمثل احتمالاتٍ متنافية ، أي أنه لا يُمكن لها ان تجتمع إذ لا يمكن أن نلتقط منها إلا عملةً من نوعٍ واحدٍ فقط ، و أي قطعةٍ نقدية يقوم هذا الشخص بإخراجها من جيبه فإنها ستكون حتماً واحدةً من هذه العملات الأربعة و لذلك فإن مجموع الاحتمالات الممكنة المتعلقة بكل عملة يجب أن تكون واحد و بذلك فإن مجموع الاحتمالات المتنافية الممكنة هو :

$$€ + \$ + R + J =$$

$$\frac{4}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

$$10 \div 10 = 1$$

هل عرفتم الان لماذا أن مجموع الاحتمالات المتنافية (التي لا يُمكن إلا لواحدةٍ منها أن تقع في وقتٍ واحد) هو واحد.

من اين أتت الأعداد 4و3 و 2 و 1 ؟

10 قطع عملة (بانكنوت) و هي 4 دولارات و 3 يورو و ريالين 2 و جنيه واحد .

احتمالات عدم وقوع أمرٍ ما

إذا التقط ذلك الشخص عملةً واحدة فما هو احتمال أن لا تكون تلك العملة التي التقطها يورو **€**؟

عملة اليورو € و أي عملة أخرى ليست يورو € هما احتمالين متنافيين Mutually exclusive لا يمكن ان يقعا في وقتٍ واحد حيث ان كلاً منهما ينفي الآخر بمجرد وقوعه و هذا يعني بأن مجموع احتمالاتها واحد 1 .

أي أن احتمال التقاط يورو € مع احتمال التقاط اي عملة أخرى غير اليورو €´ يساوي واحد 1 :

$$€+€´=1$$

€´ كل ما هو ليس بيورو.

أي أن إيجاد احتمال التقاط عملة أخرى غير اليورو € تعني طرح احتمال التقاط عملة يورو من واحد.

$$€´=1-€$$

احتمال التقاط عملة أخرى غير اليورو $€'$ يساوي واحد 1 ناقص يورو $€$:

احتمال التقاط عملة غير اليورو يساوي واحد 1 ناقص يورو :

$$€' = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

من أين أتت النسبة $\frac{3}{10}$ ؟

لأن هنالك 10 قطع عملة مختلفة من بينها 3 قطع يورو .


لماذا :

$$1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

لأن $\frac{3}{10}$ تساوي :

$$\frac{3}{10} = 3 \div 10 = 0.3$$

$$1 - 0.3 = 0.7$$



تتألف لعبة الورق من 52 ورقة لعب منها 13 ورقة من صنف القلوب Heart .

إذا قمنا بسحب ورقة منها بشكلٍ عشوائي أعمى ما هو احتمال عدم سحب ورقة من نوع القلوب؟

بدايةً ما هو احتمال سحب ورقة لعب من نوع القلب H : Heart ؟

إن احتمال سحب ورقة قلوب H يساوي عدد أوراق القلوب أي 13 مقسوماً على عدد أوراق اللعب بأكملها أي 52 ورقة :

$13/52$

$$\frac{13}{52}$$

إذاً فإن احتمال ورقة قلوب هو

$$\frac{13}{52}$$

الآن ننتقل للسؤال التالي :

ما هو احتمال عدم سحب ورقة لعب قلبية H ؟

إن هذا الاحتمال السلبي ، أي احتمال عدم حدوث ذلك الأمر (عدم سحب ورقة قلوب) يساوي واحد 1 ناقص نسبة أوراق اللعب القلبية 13على بقية الأوراق 52 :

$$13 \div 52 = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$1 - 0.25 = 0.75$$

أي أن احتمال عدم سحب ورقة لعب قلبية يبلغ 0.75 .

إن احتمال وقوع حدثين متنافيين (لا يُمكن لهما أن يحدثا سوياً) mutually exclusive events يبلغ واحد 1 .

لإيجاد احتمال عدم وقوع أمرٍ ما نقوم بطرح احتمال وقوع ذلك الأمر من العدد واحد 1 .

فإذا كانت لدينا مجموعة أوراق لعب فإن أي ورقة لعبٍ يتم سحبها يجب أن تكون من نوعٍ واحد ،أي أن هنالك احتمالٌ واحد ممكن الحدوث عند سحب ورقة لعب :

♥ H=HEART ورقة لعب من نوع القلوب

♠♦♣ O=OTHER أنواع أخرى من ورق اللعب


$$H+O=\frac{13}{52}+\frac{39}{52}=\frac{52}{52}=1$$

O تعني أوراق اللعب الأخرى ♠♦♣ من ورق اللعب و عددها بدون الأوراق

القلبية ♥ 39 ورقة لعب .

لحساب احتمال وقوع أمرٍ ما مثل الحصول على الرقم 12 من حجر النرد (الزهر) فإن علينا رمي حجري نرد اثنين 12= 6+6

يتوجب علينا دائماً معرفة العدد الكلي للنتائج المحتملة و للقيام بذلك يتوجب علينا إنشاء قائمة بالنتائج و هذا ما يدعى بجدول مجال العينة sample space diagram .



إن هنالك طريقةٌ واحدة لتحقيق نتيجة 12 بحجري نرد و ذلك عن طريق رمي حجري النرد (الزهر) و الحصول على نتيجة 6 ستة من كل حجر.

حتى نتمكن من حساب احتمال وقوع أمرٍ ما فإن علينا أن نعرف عدد النتائج الممكنة الحدوث .

إن مجال العينة sample space هو قائمة أو جدول يُظهر لنا جميع النتائج المحتملة الحدوث.

احتمال وقوع أمرٍ ما يساوي عدد احتمالات وقوع ذلك الأمر تقسيم إجمالي الاحتمالات الأخرى.

إن احتمالية أن نسحب ورقة لعبٍ قلبية الشكل من بين مجموعة أوراق لعبٍ كاملة يساوي عدد الطرق التي يُمكن أن يقع ذلك الاحتمال فيها مقسوماً على إجمالي النتائج الممكنة الحدوث.

إن احتمال أن نسحب ورقة لعبٍ قلبية من بين مجموعة أوراق لعبٍ كاملة يُساوي عدد الطرق التي يُمكن ان يقع ذلك الاحتمال فيها و هو 13 مقسوماً على إجمالي النتائج الممكنة أي 52 و هو بالطبع إجمالي عدد أوراق اللعب:

$$\frac{13}{52}$$

قاعدة الضرب Product rule



إذا كان حجر النرد الواحد له ستة أوجه ، أي أنه يمنحنا 6 احتمالات أو نتائج ممكنة الحدوث أي أننا عندما نرمي حجري نرد اثنين يكون لدينا :

$6\times6=36$

36 احتمالاً .

فإذا كانت وسيلةٌ ما تمنحنا X احتمال فإن استخدام وسيلتين متماثلتين يمنحنا $X\times X$

احتمال أي X^2 و ليس $X\times2$ احتمال.

تمنح إحدى المحال التجارية تشكيلة أحذية تضم 9 موديلات و تشكيلة بنطلونات تضم 8 موديلات و تشكيلة بلوفرات تضم 7 موديلات و تشكيلة قمصان تضم 6 موديلات.

ما هو عدد الاحتمالات التي يُتيحها ذلك المتجر للزبون؟

حتى نعرف عدد الاحتمالات الممكنة فإننا نضرب جميع الاحتمالات الممكنة ببعضها البعض فنقول بأن عدد الاحتمالات المتوفرة للزبون حتى ينتقي لباساً كاملاً هي :

$$9\times8\times7\times6=3024$$

انتبه جيداً إلى أن هذه المسألة لا تعني :

$$9+8+7+6=30$$

بل إنها تعني : ما هو عدد الاحتمالات المتوفرة أمام الزبون حتى يجرب 9 أحذية مع 8 بنطلونات مع 7 بلوفرات مع 6 قمصان و ان يبدل بينها حتى يستنفذ جميع الاحتمالات و الخيارات الممكنة .

إن هذه المسألة لا تعني بأن نجرب 9 أحذية ثم نجرب 8 بنطلونات ثم نجرب 7 بلوفرات ثم نجرب 6 قمصان و بل إن المسألة تعني أن نجرب جميع هذه الملابس مع بعضها البعض أي ان نجرب كل حذاء مع جميع البنطلونات و كل حذاء مع جميع البلوفرات و كل بنطلون مع جميع القمصان ، و كل بنطلون مع جميع البلوفرات و هكذا حتى نستنفذ جميع الاحتمالات.

الاحتمال المشترك لحدثين combined probability

إذا كان لدينا حدثين مولدين للاحتمالات و ليكونا A و B فإن مجموع الاحتمالات التي يُمكن أن يُنتجها او يولدها هذين المولدين للاحتمالات أي A و B تفرض علينا أن نستخدم قاعدة الضم AND و هي تعني بأنه يتوجب علينا ضرب هذين العاملين المولدين للاحتمالات مع بعضهما البعض :

$$A \text{ AND } B = A\times B$$

إن قاعدة الضم هذه تعني عملية ضرب .

بوابة التخيير OR

A OR B

تعني عملية التخيير OR عملية جمع :

$$A\ OR\ B = A + B$$

ما هو احتمال أن نحصل على العدد واحد 1 و العدد 2 إذا رمينا بحجر نردٍ واحد؟

إن الحصول على العدد 1 و العدد 2 في الوقت ذاته و في رميةٍ واحدة هو أمر مستحيل الحدوث لأن هذين الاحتمالين متنافيان mutually exclusive ، أي أنه لا يمكن لهذين الاحتمالين أن يقعا في وقتٍ واحد و لذلك فإننا نضيف هذين الاحتمالين لبعضهما البعض إيجاد نتائج A أو B .

A OR B = A+B

فإذا كانت احتمالات A هي 6 احتمالات و احتمالات B تبلغ ستةً كذلك فإن الاحتمالات الممكنة الحدوث لكلٍ من A و B هي :

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

حيث نجمع البسط مع البسط :

1+1=2

بينما يبقى المقام 6 على حاله دون تغيير.

قمت باختزال الناتج $\frac{2}{6}$ عن طريق قسمة كلٍ من بسطه و مقامه على قاسمٍ مشترك و هو هنا العدد 2 :

$2 \div 2 = 1$

$6 \div 2 = 3$

فحصلت على الكسر المختزل $\frac{1}{3}$

إذا كان لدينا حجري نرد اثنين A و B فإن النتائج التي نحصل عليها عندما نقوم برمي هذين الحجرين تكون نتائج مستقلةً عن بعضها البعض، و في مثل هذه الحالة فإن معرفة عدد النتائج أو الاحتمالات يتطلب منا ضرب الاحتمالات التي يمنحنا إياها مولدي الاحتمالات المستقلين و هما هنا حجري النرد .

فإذا كان لكل حجر نردٍ 6 ستة أوجه فإن رمي حجري نرد اثنين يمنحنا :

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

إذاً فإن رمي حجري نرد اثنين يمنحنا 36 **احتمالاً مختلفاً .**

كل حجر نرد واحد له ستة أوجه أي أنه يمنحنا 6 احتمالات مختلفة أي أن حجري نرد اثنين يمنحاننا 36 احتمالاً مختلفة.

مسألة :

إذا رميت بحجري نرد اثنين فما هو احتمال الحصول على عددٍ زوجي Even من حجر النرد الأول و ما هو احتمال الحصول على العدد 5 من الحجر الثاني؟

كما تعلمون فإن **حجر النرد عبارة عن مكعبٍ ذو ستة أوجه و على كل وجهٍ من أوجهه تم نقش عددٍ معين ما بين واحد و ستة .**

و بما أن حجر النرد له ستة أوجه مرقمةُ من ثلاثة إلى ستة فذلك يعني بأن ثلاثةً منها تحمل أعداداً منفردة odd بينما تحمل وجوهه الثلاثة الأخرى أعداداً زوجية even ، أي أن نصف أوجه حجر النرد تحمل أعداداً فردية بينما تحمل نصف أوجه النرد الأخرى أعداداً زوجية و هذا يعني بأن احتمال الحصول على عددٍ زوجي عند رمي النرد هو $\frac{1}{2}$ ، أما احتمال الحصول على العدد 5 عند رمي النرد فهو واحد على ستة $\frac{1}{6}$ لأن لحجر النرد ستة أوجه و بالتالي فإن احتمال الحصول على عددٍ زوجي عند رمي حجر النرد الأول و أن نحصل على العدد 5 عند رمي النرد الثاني يساوي ناتج ضرب هذين الاحتمالين ببعضهما البعض أي :

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

نضرب البسط بالبسط $1\times1=1$ و نضرب المقام بالمقام $2\times6=12$.

الاحتمال الشرطي Conditional Probabilities

عندما يكون هنالك احتمالٌ ما يرتبط حدوثه بوقوع احتمالٍ آخر أو عندما يكون لدينا احتمالين مرتبطين ببعضهما البعض يقال عندها بأن هذا الحدث أو هذا الاحتمال هو احتمالٌ شرطي و أن هذين الحدثين أو الشرطين مرتبطين شرطياً dependent .

في حال أدى الاحتمال الأول إلى استبعاد خياراتٍ معينة من الدورة التالية فإن علينا في الدورة التالية مراعاة ذلك في مقام الكسر .

مثال :

إذا كانت لدينا مجموعةٌ كاملة من أوراق اللعب التي تضم 52 ورقة بالطبع فإن مقام الكسر الذي يُبين لنا الاحتمالات الواقعة على أوراق اللعب تلك يجب أن يكون 52 ، فإذا كانت عملية حساب الاحتمالات تستهدف سحب أوراق القلب مثلاً فإننا سوف نعبر عن نسبة أوراق القلب إلى بقية أوراق اللعب بأنها

$$\frac{13}{52}$$

فإذا أجريت عملية سحبٍ عشوائي أدت إلى سحب ثلاثة أوراق قلبية و 10 أوراق أخرى فإن علي أن أراعي ذلك الأمر في دورة السحب التالية ، فإذا أعدت الأوراق الغير قلبية مجدداً فإن احتمال سحب ورقة قلبية سوف يصبح

$$\frac{10}{49}$$

52-3=49

13-3=10

جداول الاحتمال الشرطي Conditional probability tables

احتمال P=probability

الخط العمودي | يعني (عند أو معطى) given

احتمال التقاط ورقة لعب حمراء اللون من بين مجموعةٍ كاملة من أوراق اللعب تبلغ :

$$\frac{26}{52}$$.

لأن هنالك 26 ورقة لعب حمراء اللون من إجمالي عدد أوراق اللعب البالغ 52 ورقة لعب.

$$26 \div 26 = 1$$

$$52 \div 26 = 2$$

أي $\frac{1}{2}$

$$P(\text{Red}) = \frac{\text{Red}}{\text{all}} = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

إن احتمال P التقاط ورقة لعبٍ حمراء Red يساوي عدد الأوراق الحمراء

مقسوماً على بقية أوراق اللعب $\frac{\text{Red}}{\text{all}}$ يساوي $\frac{26}{52}$ يساوي $\frac{1}{2}$.

لأن عدد أوراق اللعب الحمراء يساوي نصف عدد اوراق اللعب أي 26 ورقة.

$$P(\text{Heart}|\text{Red}) = \frac{\text{Heart}}{\text{red}} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}$$

إن احتمال P التقاط ورقة لعبٍ قلبية Heart من بين الأوراق الحمراء

Red يساوي عدد الأوراق القلبية مقسوماً على الأوراق الحمراء $\frac{\textit{Heart}}{\text{red}}$

يساوي $\frac{13}{26}$ يساوي $\frac{1}{2}$ بعد اختزال الكسر.

26÷13=2

13÷13=1

احتمال - P=probability

عند |

لاحظ كيف أن مقام الكسر يتغير عندما يكون الاحتمال شرطياً .

الصيغة **p| تعني :**

P احتمال حدوث أمرٍ ما | عند ...

مثال :

P (Heart attack | smokers) =


P احتمال حدوث أزمة قلبية | عند | (المدخنين) يساوي أو يبلغ =

P(accident) | speeding drivers =

P احتمال وقوع حادث | عند | (السائقين المسرعين) يساوي أو يبلغ =


مخطط فن Venn Diagram

يتألف مخطط فن من عدة دوائر متراكبة overlapping circles تمثل مجموعات sets حيث تمثل كل دائرة مجموعة أشياء و هذه الدوائر توضع ضمن مستطيل :




و عندما ينتمي عنصرٌ ما إلى مجموعتين اثنتين في الوقت ذاته ، أو عندما تنتمي عدة عناصر إلى مجموعتين أو أكثر فإن تلك الدوائر التي تمثل المجموعات تتقاطع فيما بينها لتضم تلك العناصر .

يبين الشكل السفلي دائرتين متداخلتين تمثلان مجموعتين و هما مجموعة الأعداد الزوجية Even و مجموعة الأعداد الأولية Prime و بما أن العدد 2 هو عددٌ أولي و زوجي في الوقت ذاته فهو عددٌ أولي لأنه لا يقبل القسمة التامة إلا على نفسه و على العدد 2 ، كما أنه بالطبع عددٌ زوجي و لذلك فإنه ينتمي لكلتا المجموعتين السابقتين و يمثل قطاع تداخل هاتين المجموعتين.



يبين لنا الشكل السفلي ثلاثة دوائر تمثل ثلاث مجموعات من اللغات و هي اللغة اللاتينية و اللغة اليونانية و اللغة السيريلية Cyrillic و هنالك أحرفٌ مشتركة بين هذه المجموعات الثلاث من مجموعات اللغات أي أن هذه الأحرف تنتمي للمجموعات الثلاثة و لذلك فقد تم وضعها في القطاع الذي تتقاطع فيه هذه الدوائر الثلاثة و هنالك أحرف مشتركة بين لغتين فقط و لذلك فقد تم وضعها في قطاعٍ مشترك بين دائرتين:




ع

الأبجدية السيريلية Cyrillic هي نظام كتابة طُوِّر في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، ويعتمد أساسًا على الحروف اليونانية الكبيرة، و تستخدم هذه الأبجدية الشعوب الأرثوذكسية الشرقية الناطقة باللغات السلافية. يستخدمها أكثر من 300 مليون شخص، وهي الأبجدية

الرسمية للغات مثل الروسية والبلغارية والأوكرانية والصربية، وتضم 33 حرفًا في نسختها الروسية.

لدينا في الشكل السفلي دائرتين تمثلان مجموعتين و هما مجموعة المعتقد Belief و مجموعة الحقيقة Truth و هنالك عنصرٌ ينتمي إلى كلٍ من مجموعة المعتقد و مجموعة الحقيقة و هو عنصر المعرفة Knowledge و لذلك فقد وضعناه ضمن القطاع الذي تتداخل فيه الدائرتين.



ζ

ζ

الحرف اليوناني ζ (زي) Zye يعني المجموعة الكونية universal set أو المجموعة الشاملة أي جميع الأشياء الموجودة ضمن المستطيل الذي يحيط بالمجموعات.

Set notation العلاقة بين عناصر المجموعة

تحكم المجموعات و العناصر ضمن مخطط فن Venn diagrams قواعد خاصة يتوجب علينا دائماً التقيد بها و هذه القواعد هي :

يجب أن يوضع عناصر المجموعة ضمن قوسين مربعين brackets ، فإذا كانت B مثلاً هي مجموعة الأعداد الأقل من عشرة التي تقبل القسمة على ثلاثة فإن :

B=[9,6,3]

كما ترون فإن عدد العناصر الموجودة في المجموعة B (set B) هو ثلاثة و نعبر عن هذه الحقيقة بالصورة التالية :

n(B)=3

n = عدد عناصر المجموعة (B) يساوي 3 .

تكملة المجموعة :

The complement of A تكملة المجموعة A ، و هي تعني كل ما هو في المجموعة الشاملة Universal set و يقع خارج المجموعة A .

التقاطع Iintersection ∩

A∩B

A تقاطع B


Intersection of A and B.

يعني التقاطع مجموعة العناصر المشتركة بين مجموعتين ، أي العناصر التي تنتمي في الوقت ذاته إلى مجموعتين حيث نضع هذه العناصر المشتركة في تقاطع دائرتين.

مثال :

A = مجموعة الأعداد الفردية الأقل من العدد عشرة 10.

B = مجموعة قواسم الرقم 100 الأدنى من الرقم عشرة.



A∩B=[5,1]

تقاطع المجموعة A مع المجموعة B تساوي العناصر 5 و واحد 1 .

أي الأعداد الفردية الأقل من 10 التي يمكن قسمة الرقم 100 عليها قسمةً صحيحة تامة و هما العددين 5 و 1 .

اجتماع مجموعتين

AUB


The union of A and B.

اجتماع المجموعتين A و B .

يعني اجتماع مجموعتين بأن العناصر التي تنتمي للمجموعة A تنتمي كذلك للمجموعة B .

مثال :

المجموعة A هي مجموعة الأعداد التي تنتهي بخمسة أو صفر و التي تقع ما بين 5 و 25 ، أما المجموعة B فهي مجموعة الأعداد التي تنتهي بخمسة أو صفر التي تقع ما بين5 و 25 و التي تقبل القسمة على 5 .




$A \subset \boldsymbol{B}$

A is subset of B


A مجموعة فرعية من B

A تنتمي إلى B

و يعني ذلك بأن المجموعة A هي مجموعةٌ فرعية Subset من المجموعة B .


ع
المجموعـة الشـاملة
B
A

مسألة تطبيقية عن استخدام مخطط فن Venn diagram في حساب الاحتمالات



يتخصص أحد المشاتل الزراعية في إنتاج 100 شجيرة من شجيرات الحدائق **ع=100**

(المجموعة الشاملة ع أي مجموعة المشتل تضم مئة شجيرة) منها 35 شجيرة ورقية تزرع من أجل جمال أوراقها و 25 شجيرة تزرع من أجل جمال أزهارها و 10 عشرة شجيرات تتميز بجمال أوراقها و أزهارها في الوقت ذاته و هناك 30 شجيرة لا تزرع من أجل أوراقها و لا من أجل أزهارها و إنما تزرع من أجل ثمارها لأنها شجيراتٌ مثمرة.

المجموعة الشاملة ع هنا هي مجموعة المشتل و تضم 100 شجيرة.

ع=100

مجموعة الشجيرات التي تزرع من أجل أوراقها 35 .

مجموعة الشجيرات التي تزرع من أجل أزهارها 25 .

تتقاطع هاتين المجموعتين في عشرة شجيرات تُزرع من أجل جمال كلٍ من أوراقها و أزهارها في الوقت ذاته، أي أنها تنتمي في الوقت ذاته لكلا المجموعتين ، و هنالك 30 شجيرة لا تنتمي لهاتين المجموعتين حيث أنها شُجيراتٌ مثمرة تزرع من أجل ثمارها.

هذه الحالة تمثل حالة احتمالٍ شرطي conditional probability .

بدايةً **ما هو عدد عناصر المجموعة التي تضم شجيراتٍ تزرع من أجل جمال أوراقها؟**

$$A=35+10=45$$

اي أن هنالك 45 شجيرة تزرع لجمال أوراقها و أزهارها (من بينها هنالك 10 شجيرات تزرع لجمال أوراقها و أزهارها) .

نضع الرقم 45 كمقامٍ للكسر لبيان نسبة النباتات التي تزرع من أجل جمال أزهارها و أوراقها و هي بالطبع 10 بالّنسبة للشجيرات التي تزرع من أجل جمال أوراقها أي 45 .

A مجموعة الشجيرات التي تُزرع من أجل جمال أوراقها.

B مجموعة الشجيرات التي تزرع من أجل جمال أزهارها :

$$P(\text{flowers \&leaves}|\text{leaves})=\frac{10}{45}$$

P احتمال مصادفة شجيرة تزرع من أجل جمال أزهارها و أوراقها | من بين الشجيرات التي تزرع من أجل جمال أوراقها يبلغ $\frac{10}{45}$.

P=احتمال

يمكن حل مسائل الشرط الاحتمالي conditional probability غالباً باستخدام مخطط فن Venn diagram .

ما هو احتمال أن شجيرة تم اختيارها بشكلٍ عشوائي أن لا تمتلك أزهارها قيمة جمالية كبيرة؟

بدايةً نحسب **عدد لشجيرات التي لا تمتلك أزهارها قيمةً جماليةً كبيرة A :**

$$25+30=55$$

25 شجيرة تزرع من أجل جمال أوراقها و كان من بينها 10 عشرة شجيرات تنتج أزهاراً ذات قيمة جمالية و لذلك فقد قمت بطرحها.


30 شجيرة مثمرة تزرع من اجل الحصول على ثمارها.

نستخدم الرقم 100 كمقامٍ للكسر النسبي Probability fraction ، أما بسط الكسر فهو يمثل الشجيرات التي تزرع من أجل جمال أوراقها و عددها 55 شجيرة.

$$P(\text{ flowering }')=\frac{55}{100}$$

´ علامة نفي الصفة ´flowering = شجيرة لا تمتلك أزهارها قيمة جمالية كبيرة.

إن احتمال P مصادفة شجيرة لا تمتلك أزهارها قيمة جمالية كبيرة ´flowering تبلغ $\frac{55}{100}$



التواتر النسبي Relative Frequency

كل دورة من دورات دولاب الحظ مثلاً تدعى محاولة trial ، و كلما كانت عدد المحاولات التي نقوم بتنفيذها أكبر كانت بالطبع فرصة الربح اكبر.

التواتر النسبي هو كسرٌ نسبي من المقدار الكلي و لحسابه فإننا نستخدم الصيغة التالية :

$$\text{Relative frequency} = \frac{frequency}{number\ of\ trials}$$

$$\textbf{التواتر النسبي} = \frac{\text{التواتر}}{\text{عدد المحاولات}}$$



حساب الاحتمالات الخاصة بحجر النرد

كما تعلمون فإن **حجر النرد (الزهر) ذو شكلٍ مكعب أي أن له 6 ستة أوجه و على كل وجهٍ من أوجهه هنالك عددٌ على شكل نقاط) ، أي أن كل حجر نرد يحمل ستة أرقام.**

إذاً فإن هنالك احتمالٌ واحدٌ فقط للحصول على الرقم 12 و ذلك بأن نرمي حجري نرد اثنين و أن يُظهر كل حجرٍ منهما العدد 6 :

$6+6=12$

و كذلك فإن هنالك احتمالٌ واحدٌ أو طريقةٌ واحدة فقط للحصول على الرقم 11 و هو أن يُظهر احد حجري النرد العدد 6 و أن يُظهر الحجر الثاني العدد 5 :

$5+6=11$

و لكن هنالك احتمالين اثنين بأن نحصل على الرقم عشرة :

$6+4$

$5+5$

و يمكن القول بأن هنالك احتمالٌ ثالث للحصول على الرقم 10 و هو :

$4+6$

أي أن يُظهر النرد الأول العدد 4 و ان يُظهر النرد اثاني العدد 6 :

للحصول على العدد 9 هنالك احتمالين اثنين :

$4+5$

$3+6$

و يمكن القول بأن هنالك احتمالين آخرين و هما :

$5+4$

$6+3$

للحصول على العدد 8 هنالك ثلاثة احتمالات :

$6+2$

$5+3$

$4+4$

و يمكن القول بأن هنالك احتمالين آخرين معاكسين :

$2+6$

$3+5$

للحصول على العدد 7 هنالك ثلاثة احتمالات :

$1+6$

3+4

2+5

و يمكن القول كذلك بأن هنالك ثلاثة احتمالاتٍ أخرى معاكسة و هي :

6+1

4+3

5+2

للحصول على العدد 6 هنالك ثلاثة احتمالات :

3+3

2+4

1+5

و هنالك احتمالين معاكسين كذلك و هما :

4+2

5+1

للحصول على العدد 5 من حجري نرد هنالك احتمالين اثنين و هما :

2+3

1+4

للحصول على العدد 4 هنالك احتمالين و هما :

2+2

1+3

و هنالك احتمالٌ ثالثٌ معاكس و هو 3+1

للحصول على العدد 3 هنالك احتمالٌ واحد :

1+2

و هنالك احتمالٌ ثالثٌ معاكس كذلك و هو 2+1

العدد واحد : لا يمكن الحصول على العدد واحد بحجري نرد اثنين.

عند حساب احتمالات الحصول على نتيجةٍ ما بحجري نرد اثنين لا تنسى أن تضرب النتائج الغير متماثلة بالعدد 2 و ذلك لحساب النتائج المعاكسة أي الحصول على العددين ذاتهما و لكن بشكلٍ معاكس فبالنسبة للعدد 5 مثلاً هنالك احتمالٌ بان يُظهر النرد الأول العدد 4 و أن يُظهر النرد الثاني العدد 1 و و هنالك احتمالٌ بأن يُظهر النرد الأول العدد واحد و الثاني العدد 4 كما أن هنالك احتمالُ بأن يُظهر النرد الأول العدد 3 و أن يُظهر النرد الثاني العدد 2 أو أن يُظهر النرد الأول العدد 2 و الثاني العدد 3 .


يُظهر الشكل البياني مجموعة الاحتمالات التي يُمكن الحصول عليها عند رمي حجري نرد اثنين .

كل حجر نرد عبارة عن مكعب له ستة أوجه يوجد على كل وجهٍ منها عددٌ يتراوح ما بين 1 و 6 .

اجمالي عدد الاحتمالات التي يمكن الحصول عليها عند رمي حجري نرد هي :

6×6=36

يشير المحور العمودي إلى عدد الاحتمالات بينما يُشير المحور الأفقي إلى العدد الذي نريد معرفة احتمالات الحصول عليه من حجري نرد اثنين.



احتمال الحصول على العدد واحد 1 برمي حجري نرد يساوي الصفر. لماذا؟


لأنه لا يُمكن الحصول على العدد واحد بحجري نرد فلو أظهر كل نردٍ منهما العدد واحد فإننا سوف نحصل على 2 و ليس على واحد :

1+1=2

احتمال الحصول على العدد 2 برمي حجري نرد هو واحد من 36 احتمال : 1\36

فهو احتمالٌ واحدٌ فقط يحدث إذا أظهر كل حجر نردٍ منهما العدد واحد :

1+1=2



احتمالات الحصول على العدد 3 من حجري نرد هي 2 من 36 احتمال .


1+2=3

2+1=3

أي أن يُظهر النرد الأول العدد 1 و أن يُظهر النرد الثاني العدد 2 .

أن يُظهر النرد الأول العدد 2 و أن يُظهر النرد الثاني العدد 1 .

دائماً هنالك احتمالين اثنين لكل حالة شريطة أن لا يكون العدد متماثلاً مثل 4+4 أو 2+2 و عندها يكون الاحتمال واحداً بالطبع .




هنالك ثلاثة احتمالات من 36 احتمالاً للحصول على العدد 4 من حجري نرد :

2+2

1+3

3+1




هنالك 4 احتمالات من 36 احتمالاً للحصول على العدد 5 من حجري نرد:

1+4

4+1

2+3

3+2



هنالك 5 احتمالات من بين 36 احتمالاً للحصول على العدد 6 من حجري نرد :

2+4

4+2

1+5

5+1

الاحتمال الخامس احتمالٌ منفرد لا عكس له لأن العددين متماثلين 3+3



هنالك 6 احتمالات من 36 احتمال للحصول على العدد 7 من حجري نرد اثنين :

3+4


4+3

2+5

5+2

1+6

6+1



عدد الاحتمـــالات

االنتـــــائج المتوقعــــة

احتمالات الحصول على العدد 8 من حجري نرد هي 5 احتمالات من 36 احتمالاً :


3+5

5+3

2+6

6+2

و احتمالٌ خامسٌ منفرد لا عكس له لأن النتيجتين المكونتين له متماثلتين 4+4



احتمالات الحصول على العدد 9 من حجري نرد هي 4 احتمالات من 36 احتمالاً:

3+6

6+3

4+5

5+4




احتمالات الحصول على الرقم عشرة من حجري نرد هي ثلاثة احتمالات من 36 احتمالاً :

4+6

6+4

و احتمالٌ ثالثٌ منفرد لا عكس له لأن مكونيه متماثلين :


5+5



احتمالات الحصول على الرقم 11 من حجري هما احتمالين من 36 احتمالاً ممكناً:


5+6

6+5



احتمال الحصول على الرقم 12 عند رمي حجري نرد اثنين هو احتمالٌ واحد فقط من بين 36 احتمالاً :

6+6



ملاحظات نهائية :

أدنى احتمالين يُمكن الحصول عليهما من حجري نرد اثنين هما العدد 2 و 12 حيث أن احتمال الحصول على كلٍ منهما هو واحد 1 من 36 احتمالاً.

العدد ذو الاحتمالات الأكبر هو العدد 7 بستة احتمالات من 36 احتمالاً.

Binomial distribution التوزيع الحيوي

تنطبق حالة التوزيع الحيوي على كل نشاطٍ يمتلك نتيجتين متنافيتين فقط mutually exclusive أي نتيجتين لا يُمكن أن تحدثا في الوقت ذاته (إما ملك أو كتابة على العملة) ، و هذا النوع من الاحتمالات يُعطي نتائج و احتمالات ثابتة ، كما أن كل محاولة تكون مستقلةً عن المحاولة السابقة .

تنطبق حالة التوزيع الحيوي على اي نشاطٍ متكرر له نتيجتين متنافيتين فقط .

التوزيع الاحتمالي probability distribution

هي حالةٌ رياضية تبين لنا الاحتمالات و النتائج المتوقعة لكل تجربة.

أما في حالة التوزيع المتجانس uniform distribution فإن احتمال وقوع اي نتيجة يكون واحدا.

إحصاء و بيانات

تدعى البيانات المتعلقة بموضوعٍ ما بمجموعة البيانات data set .

البيانات الأولية primary data هي البيانات التي يتم جمعها بناءً على فرضيةٍ ما و يمكن استخدام أساليب الاستطلاع و الاستقصاء للحصول على البيانات الأولية.

البيانات الثانوية Secondary data

هي البيانات التي تم جمعها لأغراض أخرى.

البيانات الكمية Quantitative data هي عبارة عن بيانات رقمية متصلة أو منفصلة.

البيانات الكمية (الرقمية) هي على نوعين :

بياناتٌ متصلة continuous data و هي البيانات التي تقع مالٍ معين .

مثال :

ما هي الاحتمالات المنطقية لأن يُصبح عدد ذرية شخصٍ ما بعد ألف سنة أو 1500 سنة؟

و بالطبع لا يكون لدينا رقمٌ محدد ،و إنما تقديراتٌ أولية فقط، فنحن مثلاً نحسب عدد سكان تلك المنطقة منذ 1000 أو 1500 سنة و نحسب عدد سكان تلك المنطقة اليوم و نقسم عدد سكان تلك المنطقة اليوم على عدد السكان خلال تلك الفترة من الزمن فنحصل بشكلٍ تقريب على ما يُمكن أن تكون عليه ذرية شخصٍ ما بعد ألف أو 1500 سنة .

و لكن الرياضيات تقدم لنا طريقة حسابية غير واقعية ينتج عنها أن ذرية أي شخص بعد 1500 سنة سوف تكون بالمليارات :

لو عاش شخص قبل 1500 عام، لكان لديه مليارات من الأحفاد اليوم، مع أن العدد الفعلي يُرجّح أن يكون أقل بكثير بسبب عوامل مثل انهيار شجرة النسب.

و قد حصلنا على هذه النتيجة المبالغ بها لأن عدد الأحفاد المباشرين يُحسب بصيغة 2^nحيث \(n\) هو عدد الأجيال ،وبما أن الجيل الواحد يُعادل 25 عامًا تقريبًا، فقد مرّ حوالي 60 جيلًا منذ 1500 عام. وهذا يعني نظريًا أي 2^{60} من الأحفاد، لكن هذا العدد مرتفع جدًا ولا يعكس الواقع بل إنه يفوق عدد سكان الكرة الأرضية بأضعاف مُضاعفة.

$$2^{60} = 1152921504606846976$$

البيانات المنفصلة Discrete data

البيانات المنفصلة هي بياناتٌ رقمية محددة مثلاً ما هو وزن لتر ماء بالغرام؟

البيانات النوعية Quantitative data

البيانات النوعية هي بياناتٌ غير رقمية تكون على شكل كلمات و تعرف كذلك باسم البيانات الفئوية Categorical data .

يُمكن للبيانات أن تكون أولية primary و هي البيانات التي يتم جمعها لاختبار فرضيةٍ ما ، كما يُمكن للبيانات أن تكون بياناتٍ ثانوية و هي البيانات التي يتم جمعها لغاياتٍ اخرى.

إن البيانات الرقمية تدعى بالبيانات الكمية quantitative data حيث يتم التعبير عن هذه البيانات بأرقام ، أما البيانات النوعية Qualitative data فيتم التعبير عنها بالكلمات (و ليس بالأرقام) .

البيانات المستمرة continuous data هي بياناتٌ لها قيمة تقع ضمن مجالٍ معين (حدٌ ادنى و حدٌ أعلى) ، أما البيانات المنفصلة discrete data فهي بياناتٌ لها قيمةٌ رقمية محددة ثابتة.

البيانات النوعية Qualitative data هي بياناتٌ غير رقمية Non-numerical data تكون على شكل كلمات (يُعبر عنها بالكلمات الوصفية) .

طرق اختيار العينات التي سوف يُجرى عليها البحث sampling methods

أخذ العينات العشوائية البسيطةSimple random sampling

يُمكننا الحصول على عينة عشوائية عن طريق ترقيم كل عنصرٍ من عناصر المجموعة السكانية و من ثم استخدام خاصية (مولد الأرقام العشوائية) random number generator .

أخذ العينات بشكلٍ منهجي Systematic sampling

في حال اختيار عينات الاستبيان بشكلٍ عشوائيٍ بسيط simple random sampling يتم اختيار العينات بشكلٍ عشوائي .

أما **عند اختيار العينات التي سوف يشملها الاستبيان بشكلٍ منهجي systematic sampling فإنه يتم اعتماد منهجية ما عند اختيار العينات التي سوف يشملها الاستبيان مثل اختيار الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم أو أسماء عائلاتهم بحرفٍ معين ، أو اختيار أشخاصٍ تبدأ أرقامهم بعددٍ فردي أو عددٍ زوجي مثلاً.**

أخذ العينات الحصصية quota sampling

عند استخدام هذه الطريقة يتم تقسيم السكان إلى مجموعاتٍ طبقاً لسماتٍ معينة نريد اختبارها ، وبعد ذلك يتم اخذ عينةٍ نسبية proportional sample من كل مجموعة و ذلك في محاولةٍ لجعل العينة ممثلةً لجميع السكان، و **عندما يتم إقصاء فئةٍ ما من الاستبيان أو عندما يتم التركيز على فئةٍ معينة** ، مثلاً عندما يتم التركيز على ذوي الدخول المرتفعة في الاستبيان و يتم اقصاء سكان العشوائيات و العاطلين عن العمل و المعاقين **يُقال عندها بأن العينة منحازة biased sample**

علماً أن هذا الانحياز يُمكن ان يحدث حتى لو تم اختيار العينات بشكلٍ عشوائي ، و عندها توصف هذه العينة بأنها غير مُمثلة unrepresentative .


Population (السكان، موضوع الاستقصاء) و هي مجموعة من الأشياء التي يتم الاستقصاء عنها .

العينة sample هي جزءٌ من الأشياء التي يتم الاستقصاء عنها ، أي أن العينة هي مصدر البيانات ، و إن لم تكن العينة ممثلة للسكان فإن النتائج سوف تكون منحازة.

جداول التواتر Frequency tables

يتم تنظيم البيانات عادةً ضمن جداول تواتر تُظهر التواتر الذي تتواتر أو تتكرر فيه قيمٌ معينة في مجموعة البيانات.

الشطب – التشطيب Tally-Tallying



تمثل الصورة العلوية العدد خمسة كما يتم تمثيله بطريقة التشطيب.

تسهيلاً لقراءة المخططات فإننا نقسم النقاط إلى مجموعات تتألف كلٌ منها من خمسة خطوط حيث يتم تمثيل كل 5 خمسة عناصر بأربعة خطوطٍ عمودية و خطٌ خامسٌ معترض (خط قُطري) diagonal :

1=|

2=||

3=|||

4=||||

5=~~||||~~ **(خط التشطيب الخامس يجب أن يكون مائلاً)**

~~||||~~ | =6 **(خط التشطيب الخامس يجب أن يكون مائلاً)**

يتألف جدول التشطيب دائماً من ثلاث خانات :

الخانة الأولى تتعلق بالصفة أو السمة التي نستقصي عنها أو التي نقوم بإحصائها.

الخانة الثانية هي خانة التشطيب .

الخانة الثالثة هي خانة التواتر و هو العدد المكافئ للتشطيب .

Liburuak	Zenbaketa	Ikasleak
1	I I I I	4
2	~~I I I I~~	5
3	I I I	3
4	I I I	3
5	I I	2
6	I I I	3

1-2-2-3-1-2-2-2-1-1-3-3-4-5-6-5-6-4-6-4

Liburuak	Zenbaketa	Ikasleak
1	IIII	**4**
2	~~IIII~~	**5**
3	III	**3**
4	III	**3**
5	II	**2**
6	III	**3**

يعني التشطيب Tallying تصنيف العناصر إلى مجموعات من التشطيبات تتألف كلٌ منها من 4 خطوط عمودية |||| و خطٌ قُطريٌ خامسٌ معترض بشكلٍ مائل ~~||||~~ (يجب أن يكون الخط الخامس قطرياً مائلاً).

أي أن عملية التشطيب هي عملية تمثيل البيانات ضمن مجموعاتٍ خماسية تدل على تكرار و تواتر حدوث أمرٍ ما .


المخططات الدائرية Pie charts

تمثل المخططات الدائرية أحد أشكال تمثيل البيانات بشكلٍ إحصائي ، و لإنشاء مخططٍ دائري نقوم أولاً بجمع البيانات اللازمة في جدول تواتر frequency table ، كما نُضيف عموداً إلى جدول التواتر لحساب زاوية كل قطاعٍ دائري من قطاعات الدائرة .


نكتب كل قيمة في عمود التواتر على شكل كسر لإجمالي التواترات (التكرار الكلي) للبيانات و ذلك لحساب النسبة التي سوف يشغلها كل جزءٍ من البيانات من حجم البيانات الكلي ، ثم نضرب نسبة تواتر حدثٍ معين بالنسبة إلى إجمالي تواتر البيانات العام بعدد درجات الدائرة أي 360° درجة و بذلك فإننا نحصل على القطاع الدائري الذي يُمثل تلك البيانات.

سوف أقوم بشرح هذه الخطوات بالتفصيل لاحقاً :


مخططٌ دائري يمثل الدول الكبرى اقتصادياً في العالم و التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي:


Other
20%
United States
24.3%
$18.0 Trillion
China
14.8%
$11.0 Trillion
$4.4 T
Japan
5.9%
$3.4 T
Germany
4.5%
$2.9 T
UK
3.9%
$2.4 T
France
3.3%
India
2.8%
Italy
2.5%
Brazil
2.4%
Canada
2.1%
South Korea
1.9%
Australia
1.8%
Russia
1.8%
Spain
1.6%
Mexico
1.5%
Indonesia
Netherlands
Turkey
Switzerland
Saudi Arabia


مخطط دائري يبين النسبة السكانية بين 7 دول ناطقة باللغة الإنكليزية :




مخططٌ دائري يبين الأديان الكبرى في العالم :



المتصفحات الأكثر استخداماً 2011



النسب بين المستعمرات 1939



كيفية إنشاء مخطط دائري

مسألة :

قم بتحويل البيانات أدناه إلى مخططٍ دائري :

تُبين البيانات التالية الإجراءات التي اتخذتها إحدى الحكومات لحل المشكلات الاجتماعية مثل انتشار الأحياء العشوائية و أزمة السكن و البطالة و العنوسة و الفقر :

التواتر 900000 حالة توزيع أراضي سكنية.

التواتر : 200000 حالة إقامة منازل جاهزة صغيرة على أراضي مملوكة للدولة .

التواتر 700000 حالة توزيع آلات إنتاجية تقوم بتصنيع منتوجات مختلفة في المنازل.

300000 حالة : التعيين في وظائف حكومية .

اجمالي التواترات :

900000+200000+700000+300000=2100000

2100000 اجمالي التواترات (تكرار الحالات) .

نقسم كل تواتر (تكرار حالة أو إجراء)على اجمالي التواترات (الحالات) :

التواتر الأول (توزيع أراضي سكنية على عديمي الأملاك و سكان العشوائيات)


900000 حالة :

900000/2100000=0.4285714286

نضرب ناتج القسمة هذا بعدد درجات الدائرة أي °360 درجة ، لنرى كم سوف يُمثل هذا التواتر (تكرار الحالات) من المخطط الدائري :

$$0.4285714286 \times 360° = 154°$$

نقسم الدائرة من أي نقطة بزاوية °154 درجة و ذلك لإنشاء القطاع الذي يُمثل حالات توزيع الأراضي على عديمي الأملاك و الحالات الاجتماعية.



الإجراء الثاني :

الإسكان بمنازل جاهزة صغيرة على أراضي مملوكة للدولة.

عدد الحالات (التواتر) 200000


نقسم التواتر (تكرار او عدد حالات الاسكان على أراضي مملوكة للدولة) على إجمالي التواترات (إجمالي عدد الحالات) :

$$200000/2100\,000 = 0.0952380952$$

نضرب ناتج القسمة بقياس الدائرة أي °360 درجة لنرى كم سوف يُمثل هذا التواتر بالنسبة للمخطط البياني الدائري.

$$0.0952380952 \times 360° = 34.3°$$

نقسم المخطط الدائري بزاوية °34.3 و هذا القطاع الدائري يُمثل النسبة التي تم إسكانها في منازل صغيرة جاهزة على أراضي الدولة.



الإجراء الثالث :

تواتر (تكرار) حالات تقديم آلات تقوم بأعمال إنتاجية في المنزل 700000.

عدد الحالات (التواتر) 700000


نقسم التواتر (تكرار او عدد الحالات) على إجمالي التواترات (إجمالي عدد الحالات) :

700000/2100000=0.3333333333

نضرب ناتج القسمة بعدد درجات الدائرة :

0.3333333333×°360=°120

نقسم الدائرة بزاوية °120 درجة لنحصل على قطاعٍ دائري يُمثل تكرار حالات توزيع آلات تقوم بالإنتاج من المنازل:



الإجراء الأخير :

300000 حالة

توظيف عديمي الأملاك و أصحاب الحالات الاجتماعية في وظائف حكومية .


نقسم عدد الحالات (التواترات) أي 300000 على إجمالي التواترات أي 2100000:

300000/2100000=0.1428571429

نضرب الناتج بعدد درجات الدائرة أي °360 درجة :

0.1428571429×°360=51.4°

نقسم الدائرة بزاوية ° 51.4 درجة.



و بذلك نكون قد أنجزنا مخططاً بيانياً دائرياً .

التأكد من صحة المخطط الدائري الذي قمنا بإنجازه :

نتأكد من صحة العمليات التي قمنا بها عن طريق القيام بجمع الدرجات الدائرية التي حصلنا عليها فإذا كانت العمليات التي قمنا بها صحيحة فيجب أن نحصل على 360° درجة :

$$154°+34.4°+120°+51.4°=360°$$

العمليات صحيحة (قمت بإهمال بعض الأرقام العشرية أثناء إنجاز العمليات الرياضية).

الآن أقوم بتحويل البيانات السابقة إلى مخططٍ بياني دائري و للقيام بذلك :

أثبت المنقلة protractor عند مركز الدائرة ، ثم باستخدام الجزء المستقيم من المنقلة أرسم أول نصف قطر و الذي اعتبره 0 صفر المخطط ، ثم أبدأ بعد ذلك برسم أنصاف أقطارٍ أخرى لتقوم بتقسيم الدائرة وفقاً للزوايا التي توصلت إليها حسابياً، و مع كل نصف قطرٍ أقوم برسمه فإنني أحصل على قطاعٍ دائري ، و اتابع القيام بذلك حتى تكتمل الدائرة و بذلك أحصل على مخططٍ بياني دائري ، و قد بينت ذلك بالتفصيل سابقاً.


الخطوط البيانية للمسافة و الزمن Distance-time graphs

تُظهر المخططات البيانية للمسافة و الزمن المسافة التي تم قطعها في مدةٍ ما من الزمن حيث يُمثل المحور الأفقي X axis عامل الزمن بينما يُمثل المحور العمودي Y axis المسافة المقطوعة ، بينما يُبين لنا ميلان الخط البياني السرعة.

تُمثل كل خانة أفقية على المحور الأفقي وحدةً زمنية واحدة (ثانية أو دقيقة او ساعة) و كل خانة على المحور العمودي تمثل وحدةً طولية واحدة (متر ، كيلو متر، ميل، عقدة بحرية...)

أما المحور العمودي Y axis فإنه يُبين المسافة المقطوعة من نقطة البداية أي من النقطة صفر ، و هذا التحرك يُدعى بالإزاحة displacement .

في الشكل السفلي يُبين الجزء الأفقي من الخط البياني بانه لم يتم قطع أية مسافة .



إذا كان الخط البياني يتخذ شكلاً أفقياً خلال فترةٍ ما من الزمن فذلك يعني بأن السرعة طيلة تلك المدة كانت صفراً و ان الجسم المتحرك طيلة تلك المدة لم يقطع أي مسافة.

يبين الشكل السابق تسارعاً صاعداً بمقدار 10 خانة خلال 6 دقائق (لأن ذروة خط التسارع البياني تقع مقابل العدد 6 على المحور الأفقي (محور الزمن) فإذا كانت كل خانة (مربع)


تساوي 1 واحد متر فذلك يعني بأن سرعة ذلك الجسم المتحرك كانت 10 متر خلال 6 دقائق .

السرعة تساوي المسافة \ الزمن :

10/6=1.7 m

1.7 متر في الدقيقة.

يُبين الخط البياني المنحدر نحو الأسفل بأن الجسم المتحرك يتحرك راجعاً نحو النقطة التي انطلق منها (نقطة البداية)



الخط الصاعد بمقدار 12 خانة يُبين بأن سرعة ذلك الجسم المتحرك كانت 12 كيلو متر في الدقيقة (لأن الزمن مُعطى بالدقيقة و المسافة مُعطاةً بوحدة الكيلو متر).

الأجزاء التي كان فيها الخط البياني أكثر حدةً و أكثر ميلاناً تعني بأن الجسم المتحرك كان خلالها أكثر سرعةً.

لحساب سرعة جسم متحركٍ ما فإننا نحسب مقدار الميلان في الجزء الذي يمثل حركة ذلك الجسم من الخط البياني و من ثم فإننا نقوم بتحويل تلك البيانات إلى سرعة (مسافة\ زمن) .

يبين الشكل السابق تسارعاً صاعداً بمقدار 12 خانة خلال 5 دقائق (لأن ذروة خط التسارع البياني تقع مقابل العدد 5 على المحور الأفقي (محور الزمن) فإذا كانت كل خانة (مربع)

تساوي 1 واحد كيلو متر فذلك يعني بأن ذلك الجسم قد تحرك 12 كيلو متر خلال 5 دقائق و بما أن السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن فإن سرعة هذا الجسم تبلغ :

$$12 \div 5 = 2.4$$

أي أن سرعة ذلك الجسم المتحرك كانت 2.4 كيلو متر في الدقيقة .

2.4×60=144 km/h

144 كيلو متر في الساعة.

قراءة الخطوط البيانية الخاصة بالمسافة و الزمن Distance-time graphs

---

يعني الخط البياني الأفقي بأن الجسم المتحرك قد توقف تماماً عن الحركة طيلة المدة التي بقي فيها ذلك الخط البياني أفقياً.

الخط المائل الهابط نحو الأسفل يعني بان الجسم المتحرك يعود راجعاً إلى النقطة التي انطلق منها.

الخط الصاعد نحو الأعلى يعني بأن الجسم يتسارع.

مقدار سرعة جسم متحرك تساوي عدد الخانات العمودية على الخط العمودي (المسافة) على اعتبار أن كل خانة تُمثل مسافةً معينة مقسوماً على عدد الخانات الأفقية (الزمن) على اعتبار أن كل خانة أفقية تمثل مقداراً معيناً من الزمن (ثانية أو دقيقة أو ساعة).

الخطوط البيانية للسرعة و الزمن Speed-time graphs

تستخدم الخطوط البيانية للسرعة و الزمن في رصد و بيان حركة جسمٍ ما خلال مدة زمنية ما .

قراءة الخطوط البيانية الخاصة بالسرعة و الزمن :

يُبين لنا ميل الخط البياني تسارع ذلك الجسم و يقاس التسارع بوحدة المتر في الثانية m/s^2.


انتبه إلى أنه **في مخططات السرعة \ الزمن فإن الخط البياني عندما يكون أفقياً فإنه يُشير إلى أن الجسم المتحرك يتحرك بسرعةٍ ثابتة و أنه لا يتسارع (لا تزيد سرعته) ، هذا في المخططات البيانية الخاصة بالسرعة و الزمن أما في مخططات المسافة و الزمن Distance-time التي مرت معنا سابقاً فإن الخط البياني الأفقي يُشير إلى أن الجسم متوقفٌ تماماً عن الحركة.**

الخط البياني المائل ميلاناً سلبياً negative slope أي المائل نحو الأسفل يُمثل تباطؤاً في السرعة deceleration أي تباطؤاً في السرعة يُقاس بقيمةٍ سلبية مثلاً -5 متر في الثانية أو ناقص واحد -1 متر في الثانية .

يُشير الخط البياني المائل ميلاناً إيجابياً positive slope أي الخط البياني الصاعد إلى أن الجسم المتحرك هو في حالة تسارع و يُقاس تسارعه بقيمةٍ إيجابية مثلاً $5m/s^2$ متر في الثانية أو $1m/s^2$ متر في الثانية.

يتم تقسيم المخطط البياني إلى مناطق areas وفقاً لتغير سرعة الجسم المتحرك (تسارع ، تباطؤ، ثبات) أي وفقاً لتغير وضعية الخط البياني .

يُشير المحور العمودي إلى السرعة متر\ثانية ، بينما يُشير المحور الأفقي إلى الزمن ، حيث يُمثل كل سنتمتر عمودي 1 واحد متر مثلاً ، بينما يُمثل كل واحد 1 سنتمتر أفقي ثانية واحدة مثلاً.




حساب إجمالي المسافة المقطوعة في منطقةٍ معينة تقع تحت الخط البياني:

إذا كان الشكل الموجود تحت الخط البياني شكلاً مربعاً أو مستطيلاً فإننا لحساب المسافة المقطوعة نضرب طوله بعرضه ، أي أننا نضرب عدد الخانات (المربعات) العمودية (التي تُمثل السرعة) بعدد خاناته الأفقية (التي تمثل الزمن).

عندما يتحرك الجسم المتحرك بسرعةٍ ثابتة فإنه يُشكل خطاً أفقياً موازياً للمحور الأفقي.

أما عندما يكون الجسم المتحرك في حالة تسارع أي عندما يكون الخط البياني مائلاً ميلاناً إيجابياً أي صاعداً ، أو في حالة تباطؤ أي عندما يكون مائلاً ميلاناً سلبياً أي هابطاً فإن الشكل الذي يتشكل تحت الخط البياني يكون شكلاً مثلثاً تساوي مساحته الطول ×الارتفاع ÷2




المنطقة الأولى منطقة مثلثية الشكل مساحتها تساوي الطول×الارتفاع ÷2

مساحة المنطقة المثلثية الأولى :

$$\text{Area 1} = \frac{4\times3}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

أي أن المسافة المقطوعة خلال المرحلة الأولى تبلغ 6 كيلو متر.




المنطقة الثانية منطقة مستطيلة الشكل مساحتها تساوي الطول×الارتفاع

مساحة المنطقة المستطيلة الثانية :

Area 2=4×3=12

أي أن المسافة المقطوعة خلال المرحلة الأولى تبلغ 12 كيلو متر .



المنطقة الثالثة منطقة مثلثية الشكل مساحتها تساوي الطول×الارتفاع ÷2

مساحة المنطقة المثلثية الثالثة :

$$Area\ 3 = \frac{4\times3}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

أي أن المسافة المقطوعة خلال المرحلة الأولى تبلغ 6 كيلو متر.

اجمالي المسافة المقطوعة :

$$6+12+6=24\ km$$


إجمالي المسافة المقطوعة تبلغ 24 كيلو متر.

اجمالي المسافة المقطوعة يُساوي المساحة المحصورة تحت الخط البياني.


الخطوط البيانية للسرعة الموجهة و الزمن Velocity-time graphs

تُستخدم الخطوط البيانية الخاصة بالسرعة الموجهة velocity و الزمن في حساب السرعة في اتجاهٍ معين ، أما المساحات المحصورة تحت الخط البياني الخاص بالسرعة الموجهة و الزمن فإنها تُمثل الإزاحة displacement أي المسافة المقطوعة أو البعد عن نقطةٍ البداية.

الإزاحة مقدار الابتعاد بخط نظرٍ مستقيم عن نقطة البداية :




يستخدم مصطلح الإزاحة في الفيزياء كذلك للإشارة إلى عملية إزاحة السوائل التي يتسبب بها وضع جسمٍ ما في إناءٍ مملوءٍ بسائل:



و كما هي الحال في مخططات السرعة و الزمن speed-time graphs فإن الميلان على **مخطط السرعة الموجهة و الزمن يُمثل التسارع acceleration .**

مسألة :

وفقاً لمخطط السرعة الموجهة ادناه احسب المسافة التي تحركها الجسم المتحرك عندما بلغ أقصى سرعة له.



كما يُبين مخطط السرعة الموجهة و الزمن فإن ذلك الجسم المتحرك قد بلغ أقصى سرعة له في الجزء الأخير من الخط البياني و الذي يحصر تحته شكلاً مستطيلاً عرضه خانتين (مربعين) و طوله 10 خانات أي 10 مربعات.

لمعرفة المسافة التي قطعها الجسم المتحرك عندما كان في أقصى سرعةٍ له فإننا نحسب مساحة المستطيل المحصور تحته :

مساحة المستطيل = الطول × العرض


مساحة المستطيل = 2 ×10 = 20

إذاً فإن المسافة التي قطعها هذا الجسم المتحرك عندما بلغ أقصى سرعة له في الخط البياني بلغت 20 كيلو متر.

في الشكل السفلي كم تبلغ المسافة الكلية التي قطعها الجسم المتحرك ؟

المحور العمودي هو محور الإزاحة displacement (التحرك و الانتقال) و مقياسها هنا بوحدة الكيلو متر.

المحور الأفقي هو محور الزمن و وحدة قياسه هنا الثانية.




المنطقة الأولى المحصورة تحت الخط البياني منطقة مثلثية الشكل مساحتها تساوي الطول×الارتفاع ÷2

مساحة المنطقة المثلثية الأولى :

$$Area\ 1 = \frac{5 \times 5}{2} = \frac{25}{2} = 12.5$$

أي أن المسافة المقطوعة خلال المرحلة الأولى تبلغ 12.5 كيلو متر.




المنطقة الثانية المحصورة تحت الخط البياني منطقة مربعة الشكل مساحتها تساوي الضلع×الضلع .

مساحة المنطقة المربعة :

$$Area\ 2 = 5 \times 5 = 25$$

أي أن المسافة المقطوعة خلال المرحلة الثانية تبلغ 25 كيلو متر.



المنطقة الثالثة المحصورة تحت الخط البياني منطقة مثلثية الشكل مساحتها تساوي الطول×الارتفاع ÷2

مساحة المنطقة المثلثية الثالثة :

$$Area\ 1 = \frac{5\times5}{2} = \frac{25}{2} = 12.5$$

أي أن المسافة المقطوعة خلال المرحلة الثالثة تبلغ 12.5 كيلو متر.

اجمالي المسافات المقطوعة تساوي إجمالي المساحة المحصورة تحت الخط البياني :

$$12.5+12.5+25=50$$

المسافة المقطوعة تساوي 50 كيلو متر.

إن حساب المساحة الموجودة تحت المنحني البياني curve أو الخط البياني graph تُمكننا من فهم العلاقة ما بين متغيرات الخط البياني .

عندما يكون الخط البياني graph منحنياً أي عندما يكون على شكل منحني بياني curve فإننا نقوم بتقدير المساحة المحصورة تحته عن طريق قسمة تلك المساحة إلى قطاعات و أجزاء.

تقدير المساحات المقطوعة :

عندما تكون حدود المساحات المحصورة تحت الخط البياني عبارةً عن خطوط مستقيمة فإن بإمكاننا عندها أن نقوم بتجزئة تلك المساحات إلى أشكال هندسية بسيطة و حساب مساحاتها كما مر معنا سابقاً عندما قمنا بتجزئة المساحة المحصورة تحت الخط البياني إلى مستطيلٍ أو مربعٍ و مثلثين.

و لكن عندما يكون الخط البياني منحنياً (مُنحني بياني) curve عندها يتوجب علينا تجزئة المساحات المحصورة تحته إلى ما يُشبه أشكالاً هندسية (أشكال هندسية تقريبية و تقديرية) ، و كلما كان عدد الأشكال الهندسية التي نقوم بتجزئة المساحة إليها أكبر فإن حساب المساحة يكون أكثر دقةً.

عندما يُغير الجسم المتحرك سرعته ، أي عندما يتسارع تارةً و يتباطأ تارةً أخرى يُقال عندها بأن سرعة هذا الجسم تتغير بشكلٍ لا خطي nonlinear .


المساحة المحصورة تحت المنحني البياني curve تُمثل المسافة المقطوعة.


لتقدير المسافة المقطوعة فإنه تتم تجزئة المساحة الموجودة تحت المُنحني البياني بخطوطٍ عمودية.

يتم الحصول على أشكال هندسية ذات زوايا حادة و خطوط مستقيمة من الخط البياني المنحني عن طريق وصل النقاط التي تلتقي فيها الخطوط العمودية مع الخط البياني graph ، و لكن بالطبع تتبقى هنالك أجزاءً من المساحة ذات الحدود المنحنية لا تُغطيها تلك الخطوط المستقيمة و الزوايا الحادة و لذلك يتم تقدير مساحاتها بشكلٍ تقريبي .

يتم رسم خطوط التقطيع العمودية انطلاقاً من نقطة تلامس الخط البياني المنحني curve مع الخط المستقيم الوهمي الذي يصل بين نقطتين و الذي يُحدد أبعاد الأشكال الهندسية الوهمية.

يتم تحوي الشكل المنحني إلى شكلٍ مستقيم عن طريق وصل أقرب نقطتي تلامس ببعضهما البعض.





لحساب المسافة المقطوعة يتوجب علينا أن نحسب مساحة كل شكلٍ شبه منحرف trapezoid محصور تحت الخط البياني باستخدام صيغة حساب مساحة شبه المنحرف :

$$\text{Area}=\frac{1}{2}(a+b)\times h$$


حيث a و b هما ارتفاعات الأضلاع المتوازية في شبه المنحرف، أما h فهو البعد بينها.

و بعد ذلك نقوم بجمع مساحات جميع أشباه المنحرفات مع بعضها البعض حتى نحصل على المساحة الكلية اي المسافة الكلية المقطوعة.

لحساب المسافة الكلية المقطوعة يتوجب تقسيم المساحة الموجودة تحت المُنحني البياني curve بواسطة خطوطٍ عمودية.

يتم تقسيم المساحات المحصورة تحت الخطوط البيانية بواسطة خطوط عمودية تنشأ من نقاط تلاقي الأشكال الوهمية ذات الأضلاع المستقيمة و الزوايا الحادة مع المنحني البياني curve

السرعة معطاة بوحدة الكيلومتر \ ثانية



$$\text{Area1}=\frac{1}{2}(a+b)\times h$$

$$\text{Area1}=0.5\times(3+6)\times 4=19.8$$

$$\text{Area2}=\frac{1}{2}(a+b)\times h$$

$$\text{Area2}=0.5\times(6+4)\times 5=25$$

$$\text{Area3}=\frac{1}{2}(a+b)\times h$$

$$\text{Area3}=0.5\times(4+10)\times 5=35$$

$$\text{Area4}=\frac{1}{2}(a+b)\times h$$

$$\text{Area4}=0.5\times(10+5)\times 5=37.5$$

اجمالي المسافة المقطوعة تساوي مجموع مساحات جميع القطاعات الواقعة تحت الخط البياني:

19.8+25+35+37.5=117.3

117.3 كيلو متر هي إجمالي المسافة المقطوعة.

المنطقة الموجودة تحت مُنحني السرعة و الزمن speed-time curve تمثل المسافة المقطوعة.

يتم حساب المساحات الموجودة تحت المُنحني البياني curve عن طريق تقسيم تلك المنطقة إلى أشكال هندسية مختلفة تتناسب إلى حدٍ ما مع المُنحني البياني ، و بعد ذلك يتم جمع مساحات تلك الأشكال مع بعضها البعض للحصول على المساحة الكلية أو المسافة الكلية المقطوعة.


ميلان مُنحني بياني Slope of a curve


تكون درجة ميلان الخط واحدة في كل نقاطه.


حساب درجة الميلان

نقوم بحساب درجة ميلان نقطة ما على مُنحني بياني عن طريق رسم خطٍ مماس له line tangent ثم القيام بحساب ميلان ذلك المستقيم المماس لذلك المُنحني.


درجة الميلان عند نقطةٍ ما من ذلك المنحني تمثل درجة التغير اللحظية عند تلك النقطة.




2
-2
0
2
-2



كما تلاحظون فإننا **نرسم مستقيماً مماساً للمنحني البياني عند نقطة ما ثم نحدد نقطتين على المستقيم المماس للمنحني البياني بحيث يكون بعد هاتين النقطتين عن النقطة التي يمس فيها المستقيم المماس المنحني البياني واحداً.**



ميلان خط هو مقدار التغير العمودي (الفرق بين النقطتين العموديتين او ناتج طرح نقطتين عموديتين) مقسوماً على معدل التغير الأفقي (الفرق بين النقطتين الأفقيتين او ناتج طرح نقطتين أفقيتين) .

أي أن ميلان خط هو ناتج طرح النقطة العمودية السفلى من النقطة العمودية العليا مقسوماً على ناتج طرح النقطة الأفقية السفلى من النقطة الأفقية العليا .

.إكتب المعادلة هنا

$$(5-3)/(10-8) \;=\; \frac{5-3}{10-8} = \frac{2}{6}\,(0.0555)$$

هو ميلان هذا المنحني البياني.

إن ميلان خطٍ بياني graph يُمثل معدل تغير y العمودية بالنسبة ل X الأفقية.

بالنسبة للمُنحني البياني curve فإن الميلان يكون مختلفاً عند أجزاء مختلفة من الخط البياني.

ليس هنالك للمُنحني مُعدلٌ ثابتٌ للتغير ، و لذلك فإن الميلان عند أي نقطة يُدعى بمعدل التغير اللحظي عند تلك النقطة.

إن ميلان الخط البياني يُساوي النقطة العمودية الثانية ناقص النقطة العمودية الأولى مقسومةً على النقطة الأفقية الثانية ناقص النقطة الأفقية الأولى:

$Slope = Y_2 - Y_1 / X_2 - X_1$

$Slope = Y_2 - Y_1 \div X_2 - X_1$

النقطة العمودية الثانية (العليا) Y_2 ناقص النقطة العمودية الأولى (السُفلى) تقسيم النقطة الأفقية الثانية (الأكثر بعداً عن الصفر) X_2 ناقص النقطة الأفقية الأولى X_1 الأكثر قرباً للصفر.

لقياس الميلان نقوم دائماً بطرح النقطة الأكثر قرباً إلى الصفر (أي الرقم الأقل) من النقطة الأكثر بعداً عن الصفر (الرقم الأكبر).

الخطوط البيانية الخطية الواقعية Linear real-life graphs

يُمكن تمثيل المُتغيرات الواقعية مثل انتشار الأحياء العشوائية و ازدياد الفقر و البطالة و العجز عن تأسيس أسرة و ارتفاع أسعار العقارات على الخط البياني فإذا تغير أحد المتغيرات بمعدلٍ ثابت بالنسبة للمتغير الآخر فإن ميلان الخط البياني سوف يكون ثابتاً ، كما أن الخط البياني سوف يكون خطياً (مُستقيماً) .


Linearمستقيم= straight خطي

يُمكن للخط البياني الخطي (المستقيم) linear graph أن يُمثل القيم النسبية لمقدارين أو وحدتي قياس و لذلك يُمكن استخدامه في تحويل وحدات القياس ، و في هذه الحالة فإن الخط البياني يُدعى بخط التحويل البياني conversion graph .


يُبين المخطط البياني العلاقة ما بين وحدتي قياسٍ للطول و هما البوصة (الإنش) و السنتمتر حيث يمثل المحور الأفقي السنتمتر بينما يُمثل المحور العمودي الإنش (in) Inches ، و على سبيل المثال فإن كل إنش واحد يساوي 2.5 سنتمتر،


يُمثل الشكل السفلي إحداثية التحويل ما بين سنتمتر و بوصة (إنش) حيث أن كل 1 بوصة (إنش) على المحور العمودي Y تساوي 2.5 سنتمتر على المحور الأفقي X ، كما أن 2 إنش على المحور العمودي Y تساوي 5 سنتمتر على المحور الأفقي X ، و كل 3 إنش على المحور العمودي تساوي 7.5 سنتمتر على المحور الأفقي X و هكذا...

أما الخط البياني المستقيم الذي يمر عبر النقاط الإحداثية فإنه يُدعى بخط التحويل Conversion line



إذا كانت العلاقة ما بين متغيرين تتغير عند نقطةٍ معينة فسوف تكون هنالك قطاعاتٌ على الخط البياني ذات ميلانٍ مختلف ، أما الخط البياني الخاص بهذا النوع من العلاقات فإنه يُدعى بالخط البياني الإقطاعي Piecewise linear graph و ذلك لأن الخط البياني في هذه الحالة يتألف من عدة قطع مستقيمة مختلفة.






الخوط البيانية الواقعية الغير خطية Nonlinear real-life graphs

عندما يُظهر الخط البيانيgraph علاقة غير خطية nonlinear بين متغيرين ، فإن الخط البياني عندها سيكون عبارة عن مُنحني بياني curve .

ماذا يعني القول بأنه (إذا كانت العلاقة بين مُتغيرين ثابتة فإن الخط البياني يكون خطاً مستقيماً)؟


مثال توضيحي :

إذا كان المحور الأفقي X في الرسم البياني يُمثل عامل او مُتغير الزمن و كان المحور العمودي Y يُمثل عامل أو متغير الارتفاع ، أي ارتفاع إناءٍ ما على سبيل المثال و كان ذلك الإناء ذو شكلٍ هندسي متجانس أي كان قطره من الأعلى و الأسفل واحداً فإن الخط البياني الذي يمثل ارتفاع السائل في ذلك الإناء بمرور الزمن سيكون خطاً مستقيماً لأن العلاقة ستكون ثابتةً ما بين الزمن و ارتفاع منسوب أو مستوى السائل الذي يتم ملئ ذلك الإناء أو ذلك الحوض به:



أما إذا كانت العلاقة بين متغيرين غير ثابتة فإن الخط البياني الذي يُمثل العلاقة بين هذين المتغيرين سوف يكون خطاً مُنحنياً لأن العلاقة بين هذين المُتغيرين غير ثابتة.

مثلاً ، لو قمنا بملء إناءٍ يختلف قطر أعلاه عن قطر أسفله بسائلٍ ما وفق الإحداثية السابقة (أي كان المحور الأفقي يمثل الزمن و كان المحور العمودي يمثل الارتفاع)، فإن ارتفاع مستوى السائل في حوض أو إناء قاعه أوسع أو أضيق من فوهته فإن ارتفاع منسوب السائل في الإناء لن يكون ثابتاً بالنسبة لعامل الزمن حيث سيتم ملئ الأجزاء الضيقة بشكلٍ أسرع من الأجزاء الواسعة:



إذا كان معدل التغير ثابتاً فإن الخط البياني الذي يُمثل ذلك التغير سوف يكون خطياً Linear أي مستقيماً straight ، أما إذا كان معدل التغيير غير ثابت فإن الخط البياني سوف يكون غير خطي nonlinear تاي أنه لن يكون مستقيماً و سيكون مُنحنياً بيانياً.


كلما كان الاختلاف بين أجزاء الإناء أكبر كان الخط البياني أكثر انحناءً
Time
Height
Time

مجال و نطاق الدالة العملياتية Domain and range of function

كما مر معنا سابقاً فإن الدالة العملياتية function تشبه آلة أو مصنع حيث يتم إدخال مُدخلاتٍ معينة إليها لتُجرى عليها عملياتٌ معينة .

إن مجموعة القيم الممكنة لمدخلات الدالة العملياتية f تدعى بالمجال domain بينما تُدعى مجموعة المخرجات المُمكنة للدالة العملياتية بالنطاق range .

إذاً فإن المجموعتين التي تتضمان القيم الممكنة لمدخلات و مُخرجات (نتائج) الدالة العملياتية تدعيان بالمجال و النطاق.

إذاً يُمكننا تشبيه مجموعة المجال (المدخلات) domain بمستودعٍ يتم تخزين المواد الأولية فيه تمهيداتً لتصنيعها أما مجموعة النطاق (مجموعة المخرجات) range فيمكن تشبيهها بالمستودع الذي يتم تخزين المصنوعات الجاهزة للتسويق فيه بعد إنتهاء عملية تصنيعها.


ترسيم العلاقة ما بين المداخل و المخارج

Mapping input to outputs

تعني الدالة العملياتية Function إدخال مدخل (مقدمة) إلى منطقة العمليات الرياضية و إجراء عملية أو عمليات رياضية معينة على تلك المدخلة input أو المقدمة و ذلك لإنتاج مخرج output أو نتيجة معينة.

أي أن الدالة العملياتية ترسم العلاقة ما بين مجموعة المدخلات (المجال) domain و مجموعة المخرجات أو النتائج (النطاق) range .

إذاً فإن الدالة العملياتية function تشبه آلة تقوم بتطبيق إجراءات(عملياتٍ رياضية) معينة على مُدخلات ما و ذلك لإنتاج مخرجات (نتائج) معينة .



ترسيم العلاقة ما بين المدخلات و المخرجات :

في المثال التالي تقوم الدالة العملياتية بتربيع كل مدخلة ، أي أنها تقوم برفع كل مدخلة موجودة في مجموعة المدخلات (المجال) domain إلى القوة الثانية لإيجاد مخرجات أو نتائج معينة تكون في مجموعة النتائج (النطاق) range .

لا يُمكن لمربع عددٍ حقيقي أن يكون سلبياً.

لتكن لدينا العلاقة الدلالية التالية :


$f(x)=X^2$ for $-2 \leq x \leq 2$, where x is an integer.

و التي تعني :


إن الدالة العملياتية f للمتغير X تتضمن رفع المتغير X للقوة الثانية بحيث يكون هذا المتغير أكبر أو يساوي ≤ العدد السلبي -2 و أصغر أو يُساوي≥ العدد الموجب 2 .

حيث المتغير x عددٌ صحيح integer

$$-2 \leq x \leq 2$$



إن الدالة العملياتية السابقة تقتضي رفع العناصر الموجودة في مجموعة المدخلات input (المجال) للقوة الثانية أي ضربها ببعضها البعض أو تربيعها لإنتاج مجموعة المخرجات output (النطاق) .



Domain and range on a graph

بينما العديد من الدالات العملياتية f يُمكن ان يكون لها أي دخلٍ و أي خرج (نتيجة) فإن هنالك دالات عملياتية f لها مجالٌ محدود limited domain و مُدخلاتٌ محددة أو مخرجاتٌ محددة limited range أو كلاهما مثل الرفع للقوة الثانية، و كقاعدةٍ عامة فإن الدالات العملياتية التربيعية quadratic functions تكون لها دائماً مُخرجاتٌ محددة limited range ، حتى لو أن مجموعة المدخلات domain (المجال) تضمنت جميع الأعداد الحقيقية لأن مربع العدد الحقيقي لا يمكن أن يكون سلبياً .

و يُمكن لنا ان نتبين مدخلات domain و مخرجات range الدالة من خلا تتبع الخط البياني للدالة function's graph :

و كما يُبين الشكل السفلي فإنه **يُمكن استخدام أي قيمة للمتغير X كمدخلة لهذه الدالة التربيعية Quadratic function (مجال واسع و مفتوح) ، أما مخرجات و نتائج تلك الدالة فيجب دائماً أن تكون أكبر من الصفر أو مساويةً له 0 و لا يمكن لها أن تكون أدنى من الصفر ، أي أن تكون قيمةً سلبية).**

يُمكن استخدام أي قيمة للمتغير الأفقي X كمدخلة للدالة التربيعية ، غير أن المخرجات و النتائج (العمودية Y) يجب أن تكون دائماً أكبر من الصفر أو مساويةً له.

ما لم تكن المدخلات المحتملة (المقدمات) الخاصة بالدالة f محددة فإن الخط البياني سوف يستمر إلى ما لانهاية إيجابية positive infinity .


كما يُبين الشكل فإن الخط البياني يستمر في المجال الإيجابي.

إن مدخلات (مقدمات) الدالة العملياتية التربيعية f تتضمن المحور الأفقي X axis بأكمله ذلك أن هذا المحور الأفقي يُمثل مجموعة جميع الأعداد الحقيقية real numbers (الإيجابية و السلبية) .

يُمكن استخدام أي قيمة للمُتغير الأفقي X الذي يُمثل مجموعة جميع الأعداد (السلبية و الإيجابية) كمدخلة و مقدمة للدالة التربيعية التي تقوم بتربيع الأعداد و رفعها للقوة الثانية ، و لكن المخرجات (المحور العمودي) Y يجب دائماً أن تكون أكبر من الصفر أو مساويةً له.

يمثل المحور الأفقي X مجموعة المدخلات (الأعداد مثلاً) التي يتوجب تربيعها.

يمثل المحور العمودي الأعداد بعد تربيعها .



مجموعة المدخلات (أي المحور الأفقيX)تضم أعداداً سلبية و إيجابية.

مجموعة المخرجات (المحور العمودي Y) لا تضم اعداداً سلبية إنها تضم فقط أعداداً أكبر من الصفر أو مساويةً له.

كما يُبين الخط البياني الخاص بهذه الدالة فإن مجال مُخرجات أو نتائج range الدالة التربيعية هي جميع الأعداد الأكبر من الصفر أو المساوية له.

ليست هنالك قيمٌ سلبية عمودية y يمكن أن تكون مخارج أو نتائج لهذه الدالة.

المحور الأفقي هو محور المدخلات (قبل تربيعها) .

المحور العمودي هو محور المخرجات (بعد تربيعها).

مجموعة الأعداد الحقيقية تمثل مجموعة مقدمات أو مُدخلات الدالة أي مجموعة المجال domain و هي تضم أعداداً إيجابيةً و سلبية لأنه لم يتم تربيعها بعد و لم يتم رفعها للقوة الثانية.

أما مجموعة المخرجات range فإنها تعتمد على مُدخلات الدالة و هي جميعها مخرجات إيجابية.

يُمكن لمُدخلاتٍ متعددة multiple input ان تُنتج المخرجة ذاتها فالمدخلتين الموجبة 2^2 و السلبية $(-2)^2$ كلاهما تساويان العدد الموجب 4 .

تقوم الدالة التربيعية بتربيع كل مدخلة لإيجاد النتيجة (الخرج) المطلوبة التي هي مربع تلك المدخلات ، أي أن الدالة التربيعية تقوم برفع المدخلات للقوة الثانية.

بما أن كُلاً من دخل domain و خرج range الدالة عبارة عن مجموعتين فإن بإمكاننا القيام بتوصيفهما باستخدام ما يُدعى بتدوين مجموعة الأعداد الحقيقية interval notation

Interval مجموعة الأعداد الحقيقية real numbers و التي توضع بين حاصرتين.

و

تُستخدم الأقواس ( ) أو الأقواس المربعة لتدوين مجموعة الأعداد الحقيقية.

يُكتب داخل الأقواس أو الأقواس المربعة رقمان، يفصل بينهما فاصلة.

يُكتب الرقم الأصغر إلى الجهة اليسرى والأكبر إلى الجهة اليُمنى.


و لتدوين عناصر مجموعة الأعداد الحقيقية فإننا نكتب القيمة الدنيا و القيمة العليا مفصولتين عن بعضهما البعض بفاصلة على أن نحيطهما بقوسٍ مُنحنية (و قوسٍ مربعة] ، حيث ترمز القوس المربعة للمجموعة المغلقة closed interval بينما ترمز القوس المنحنية) للمجموعة المفتوحة.

يُمثل مستقيم الأعداد number line مجموعة مُدخلات الدالة domain و التي تُمثل المتغير الأفقي X .


يُمثل مستقيم الأعداد دائماً المحور الأفقي.

تُبين النقطة (الدائرة المملوءة) ● بأن الرقم هو قيمةٌ محتملة و مُمكنة للمتغير الأفقي X ،أي أن الرقم الذي تكون بجواره نقطة دائرية ● يكون من ضمن الحلول الممكنة .

مثال : العدد -3 بجواره نقطة دائرية و لذلك فإنه حلٌ ممكن و مقبول.



مستقيم أعداد = المحور الأفقي X




مستقيم أعداد = المحور الأفقي X

تُبين (الدائرة المفرغة) O بأن الرقم ليس قيمةٌ محتملة و مُمكنة للمتغير الأفقي X ، أي أن الرقم الذي تكون بجواره دائرة مفرغة O لا يكون من ضمن الحلول الممكنة .

مثال : العدد -4 بجواره دائرة مفتوحة و لذلك فإنه حلّ غير ممكن و غير مقبول.

أي أن الدائرة المفرغة O تُشير إلى أن العدد الذي توضع بجواره لا يُمكن أن يُساوي المتغير الأفقي X .

نكتب القيم المحتملة للمُتغير الأفقي X و نعبر عن الحالة السابقة على شكل لا متعادلة Inequality .



مســـتقيم أعـــداد = المحـــور الأفقـــي X

ندعوا اللامتعادلة التي تُبين مجال المتغير الأفقي X أو القيم الممكنة للمتغير الأفقي X بالتدوينة البعدية (تدوينة الفاصل البُعدي) interval notation.

$$-5 \le X < 7$$

و معناها أن العدد السلبي -5 هو أكبر أو يساوي المتغير X الذي هو أقل من العدد الموجب 7 ، أي أن المتغير X يُمكن أن يكون مساوياً للعدد السلبي -5 و لكنه لا يُمكن أن يكون مساوياً للعدد الموجب 7 ، اي أن العدد الموجب 7 لا يُمكن أن يكون قيمة X .

و الآن إذا طُلب منا في امتحان أن نكتب المدونة البُعدية لمستقيم أعداد اعتماداً على الدائرتين O (مشمول) و ● (غير مشمول) أو اعتماداً على لا مُتعادلة مثل اللامتعادلة السابقة فإننا نكتب مثل هذه العبارة :

interval notation : [-5,7)

التدوينة البعدية : [-5,7)

تُبين القوس المربعة] [بأن الحد الأدنى و هو هنا العدد السلبي -5 مشمولٌ و متضمن في مجموعة القيم المحتملة ، أما القوس المنحنية)(فإنها تُبين بأن الحد الأعلى و هو هنا 7 غير مشمولُ و غير مُتضمن في مجموعة القيم المحتملة للمُتغير X .

إذاً فإن بإمكاننا أن نُعبر عن مجموعة القيم الممكنة للمُتغير الأفقي X على شكل تدوينةٍ بُعدية.

الدالات العملياتية المحدودة Limited functions

الدالة العملياتية المحدودة هي الدالة التي تكون مجموعة بياناتها محدودة و لها شروط حل محدة تجعل من خيارات حلها محدودة غير مفتوحة.

مثال : تساوي

$$f(X)=X+1: -1<X\leq 2$$

الدالة العملياتية للمتغير X $f(X)$ تساوي = أو تقتضي إضافة العدد واحد للمتغير

إكس $X+1$ بحيث : أن المتغير إكس يكون أكبر من العدد السلبي ناقص واحد

العدد السلبي ناقص واحد $-1<X$ و بحيث أن المتغير إكس يكون مساوياً للعدد

الموجب 2 أو أقل منه $X\leq 2$.

الدالة في الرياضيات هي قاعدة أو علاقة تربط كل قيمة مُدخلة (بقيمة مُخرجة واحدة فقط.

حيث يرتبط كل عنصر في المجال (المُدخل) بعنصر واحد فقط في المجال المقابل (المُخرج).

المجال: مجموعة جميع قيم المدخلات الممكنة (x).

النطاق: مجموعة جميع قيم المخرجات الناتجة (y).

يمكن تمثيل الدوال كمعادلات أو رسوم بيانية أو جداول أو مجموعات .

لا يمكن لمدخل واحد أن ينتج عنه مخرجان مختلفان. على سبيل المثال، $y^2 = x$ ليست دالة لأن قيمة x واحدة يمكن أن تنتج قيمة y موجبة وسالبة.


While every function is a relation, not every relation is a function.

بينما كل دالة هي علاقة، ليست كل علاقة دالة.

أنواع الدوال الشائعة: الدوال الخطية: $f(x)=mx+b$. الدوال التربيعية: $f(x)=ax^{2}+bx+c$. الدوال الأسية: $f(x)=a\cdot b^{x}$.

$f(x) = x + 3$ (تضيف 3 إلى أي مدخل)

$f(x) = x^2$ (تربيع المدخل)



الأرقام العشرية الدورية (المكررة) Recurring decimals و الأرقام العشرية النهائية Terminal decimals

الأرقام العشرية النهائية هي الأرقام المحدودة العدد مثال 0.1 و 0.04 ، أما الأرقام العشرية الدورية (المستمرة) فهي أرقامٌ عشرية غير محدودة و غير منتهية و تستمر إلى ما لا نهاية.

عند كتابة رقمٍ مستمر (غير محدود) فإننا نضع خطأً قصيراً فوق الجزء الذي يتكرر بشكلٍ لا نهائي.

جميع الأرقام العشرية النهائية (المحدودة) يمكن تحويلها إلى كسور بعد اختزال مقاماتها .

و **إن لم يتضمن مقام الكسر الأعداد 2 أو 5 فذلك يعني بأن الرقم العشري سوف يستمر إلى ما لا نهاية.**

مثال الرقم العشري 0.2 و هو الرقم العشري الموازي للكسر $\frac{1}{5}$.

لاحظ بأن هنالك العدد 5 في مقام الكسر أي أن هذا الرقم رقمٌ محدود و نهائي.

الرقم العشري 0.04 هو الرقم العشري الموازي للكسر $\frac{1}{25}$:

$1 \div 25 = 0.04$

لاحظ وجود العدد 5 في مقام الكسر أي أن هذا الرقم رقمٌ منتهي محدود.

الرقم العشري 0.0051 هو الرقم العشري الموازي للكسر $\frac{1}{200}$

الرقم العشري 0.16 هو الرقم العشري الموازي للكسر $\frac{1}{6}$.

1 ÷6=1666666667

عدم وجود العدد 2 و لا العدد 5 في مقام الكسر يدل على أن الرقم العشري الموازي لهذا الكسر هو رقمٌ مستمر و لا نهائي.

الرقم العشري 0.1 هو الرقم العشري الموازي للكسر $\frac{1}{9}$.


1 ÷9=0.1111111111

عدم وجود العدد 2 و لا العدد 5 في مقام الكسر يدل على أن الرقم العشري الموازي لهذا الكسر هو رقمٌ مستمر و لا نهائي.

الرقم العشري 0.36 هو الرقم العشري الموازي للكسر $\frac{4}{11}$.

4 ÷11=0.3636363636.....

عدم وجود العدد 2 و لا العدد 5 في مقام الكسر الموازي يدل على أن الرقم العشري الموازي لهذا الكسر هو رقمٌ مستمر و لا نهائي.



الأرقام العشرية و الكسور الدورية recurring decimals (المستمرة ، المكررة) هي أرقامٌ عشرية غير منتهية تستمر و تتكرر للأبد ، و يتم تمثيل الأرقام العشرية المستمرة بخط يوضع فوق الجزء المكرر، و بالرغم من أنه لا يمكن كتابة الأرقام العشرية المستمرة الدورية (المستمرة الغير منتهية) بشكلٍ كامل لأنها لا نهائية غير أنه يمكن دائماً تحويلها إلى كسور.

وحدات قياس الكتلة Units of Mass

الكتلة mass هي مقدار المادة الموجودة في جسمٍ ما و هي تقاس بوحدة الغرام و مضاعفاتها.

وحدات قياس الكثافة units of capacity

الكثافة capacity هي كمية الفراغ الموجودة في الوعاء و هي تقاس بوحدة الليتر .

كل واحد لتر يساوي ألف ميلي لتر 1000 milliliters .

كل واحد لتر يساوي مئة سنتي لتر 100 centiliters cl .

كل واحد كيلو لتر kiloliter (kl) يساوي ألف لتر.

لماذا لا تعتبر وحدات قياس الزمن وحدات مترية metric units ؟

لأنها ليست من مضاعفات العدد عشرة.


تستخدم بعض الدول كالولايات المتحدة وحدات قياسٍ إمبريالية Imperial units of measure و وحدات القياس هذه ليست من مضاعفات الرقم عشرة ، أي أنها ليست وحدات قياسٍ عشرية فيتم هنالك قياس الطول مثلاً بالإنش و القدم و يتم قياس الكتلة بوحدة الأونسة و الباوند ، و تقاس الكثافة (بما هي مقدار الفراغ الموجود في حاويةٍ ما) بوحدة الغالون مثلاً.

معامل التحويل Conversion factor

معامل التحويل هو العدد الذي يتوجب أن نضرب به أو نقسم عليه وحدة قياسٍ أخرى حتى يتحول إلى وحدة قياسٍ أخرى .

نستخدم معامل التحويل لتحويل وحدات القياس الإمبريالية (الأمريكية) إلى وحدات قياسٍ مترية (عشرية) و بالعكس ، أو للتحويل بين الوحدات الإمبريالية المختلفة .

عند تحويل وحدات القياس التي تتضمن كلاً من المساحة و الحجم فإن علينا أن ننتبه إلى أن المساحة و الحجم تمثل مقاييس بعدين أو ثلاثة أبعاد ، و من الضروري أن نقوم بتحويل كل بعدٍ على حدة بشكلٍ مستقل ثم أن نقوم بعد ذلك بضرب هذين البعدين ببعضهما البعض باستخدام معادلة حساب مساحة ذلك الشكل.




واحد سنتمتر مربع $1cm^2$ لا تساوي $10\ mm^2$ ، و واحد متر مربع $1\ m^2$ لا تساوي مئة متر مربع $100\ cm^2$.

سنتمتر مربع واحد يساوي مئة ميليمتر :

$1\ cm^2 = 100\ mm^2$

6X

$$\frac{6X}{\square} =$$



تمهل و اعط الأولوية

تصور عملية رفع الأقواس للقوة

ليكن لدينا مستطيلٌ طوله (a+b) و عرضه 4 cm سنتمتر ، أي أن مساحة هذا المستطيل تساوي :


4(a+b)

4×(a+b)


مساحة هذا المستطيل تساوي العرض 4cm ضرب الطول أي (a+b) ، أي أن هذا المستطيل يتألف من جزئين :


الجزء الأول عرضه 4cm و طوله a

الجزء الثاني عرضه 4cm و طوله 6





و هذا المستطيل يساوي :





×





عرض المستطيل الأول 4 cm بينما طوله a و لذلك فإن مساحته تساوي 4×a و كذلك فإن المستطيل الثاني عرضه 4cm و لكن طوله b ، أي أن مساحته :

(العرض 4 ضرب الطول b) 4b = 4×b

4 هنا تعني العرض أي 4 cm

إذاً حتى لا تنسى كيفية تفكيك و توسعة الأقواس و الخاصية التوزيعية تخيل بأن العلاقة عبارة عن مساحة مستطيل عرضه جزءٌ واحد و ليكن مثلاً C أما طوله فيتألف من جزئين a+b .

و بالتالي فإن مساحة هذا المستطيل تساوي :

C(a+b)=c×(a+b)

مساحة المستطيل=العرض c ضرب مجموع الجزئين المكونين للطول a+b .

يمكننا تجزئة هذا المستطيل إلى مستطيلين اثنين :


الأول مساحته $(c\times a)$ أي (ca) أي العرض ضرب الطول ، أما الثاني فمساحته (cb) أي $(c\times b)$ أي العرض ضرب الطول على اعتبار أن المستطيل الأصلي يتألف طوله من جزئين هما a و b .

مساحة المستطيل الأكبر يساوي طوله ضرب مجموع الجزئين (الضلعين) المكونين لطوله :

مساحة المستطيل الأكبر = العرض × الجزء الأول من الطول+الجزء الثاني من الطول.

مساحة المستطيل الأصغر الأول = العرض × الجزء الأول المكون للطول.

مساحة المستطيل الأصغر الثاني = العرض × الجزء الثاني المكون لطول المستطيل الأكبر.



تحليل الأقواس التي تتضمن عناصر سلبية

$$-d(f+4)=-df-4d$$

$$-d\ (f+4)=-df-4d$$

كما تعلمون فإن ناتج ضرب عنصرٍ سالب في عنصرٍ موجب تعطي ناتجاً سلبياً :

سالب × موجب = سالب

عدو (-) صديقك (+) = عدوك (-)

$$-d(f+4)=-df-4d$$

العنصر f هو عنصرٌ موجب لأنه ليس قبله شارة سالب ، بينما العنصر d هو عنصرٌ سالب :

$$-d(f+4)=-df-4d$$

العدد 4 في (f+4) هو عنصرٌ موجب و قد اعتبرت شارة الجمع التي تسبقه بمثابة شارةٍ موجبة.

$$-4d$$

لماذا لم نقل -d4 ؟

لأنه لا يصح أبداً أن نضع المتغير (الحرف) قبل العدد .

تذكر دائماً بأننا اعتبرنا شارة الجمع الموجودة قبل العدد بمثابة شارة موجب تسبق العدد.

$$-d(f+4)=-df-4d$$

سالب × سالب = موجب

عدو (سالب) × عدوك(سالب) = صديقك (موجب)

لأن d– سالب بينما f موجب :

سالب ×موجب = سالب

كيف حصلت على النتيجة $4d - -df$؟

$$-d \times 4 = -4d$$

$$-d \times +4 = -4d$$

$$4 = +4$$

طبعاً لا يصح ابداً أن نضع الحرف قبل العدد.

اعتبرنا بأن علامة الطرح علامة سالب تسبق العدد 4 الذي اعتبرناه عدداً سلبياً و لذلك فقد أصبحت نتيجة ضرب العنصر السالب d- به نتيجةً سلبية :

$$-d \times 4 = -4d$$

$$-d \times + 4 = -4d$$

$$d-(f+4)=d-f-4$$

كأننا نقول :

$$d-1\ (f+4)$$

$$d-1\times(f+4)$$

$$d-(f+4)=d-f-4$$

كأننا نقول :

$$d-1\ (f+4)$$

و كذلك فإن (f+4) مضروبة بالعدد السلبي 1-

$$d-(f+4)=d-f-4$$

كأننا نقول :

$$9-(5+3)=9-5-2=2$$

$$-1 \times f = (-)\,1f = -f$$

$$-1\times 4 = -4$$

إذاً فقد تخيلت وجود العدد 1 بعد الشارة السلبية ثم قمت بضربه بالعناصر الموجودة ضمن القوس حتى أتمكن من تفكيكه.

جمع و طرح التدوينات العلمية

قبل القيام بطرح و جمع التدوينات العلمية (رقم مضروبٌ بعشرة) فإن علينا التأكد من أن جميع تلك القوى مرفوعةٌ للقوة العاشرة ، و لذلك :

قبل القيام بجمع أو طرح التدوينات العلمية فيجب تحويل جميع الأرقام للقوة العاشرة.

ما هو ناتج طرح :

$$3.5\times 10^{6} - 14000$$

لدينا رقمٌ عادي مطروحٌ من تدوينة علمية (رقمٌ مضروبٌ بقوة عشرية) و لإجراء عملية الطرح فإننا نقوم بتحويل الرقم العادي 140000 إلى تدوينة علمية :

$$14000 = 1.4\times 10^{4}$$

$$1.4\times10^{4}=1.4\times1000=14000$$

لنحصل على عملية الطرح التالية :

$$(3.5\times10^{6})-(1.4\times10^{4})$$

كما ترون فإن القوتين متباينتين فالعشرة الأولى مرفوعةٌ للقوة السادسة 10^{6} بينما العشرة الثانية مرفوعةٌ للقوة الرابعة 10^{4} و لذلك فإننا نقوم بتوحيد القوتين السادسة 10^{6}و الرابعة 10^{4} عن طريق جعلها قوة واحدة ، أي عن طريق تحويل 10^{4} إلى 10^{6} ، و كيف نفعل ذلك ؟

عن طريق إضافة العدد 2 للقوة 10^{4} و كما علمنا من قبل فإن عملية ضرب القوى ليست إلا عملية جمع ، أي أنني لتحويل 10^{4} إلى 10^{6} فإن علي ان أضربها بعشرة مرفوعة للقوة الثانية أي 10^{2} :

$$10^{4}\times10^{2}=10^{4+2}=10^{6}$$

و بالطبع فإن 10^{2} تساوي $10\times10 = 100$

$$10\times10=100$$

و الآن بعد أن ضربت الرقم بهذه القوة فإنه لم يعد كما كان أي أنه قد تضخم ، أي أن قوة الرقم أي 10^{4} قد تضخمت و أصبحت 10^{6} ، و حتى أعيدهذا الرقم إلى قيمته الأصلية يجب ان أجري عمليةً معاكسة لعملية الضرب بمئة التي أجريتها على القوة ، و لكنني سوف أجري هذه العملية المعاكسة ، أي عملية القسمة على مئة على الرقم المضروب بالقوة أي على 1.4 ، أي أنني سوف أرفع الرقم عشرة للقوة السلبية الثانية 10^{-2}

$$1.4\div100=0.014$$

لأن القسمة على 100 تعادل الضرب بالقوة السلبية الثانية :

$$1.4\times10^{-2}=0.014$$

$$1.4 \times 10^{-2} = 0.014$$

بدلاً من ضرب الرقم بالرقم عشرة المرفوع للقوة السلبية الثانية و حتى أحافظ على القيمة الأصلية يمكنني ببساطة أن أقسمه على القيمة ذاتها التي ضربت قوته بها أي مئة :

$$1.4 \div 100 = 0.014$$

لتصبح لدي الآن علاقة الطرح التالية :

$$(3.5 \times 10^6) - (0.014 \times 10^6) = (3.5 - 0.014) \times 10^6$$

نطرح الرقمين من بعضهما البعض :


$$3.5 - 0.014 = 3.486$$

و تبقى القوة الموحدة كما هي أي 3.486×10^6

إذا فإننا في عمليات طرح التدوينات العلمية نقوم بتوحيد القوى بينما نطرح الأرقام من بعضها .

تستخدم الدالات التربيعية Quadratic functions في مجال الفيزياء و على الأخص في مسائل الجاذبية gravity .

مثال :



تم رمي كرة بشكلٍ عمودي نحو الأعلى من ارتفاع 4 أمتار فوق سطح الأرض بسرعة ابتدائية تبلغ 8m/s متر\ثانية .

لدراسة حركة الكرة يمكننا تمثيل حركة الكرة على شكل معادلة تربيعية quadratic function حتى نرصد حركة الكرة ، و أقصى ارتفاعٍ وصلت إليه ، و الزمن الذي استغرقته حتى ترتطم بالأرض .

معادلة حركة الكرة :

حتى نتمكن من تمثيل المعادلة على شكلٍ بياني فإن علينا أن نعرف النقاط التي تقاطع فيها الخط البياني مع المحور الأفقي X axis و هي التي تدعى بالجذور roots .

مجهول المعادلة هو عامل الزمن t .

إن إيجاد عامل الزمن t عندما يكون العامل العمودي y صفراً 0 فإن ذلك سوف يكشف لنا جذور الإحداثية (النقاط التي يتقاطع فيها الخط البياني مع المحور الأفقي) ، و لذلك فإننا **كما نفعل عادةً عند حل المعادلات التربيعية نقوم باستبدال العامل y بالصفر 0 .**

الصيغة الأصلية للمعادلة التربيعية :

$$Y=-5t^2+8t+4$$

حيث Y يمثل ارتفاع الكرة فوق سطح الأرض أما -5 فهو نصف تسارع السقوط

بفعل الجاذبية الأرضية الذي يبلغ 10ms عشر أمتار في الثانية و رمزه g .

t^2 الزمن time و هو مرفوعٌ للقوة الثانية.

8 سرعة الكرة الابتدائية

T الزمن منذ رمي الكرة.

هذه المعادلة تمثل الصيغة النموذجية للمعادلات التربيعية التي مرت معنا ، و الآن كما في

العادة فإننا نجعل العامل العمودي Y أي ارتفاع الكرة فوق سطح الأرض مساوياً للصفر .

و نجعله ناتجاً للمعادلة فتصبح المعادلة على الشكل التالي :

$$-5t^2+8t+4=0$$

فيصبح معنى هذه المعادلة :

عندما يكون ارتفاع الكرة فوق سطح الأرض صفراً 0 ، أي عندما يكون الارتفاع العمودي y صفراً 0 أي عندما يكون الارتفاع العمودي y صفراً و ذلك عندما تكون الكرة على سطح

الأرض تماماً و عندها تكون جميع البيانات الأخرى أو بالأصح محصلة البيانات الأخرى مثل تسارع الكرة و الزمن مساويةً للصفر فتتعادل المتعادلة، و بما أن جميع العوامل السابقة تتفاعل مع بعضها بشكلٍ متناسق فإننا سوف نجد أسلوب التفاعل الذي ينتج الصفر عندما تكون الكرة على سطح الأرض اي عندما يكون ارتفاع الكرة صفر :

$$-5t^2 +8t+4=0$$

أي أن المطلوب هو تصفير المعادلة حتى تتوازن ، اي إيجاد قيم t الزمن التي تصبح عندها المعادلة صفرية.

و كما هي العادة في حل المعادلات التربيعية فإننا نقوم بتخصيم (تقويس) factoring المعادلة كما مر معنا سابقاً عن طريق احتواء عناصرها بين قوسين تجمع بينهما علاقة ضرب ، و **حتى تكون عملية التخصيم (التقويس) صحيحة فيجب ان تنتج الأقواس عند ضربها ببعضها البعض المعادلة الأصلية ذاتها.**

عند تخصيم (تقويس) المعادلة :

$$-5t^2 +8t+4=0$$

فإنني أحصل على العلاقة القوسية التالية :

$$(5t+2)\ (-t+2)$$

أتأكد من صحة عملية التخصيم (التقويس) عن طريق تفكيك الأقواس و ذلك عن طريق ضرب جميع محتويات القوس الأولى بجميع محتويات القوس الثانية:

$$(5t+2)\ (-t+2)=0$$

$$5t\times -t=-5t^2$$

كأننا نقول :

$$5t\times-1t=-5t^2$$

موجب×سالب=سالب

صديق(+) × عدوك(-)=عدوك(-)

$$t\times t=t^2$$

إن ضرب اي عنصرٍ بنفسه يعني رفع ذلك العنصر للقوة الثانية.

$$5t\times2=10t$$

$$2\times-t=(-2t)$$

موجب × سالب = سالب

صديق (+) عدوك(-) = (عدوك) (-)

$$2\times2=4$$

نجمع النتائج المرحلية مع بعضها :

$$-5t^2+10t-2t+4$$

$(-5t^2)$ حدٌ مرفوع للقوة الثانية لا يمكن جمعه إلا مع حدٍ مرفوع لقوة مماثلة و لذلك فإنه يبقى كما هو .

$$10t-2t=8t$$

4 عددٌ منفرد لا يمكن جمعه إلا مع عددٍ منفرد و لذلك فإنه يبقى كما هو و بذلك فإننا نحصل على المعادلة التالية :

$$-5t^2+8t+4$$

و هي المعادلة الأصلية التي بدأنا بها ، و هذا يعني بأن عملية التخصيم (التقويس) التي قمت بها صحيحة.

$$-5t^2+8t+4=0$$

$$(5t+2)\ (-t+2)=0$$

$$(5t+2)\times(-t+2)=0$$

الآن **بما أن ناتج المعادلة يساوي الصفر فذلك يعني بأن قيمة احد القوسين يجب أن تكون مساوية للصفر** أي كأننا نقول :

$(0)\times(0)=0$

ما هي الاحتمالات التي تجعل من القوس $(5t+2)$ **مساوية للصفر؟**

$$(5t+2)=0$$

الاحتمال الأول أن تكون قيمة $5t$ **هي** -2

$$-2+2=0$$

قيمتين متماثلتين متعاكستي الشارة ناتج جمعهما صفر.

الاحتمال الثاني ان تكون قيمة t هي (-0.4) ، و بما أن هنالك علاقة ضرب بين 5 و t فإن :

$0.4\times5=(-2)$

$(-2)+2=0$

قيمتين متماثلتين متعاكستي الشارة ناتج جمعهما يساوي الصفر.

ما هي احتمالات أن تكون القوس الثانية مساوية للصفر ؟

$$(-t+2)=0$$

أن تكون قيمة 2 مساوية لقيمة t :

2=t

و عندها فإن مجموع قيمتين متعاكستي الشارة هو الصفر.

$$-t + t = 0$$

الاحتمال الثاني أن تكون قيمة t تساوي 2 :

$$-2+2=0$$

و بما أن هنالك حلين محتملين فذلك يعني بأن الخط البياني سوف يتقاطع مع المحور الأفقي X

في نقطتين هما 2 و -0.4

$$t=(-0.4)$$

$$t=2$$

و عن طريق تحديد الإحداثيتين (0,4) و (2) على الشبكة الإحداثية فإن ذلك سوف يمكننا من معرفة أعلى ارتفاع سوف تبلغه الكرة و الزمن الذي سوف تستغرقه حتى ترتطم بالأرض.

و كما ورد في المسألة فإن الكرة قد تم رميها للأعلى من ارتفاع 4 أمتار.

و لذلك فإن الزمن الذي يظهر على المحور الأفقي X axis عندما يكون صفراً 0 فإن الارتفاع على المحور العمودي Y axis سوف يكون مترين 2m .

بما أنه تم رمي الكرة من ارتفاع 4 أمتار فإن الزمن سيكون صفراً عندما يكون الارتفاع على المحور العمودي أقل من 4 أمتار.


اي ان إحداثية هذه القيمة العمودية (التقاطع العمودي) Y intercept ستكون (0,2) : العدد الأيسر 2 يشير إلى عنوان النقطة الأفقية على المحور الأفقي X ، بينما يشير العدد الأيمن 2 إلى عنوان و موقع تلك النقطة على المحور العمودي Y .

اي أن العبرة هنا هي للمحور العمودي Y ، أما النقطة الإحداثية الثانية كما قمنا بحسابها فهي

.(-0.4,0)

و نحن **نحسب موضع الإحداثية الأفقي X coordinate اعتماداً على الجذور الإحداثية أي نقاط تقاطع الخط البياني مع المحور الأفقي.**


إذاً فإن **الزمن اللازم للكرة حتى ترتطم بالأرض هو القيمة الموجبة من كلٍ من الرقمين الذين توصلنا لهما و هما 2 و (-0.4) ، اي أن الكرة سوف ترتطم بالأرض بعد ثانيتين.**





حساب أقصى ارتفاعٍ وصلت إليه الكرة


إن حساب أقصى ارتفاعٍ بلغته الكرة يتطلب منا حساب إحداثيات نقطة التحول the coordinate turning point أي النقطة التي يغير عندها الخط البياني اتجاهه فبعد أن تصل الكرة أو أي جسمٍ مقذوف من الأسفل أقصى ارتفاعٍ له و و عندما تتساوى قوة الدفع نحو الأعلى مع قوة الجاذبية الأرضية يتوقف ذلك الجسم المقذوف لبرهة في الفضاء عند تساوي هاتين القوتين و هذه هي نقطة التحول turning pint التي يبدأ الجسم بعد بلوغها بالسقوط الحر إلى الأرض.

و في المخططات البيانية يكون لدينا خط تناظر line of symmetry يصل إلى نقطة التحول و لذلك فإن **موقع الإحداثية الأفقية X coordinate لنقطة التحول تقع تماماً في المنتصف.**






Y
X



ما هو الاختلاف ما بين الجذر root و نقطة التحول على المخطط البياني؟

الجذر هو نقطة تقاطع الخط البياني مع المحور الأفقي ، بينما نقطة التحول هي أقصى حد يبلغه الخط او المنحني البياني.

الجذور ليست هي نفسها نقطة الانعطاف في الإحداثيات. مع أن كليهما من السمات الأساسية المستخدمة لرسم منحنى الدالة التربيعية (القطع المكافئ)، إلا أنهما يمثلان جوانب مختلفة تمامًا للدالة.

1. الجذور (وتسمى أيضًا نقاط التقاطع مع المحور السيني (المحور الأفقي) أو الأصفار.

الجذور هي قيم x الأفقية التي يتقاطع عندها المنحني البياني مع المحور السيني (الأفقي) أو يلامسه .

الغرض: تُظهر الجذور مواضع تحقق المعادلة

نقطة الانعطاف هي النقطة العظمى (العلوية) أو الصغرى (السفلية) على القطع المكافئ البياني و هي تمثل النقطة التي يُغير فيها المُنحني البياني ذو القطع المكافئ اتجاهه.


إحداثيات نقطة الانعطاف : نقطة واحدة

الغرض من نقاط الانعطاف : تُظهر نقاط الانعطاف مواضع تغير اتجاه المنحني البياني من التناقص إلى التزايد (أو العكس).

العلاقة الرئيسية

على الرغم من اختلافهما، إلا أنهما مرتبطان بالتناظر: تقع نقطة الانعطاف تمامًا في منتصف الجذرين.

.




حساب النقطة الوسطى للقطعة الخطية :

يمكن حساب إحداثيات النقطة الوسطى midpoint عن طريق جمع إحداثيات نهايتيها (طرفيها) ثم قسمة الناتج على 2 .

يرمز للنقطة الوسطى بالحرف M .

إن بعد النقطة الوسطى يعادل طول القطعة الخطية تقسيم 2 ، على اعتبار أن النقطة الوسطى تقع في منتصف القطعة الخطية ، أما طول القطعة الخطية فإنه يساوي بداية النقطة الخطية مع نهايتها) سواءً أكانت تلك القطعة الخطية أفقيةً أو عمودية :



النقطة الوسطى في تساوي مجموع النقطتين الأفقيتين X_1+X_2 تقسيم 2 (بالنسبة للخط الأفقي) .

النقطة الوسطى تساوي مجموع النقطتين الأفقيتين Y_1+Y_2 تقسيم 2 (بالنسبة للخط العمودي)

نستبدل الرموز بالقيم الرقمية المتوفرة :

$$\frac{-0.4+2}{2}=\frac{0+0}{2}=(0.6,0)$$


0.6 هي الإحداثية الأفقية X coordinate لنقطة التحول اي نقطة تغيير الاتجاه.

الان **لحساب الارتفاع الأقصى الذي بلغته الكرة فإننا نستبدل مجهول المعادلة الأساسية أي الزمن t بالإحداثية الأفقية لنقطة التحول (النقطة التي يغير فيها الخط البياني اتجاهه) أي (0.6).**

$$-5(0.6)2+8(0.6)+2$$


$$-5\times(0.6)2+8\times(0.6)+2=5$$

إذاً فإن أعلى ارتفاعٍ بلغته الكرة هو 5 أمتار.



مخطط بياني للزمن و الارتفاع لاحظ كيف أن المنحني يبدأ بالهبوط بعد وصوله لأعلى نقطة.

مقياس الرسومات *Scale drawings*



Life steam 1:8

G 1:22.5


O 1:45

S 1:62

HO 1:87, Brio

N 1:160

Z 1:220



مقياس الرسومات *Scale drawings*

يظهر لنا مقياس الرسومات شكلاً ما أو موقعاً و قد تم انقاص حجمه بنسبةٍ ثابتة يتم إظهارها على الرسم ، و هذه النسبة تجعل من الممكن تحويل المقاييس المأخوذة من الرسم إلى مسافاتٍ و أبعاد في العالم الحقيقي على المصورات الجغرافية و الخرائط العسكرية و مخططات البناء و ما شابه ذلك، حيث يتم تمثيل كل موقعٍ أو جسم بطريقةٍ مصغرة مع المحافظة على التناسب ما بين مساحة المخطط و العناصر التي تظهر عليه و بين العالم **الواقعي فقد يشير مقياس الرسوميات إلى النسبة *1:10000* مثلاً و التي تعني بأنه لإيجاد الحجم الحقيقي لأي عنصرٍ يظهر على المخطط فإنه يتوجب ضرب حجم ذلك العنصر بعشرة آلاف و هو ما يشير إليه مقياس الرسوميات *1:10000* .**

و بالإضافة إلى مقياس الرسوميات النسبي مثل ***1:10000***فقد يشير المخطط كذلك إلى ما يدعى بمعدل تحويل قياس مثل ***1cm=100m*** و التي تعني بان كل واحد سنتمتر على المُخطط


يساوي مئة متر ،و هذا يعني بأنه على مخططٍ يبلغ طوله 40 سنتيمتر مثلاً يمكننا تمثيل طريقٍ يبلغ طوله 4 كيلو متر.

إذاً فإن الرسم القياسي هو رسمٌ يظهر جسماً ما أو موقعاً ما و قد تم تخفيض حجمه بنسبٍ معينة و هذه النسبة تسمح بحساب المسافات و الأبعاد في العالم الواقعي عن طريق إجراء قياساتٍ على المخطط أو المصور.



حساب المسافة

تم إنشاء ضواحي سكنية لإسكان عديمي الأملاك و العاطلين عن العمل، و لزيادة حمولة الأراضي من السكان فقد تم تقسيمها بشكلٍ طولي ، فإذا كانت واجهة كل قطعة أرضٍ سكنية على الشارع تبلغ على المخطط 5 سنتيمتر ، و إذا كان عرض الحديقة الأمامية المجاورة للشارع يبلغ على المخطط 4 سنتيمتر فكم يبلغ طول واجهة كل قطعة أرض على الشارع ، و كم يبلغ عرض الحديقة التي تفصل قطعة الأرض عن الشارع على مخططٍ يبلغ مقياسه ***1:100*** ؟



لحساب طول واجهة المقسم على الشارع و حساب عرض الحديقة الأمامية فإننا نضرب المسافة كما تظهر في المخطط أي *5cm* سنتمتر و عرض الحديقة أي 4 سنتمتر بمقياس المخطط اي مئة 100 :

$$5cm\times100=500\ cm$$

عرض واجهة المقسم على الشارع تبلغ 500 سنتمتر أي 5 أمتار.

عرض الحديقة :

$$4cm\times100=400\ cm$$

للتحويل من سنتمتر إلى متر فإننا نقسم على مئة :

$$500/100=5\ m$$

طول واجهة المقسم على الشارع تبلغ 5 أمتار.

المخططات الشريطية Bar Charts


المخططات الشريطية هي طريقةٌ بسيطة لتمثيل البيانات حيث أن الأشرطة المتباينة الطول تمثل مدى تواتر (تكرار) بياناتٍ معينة.

يتم تمثيل التواتر (التكرار) في المخططات الشريطية على المحور العمودي y بينما يتم تمثيل البيانات الفئوية data categories على المحور الأفقي X axis .




المخططات الشريطية الثنائية Dual bar chart

في المخططات الشريطية الثنائية يتم وضع المجموعات الفرعية بجوار بعضها البعض و هذا الأمر يمكننا من مقارنة حجم المجموعات.



مخطط الأعمدة المركبة composite bar chart

يتم في مخطط الأعمدة المركبة stacked bar chart تمثيل مجموعتين فرعيتين اثنتين أو أكثر على شكل عمودٍ بياني واحدٍ أو أكثر مع ضرورة أن يكون كل جزءٍ من العمود البياني بلونٍ مختلفٍ عن الجزء الآخر.



الرسوم التوضيحية (البيكتوغرام) pictograms

يتم تمثيل التواتر (التكرار) في مخططات الرسوم التوضيحية باستخدام الصور بدلاً من الأعمدة bars ، التي مرت معنا سابقاً ، كما أن الرسوم التوضيحية لا تحوي غالباً محاور axes (محاور أفقية و عمودية) ، و تستخدم الرسوم التوضيحية غالباً لتقديم البيانات النوعية غير الرقمية (qualitative (non-numerical data .

تعتمد مخططات الرسوم التوضيحية كما يُشير اسمها على الرموز و الرسوم و الصور ، و على سبيل المثال تستخدم الرموز و الصور في إحصائيات المباريات الرياضية مثل مباريات كرة القدم حيث يوضع رمز الفريق و توضع تحته رسوم لبطاقات صفراء و حمراء بعدد معين في إشارة إلى البطاقات التي نالها كل فريق أو كل نادي .

قد تحوي الرسوم التوضيحية على مفتاح يُبين ما الذي تعنيه كل صورة و عدد مرات التواتر الذي تمثله كل صورة.




الرسوم البيانية الخطية Line graphs

يتم تمثيل البيانات في الرسوم البيانية الخطية على شكل نقاط يتم ضمها لاحقاً بخطوطٍ مستقيمة ، **و تستخدم الرسوم البيانية الخطية بشكلٍ خاص للإشارة إلى البيانات التي تتغير مع مرور الزمن و لذلك فإنها تستخدم بشكلٍ خاص في تمثيل البيانات المستمرة continuous data .**

يتم تمثيل البيانات التي يتم تحليلها على المحور العمودي Y axis .

يتم تعليم النقاط الإحداثية بشارة زائد + او نقطة.


انتبه إلى أننا في هذا الشكل من المخططات البيانية نستخدم خطوطاً مستقيمة غير مُنحنية.



الرسوم البيانية ذات الخط المزدوج Double line graphs

هي رسومٌ بيانية ذات خطين بيانيين و هي بذلك تمكننا من مقارنة أمرين مع بعضهما البعض.

يتم تمثيل البيانات على المحور العمودي y axis و ليس على المحور الأفقي.



يتم تعليم النقاط الإحداثية بخطين بشارة زائد + أو نقطة.

الأصل في هذا النوع من الرسوم البيانية أن يكون الخط البياني مستقيماً غير منحني.

تُستخدم المخططات البيانية ذات الخط البياني المضاعف لتمثيل العلاقة بين خطين بيانيين.

إن الخطوط المستقيمة التي تصل بينم النقاط الإحداثية تُشير إلى أن التغير يتم بطريقةٍ ثابتة و ذلك لتمثيل البيانات المنفصلة discrete data .

تم بعون الله تعالى وحده

الرياضيات – ما لن يُقال لأبنائك في المدارس الحكومية

د.عمار شرقية






قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون


شأن الكتاب الشريف في عصور
الانحطاط أن يصبح بضاعةً مزجاة
كاسدة

الرياضيات

ما لن يقال لأبنائك في المدارس الحكومية



د. عمار شرقية

ما لن يقال لأبنائك في المدارس الحكومية د.عمار شرقية الصفحة 1